Canadian Food Inspection Agency
Agence canadienne d'inspection des aliments

Plant Varieties Journal
Bulletin des variétés végétales

July / Juillet 2003
Number / Numéro 48

Canada

© Canadian Food Inspection Agency 2003

Catalogue No. A27-13-48
ISSN: 1188-1534

© Agence canadienne d'inspection des aliments 2003

N° de catalogue A27-13-48
ISSN: 1188-1534

Cover page
Broom

Page de couverture
Genêt

104-00868/

Plant Varieties Journal

THE PLANT BREEDERS' RIGHTS OFFICE

Correspondence with the PBRO should be addressed to:

The Plant Breeders' Rights Office
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
K1A 0Y9

General inquiries on Plant Breeders' Rights should be directed to the staff of the PBRO. They can be contacted by facsimile at (613) 228-6629, by e-mail, or by telephone at (613) 225-CFIA (225-2342) at the extension numbers indicated.

Visit our website at:
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pbrpov/pbrpove.shtml

Staff of the Plant Breeders' Rights Office		Extension #
Commissioner, Plant Breeders' Rights	Valerie Sisson (vsisson@inspection.gc.ca)	4384
PBR Examiners	Elizabeth Prentice-Hudson (eprentice@inspection.gc.ca)	4393
	Christine Irving (cirving@inspection.gc.ca)	4394
	Sandy Marshall (smarshall@inspection.gc.ca)	4392
	Michel Cormier (mcormier@inspection.gc.ca)	4391
	Michael Burvill (burvillme@inspection.gc.ca)	4501
Project Coordinator	Bill Hanson (bhanson@inspection.gc.ca)	4388

TABLE OF CONTENTS

1. Grants of Rights
   - Astilbe 1
   - Canola 1
   - Corn 2
   - Delphinium 2
   - Flax 2
   - Nemesia 2
   - Osteospermum 3
   - Pea 3
   - Phlox 3
   - Rose 3
   - Russian Sage 5
   - Sidalcea 6
   - Snapdragon 6
   - Strawberry 6
   - Sutera 6
   - Wheat 6

2. Applications Accepted for Filing 8
   - Alstromeria 8
   - Angelonia 8
   - Apple 8
   - Argyranthemum 8
   - Astrantia 10
   - Barley 10
   - Bromegrass Hybrid 11
   - Calibrachoa 11
   - Canola 11
   - Chrysanthemum 13
   - Coleus 13
   - Coneflower 14
   - Corn 14
   - Dahlia 14
   - Dianthus 14
   - Diascia 15
   - Faba Bean 16
   - Flax 16
   - Gaillardia 16
   - Hibiscus 16
   - Impatiens 16
   - Lantana 20
   - Mustard 21
   - Nemesia 21
   - Osteospermum 22
   - Pea 23
   - Pelargonium 23
   - Petunia 25
   - Photinia 25
   - Plum 25
   - Poinsettia 25
   - Potato 25

Rose 26
Snapdragon 28
Soybean 28
Strawflower/Paper Daisy 29
Sutera 29
Verbena 30
Wheat 30

3. Applications Under Examination 31
Apple 31
Canola 36
Cherry 39
Corn 41
Oat 42
Osteospermum 45
Pea 48
Rose 53
Soybean 63

4. Applications Abandoned 67

5. Applications Withdrawn 67

6. Change of Denomination 72

7. Rights Surrendered 74

8. Rights Revoked 76

9. Change of Application Date 77

10. Applications Rejected 77

11. Errata 78

12. Cost of Protection 78

DEADLINE FOR OCTOBER 2003 ISSUE IS AUGUST 8, 2003

DEADLINE FOR JANUARY 2004 ISSUE IS OCTOBER 31, 2003

1. GRANTS OF RIGHTS

ASTILBE
(*Astilbe species* Buch.-Ham. ex D. Don)

➤ **Holder:** Wim van Veen, Noorden, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1441
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1869
Application date: 1999/11/25
Approved denomination: **'Flamingo'**

➤ **Holder:** Wim van Veen, Noorden, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1442
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1870
Application date: 1999/11/25
Approved denomination: **'Lollypop'**

➤ **Holder:** Wim van Veen, Noorden, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1443
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1871
Application date: 1999/11/25
Approved denomination: **'Pink Lightning'**

➤ **Holder:** Wim van Veen, Noorden, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1444
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1872
Application date: 1999/11/25
Approved denomination: **'Touch of Pink'**

➤ **Holder:** Wim van Veen, Noorden, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1445
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1873
Application date: 1999/11/25
Approved denomination: **'White Wings'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Certificate number: 1464
Date granted: 2003/03/31
Application number: 97-1016
Application date: 1997/04/07
Approved denomination: **'NS2173'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/31

➤ **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Certificate number: 1465
Date granted: 2003/03/31
Application number: 97-1018
Application date: 1997/04/07
Approved denomination: **'NS2082'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/31

➤ **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Certificate number: 1466
Date granted: 2003/03/31
Application number: 00-2232
Application date: 2000/05/03
Approved denomination: **'NS3213'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/31

➤ **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Certificate number: 1467
Date granted: 2003/03/31
Application number: 00-2236
Application date: 2000/05/03
Approved denomination: **'46A30'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/31

➤ **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Certificate number: 1468
Date granted: 2003/03/31
Application number: 00-2237
Application date: 2000/05/03
Approved denomination: **'46A31'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/31

CORN
(*Zea mays* L.)

➤ **Holder:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., Chatham, Ontario
Certificate number: 1461
Date granted: 2003/03/28
Application number: 99-1746
Application date: 1999/08/05
Approved denomination: **'87DIA4'**

➤ **Holder:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., Chatham, Ontario
Certificate number: 1462
Date granted: 2003/03/28
Application number: 01-2527
Application date: 2001/01/24
Approved denomination: **'86ISI27'**

DELPHINIUM
(*Delphinium x belladonna* Hort. ex Bergmans)

➤ **Holder:** Mark Van Kesteren, Noordwijkerhout, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1439
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1753
Application date: 1999/08/06
Approved denomination: **'West End Blue'**

FLAX
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Holder:** United Grain Growers Ltd., Morden, Manitoba
Certificate number: 1460
Date granted: 2003/03/25
Application number: 00-2404
Application date: 2000/10/13
Approved denomination: **'2047'**

NEMESIA
(*Nemesia* species Venten)

➤ **Holder:** Penhow Specialist Nurseries, Gwent, South Wales, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1469
Date granted: 2003/04/16
Application number: 00-2139
Application date: 2000/03/03
Approved denomination: **'Penmys'**
Tradename: **Mystic Blue**
Tradename: **Blueberry Sachet**

➤ **Holder:** Penhow Specialist Nurseries, Gwent, South Wales, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1470
Date granted: 2003/04/16
Application number: 00-2140
Application date: 2000/03/03
Approved denomination: **'Pensug'**
Tradename: **Sugar Girl**
Tradename: **Vanilla Sachet**

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum* species L.)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1449
Date granted: 2003/03/07
Application number: 00-2120
Application date: 2000/02/18
Approved denomination: **'Aknam'**
Tradename: **Nasinga Cream**

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Holder:** Salling Plant Breeding Aps., Skive, Denmark
Agent in Canada: Johnson Seeds Ltd., Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1446
Date granted: 2003/03/05
Application number: 00-2347
Application date: 2000/07/26
Approved denomination: **'Venture'**

➤ **Holder:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Prairieland Grain, Hartney, Manitoba
Certificate number: 1459
Date granted: 2003/03/18
Application number: 00-2402
Application date: 2000/10/12
Approved denomination: **'Big Daddy'**
Synonym: **Bigdaddy**

PHLOX
(*Phlox paniculata* Lyon ex Pursh)

➤ **Holder:** Herbert Oudshoorn, Rijpwetering, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1438
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1749
Application date: 1999/08/06
Approved denomination: **'Lizzy'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1447
Date granted: 2003/03/06
Application number: 95-668
Application date: 1994/11/30
Approved denomination: **'POULvue'**
Tradename: **Victor Borge**

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1448
Date granted: 2003/03/06
Application number: 96-723
Application date: 1996/01/25
Approved denomination: **'POULari'**
Tradename: **Karen Blixen**

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1450
Date granted: 2003/03/10
Application number: 98-1507
Application date: 1998/10/15
Approved denomination: **'POULhyr'**
Tradename: **Cherry Parade®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1451
Date granted: 2003/03/10
Application number: 98-1512
Application date: 1998/10/15
Approved denomination: **'POULhi003'**
Tradename: **Excellent Hit®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1452
Date granted: 2003/03/10
Application number: 98-1516
Application date: 1998/10/15
Approved denomination: **'POULymp'**
Tradename: **Olympic Palace®**
Synonym: **Olympic Palace**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1453
Date granted: 2003/03/10
Application number: 00-2334
Application date: 2000/07/06
Approved denomination: **'POULhi001'**
Tradename: **Sunglow Hit®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1454
Date granted: 2003/03/10
Application number: 00-2335
Application date: 2000/07/06
Approved denomination: **'POULra001'**
Tradename: **Monica Parade®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1455
Date granted: 2003/03/10
Application number: 00-2336
Application date: 2000/07/06
Approved denomination: **'POULra002'**
Tradename: **Heidi Parade®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1456
Date granted: 2003/03/10
Application number: 00-2337
Application date: 2000/07/06
Approved denomination: **'POULra004'**
Tradename: **Claudia Parade®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1457
Date granted: 2003/03/10
Application number: 00-2338
Application date: 2000/07/06
Approved denomination: **'POULra005'**
Tradename: **Nicoline Parade®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1458
Date granted: 2003/03/10
Application number: 00-2341
Application date: 2000/07/06
Approved denomination: **'POULty002'**
Tradename: **Vital Party®**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/03/10

➤ **Holder:** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1474
Date granted: 2003/05/01
Application number: 98-1297
Application date: 1998/03/27
Approved denomination: **'POULtika'**
Tradename: **Northern Lights**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2005/05/01

➤ **Holder:** Reinhard Noack, Gutersloh, Germany
Agent in Canada: McFadden, Fincham, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1475
Date granted: 2003/05/15
Application number: 00-2151
Application date: 2000/03/07
Approved denomination: **'Noare'**
Tradename: **Flower Carpet Red**
Tradename: **Red Velvet**

RUSSIAN SAGE (*Perovskia* species Kar.)

➤ **Holder:** Herbert Oudshoorn, Rijpwetering, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1437
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1748
Application date: 1999/08/06
Approved denomination: **'Little Spire'**

SIDALCEA
(*Sidalcea* species A. Gray)

➤ **Holder:** Aad Geerlings, Lisserbroek, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1440
Date granted: 2003/03/04
Application number: 99-1879
Application date: 1999/11/25
Approved denomination: **'Little Princess'**

SNAPDRAGON
(*Antirrhinum* L.)

➤ **Holder:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1471
Date granted: 2003/04/16
Application number: 00-2145
Application date: 2000/03/03
Approved denomination: **'Yahit'**
Tradename: **Chandelier Yellow**

SOYBEAN
(*Glycine max*)

➤ **Holder:** Hyland Seeds Division of W. G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim, Ontario
Certificate number: 1477
Date granted: 2003/03/23
Application number: 00-261
Application date: 2000/05/15
Approved denomination: **'Crown'**

STRAWBERRY
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec
Certificate number: 1476
Date granted: 2003/05/21
Application number: 00-2505
Application date: 2000/12/21
Approved denomination: **'Rosalyne'**

SUTERA
(*Sutera* Roth.)

➤ **Holder:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1472
Date granted: 2003/04/16
Application number: 00-2146
Application date: 2000/03/03
Approved denomination: **'Yagero'**
Tradename: **Penny Candy Rose**

➤ **Holder:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1473
Date granted: 2003/04/16
Application number: 00-2148
Application date: 2000/03/03
Approved denomination: **'Yagevi'**
Tradename: **Penny Candy Violet**

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Holder:** Saskatchewan Wheat Pool, Regina, Saskatchewan
Certificate number: 1463
Date granted: 2003/03/31
Application number: 01-2711
Application date: 2001/05/03
Approved denomination: **'Journey'**

➤ **Holder:**	NDSU Research Foundation, Fargo, North Dakota, U.S.A.
Agent in Canada:	Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Certificate number:	1478
Date granted:	2003/05/26
Application number:	01-2588
Application date:	2001/03/22
Approved denomination:	**'Alsen'**

2. APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING

ALSTROEMERIA
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Applicant:** Van Zanten Plants B.V., AG Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3692
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'Zalsamay'**
Tradename: Mayfair

➤ **Applicant:** Van Zanten Plants B.V., AG Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3693
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'Zalsasenan'**
Tradename: Senna

ANGELONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3598
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balangbeke'**
Tradename: Angelmist™ Basket Purple

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3599
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balangloud'**
Tradename: Angelmist™ White Cloud

APPLE
(*Malus* species Mill.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec
Application number: 03-3688
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'SJM15'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec
Application number: 03-3689
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'SJM167'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec
Application number: 03-3690
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'5218'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec
Application number: 03-3691
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'5198'**

ARGYRANTHEMUM
(*Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3484
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supaanem'**
Tradename: Twinkle White Flare

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3485
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supamon'**
Tradename: Twinkle Rose

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3486
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supalav'**
Tradename: Twinkle Lavender

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3487
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supait339'**
Tradename: Twinkle Sunburst White

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3488
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supacrest'**
Tradename: Galaxy Orchid

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3489
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supacre'**
Tradename: Twinkle Light Pink

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3490
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: **'Supasat'**
Tradename: Miss Pink

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3491
Application date: 2003/03/26
Proposed denomination: 'Supang'

➤ **Applicant:** Francis William Hammond, Narre Warren East, 3804 Victoria, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3595
Application date: 2003/05/05
Proposed denomination: **'M9/18D'**
Tradename: Gypsy Rose

➤ **Applicant:** Francis William Hammond, Narre Warren East, Victoria, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3596
Application date: 2003/05/05
Proposed denomination: **'M9/05'**
Tradename: Lavender Lass

ARGYRANTHEMUM
(*Argyranthemum x hybrida*)

➤ **Applicant:** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3631
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'OHAR01-241'**
Tradename: Madiera™ Monte Cream

➤ **Applicant:** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3632
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'OHAR01-245'**
Tradename: Madiera™ Machio Double Pink

➤ **Applicant:** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3633
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'OHAR01-240'**
Tradename: Madiera™ Santa Maria Pink

➤ **Applicant:** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3634
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'OHAR01-232'**
Tradename: Madiera™ Porto Santo White

ASTRANTIA
(*Astrantia major* L.)

➤ **Applicant:** Kwekerij de Boezem & Rijnbeek and Son B.V., Reenwijk, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3591
Application date: 2003/05/01
Proposed denomination: **'Abbey Road'**

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Alberta Agriculture, Food & Rural Development, Lacombe, Alberta
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3570
Application date: 2003/04/24
Proposed denomination: **'Bentley'**

➤ **Applicant:** Alberta Agriculture, Food & Rural Development, Lacombe, Alberta
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3571
Application date: 2003/04/24
Proposed denomination: **'Manny'**

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan (CDC), Saskatoon, Saskatchewan
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 03-3594
Application date: 2003/05/05
Proposed denomination: **'CDC Trey'**
Protective direction granted: 2003/05/05

BROMEGRASS HYBRID (SMOOTH X MEADOW)
(*Bromus riparius X B. inermis* Rehm. and Leyss., respectively)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3665
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'S9356I'**

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3495
Application date: 2003/03/28
Proposed denomination: **'Kakegawa S69'**
Tradename: Colorburst Melon

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3496
Application date: 2003/03/28
Proposed denomination: **'Kakegawa S71'**
Tradename: Colorburst Terracotta

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3497
Application date: 2003/03/28
Proposed denomination: **'Kakegawa S72'**
Tradename: Colorburst Chocolate

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3501
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEC03079'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3502
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEC03083'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3503
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEC03085'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 03-3476
Application date: 2003/03/13
Proposed denomination: **'NS2663'**
Protective direction granted: 2003/03/13

➤ **Applicant:** The Governors of the University of Alberta, Edmonton, Alberta
Application number: 03-3555
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Cougar CL'**

➤ **Applicant:** DSV Canada Inc., Winnipeg, Manitoba
Application number: 03-3566
Application date: 2003/04/16
Proposed denomination: **'6045CL'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 03-3590
Application date: 2003/04/30
Proposed denomination: **'SW Wizzard'**

APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3654
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS01-137 B-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3655
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS01-139 A-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3656
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS01-139 B-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3657
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS01-140 A-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3658
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS01-140 B-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3659
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS02-144 A-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3660
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS02-144 B-line'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3661
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS02-182'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3662
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS02-362'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3663
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'PPS02-364'**
Protective direction granted: 2003/05/06

➤ **Applicant:** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3664
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'PPS01-137 A-line'**
Protective direction granted: 2003/05/08

➤ **Applicant:** Advanta Canada Inc., Winnipeg, Manitoba
Application number: 03-3674
Application date: 2003/05/14
Proposed denomination: **'S0097'**

CHRYSANTHEMUM
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3547
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Apricot Yoelmira'**
Tradename: Apricot Elmira

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3548
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Coral Yograceland'**
Tradename: Coral Graceland

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3549
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Dark Yoelmira'**
Tradename: Dark Elmira

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3550
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Honey Yograceland'**
Tradename: Honey Graceland

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3551
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Red Yoauburn'**
Tradename: Red Auburn

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3552
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Yomanhattan'**
Tradename: Manhattan

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3553
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Yonorwich'**
Tradename: Norwich

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 03-3554
Application date: 2003/04/07
Proposed denomination: **'Yostlouis'**
Tradename: St. Louis

COLEUS
(*Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd.)

➤ **Applicant:** Ralph Repp, Waynesville, North Carolina, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3517
Application date: 2003/04/01
Proposed denomination: **'Sundancer6'**
Tradename: Rose Explosion

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3640
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Kakegawa CE1'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3641
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Kakegawa CE2'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3642
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Kakegawa CE3'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3643
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Kakegawa CE5'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3644
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Kakegawa CE8'**

CONEFLOWER
(*Echinacea purpurea* (L.) Moench)

➤ **Applicant:** Norseco Inc., Laval, Quebec
Application number: 03-3557
Application date: 2003/04/10
Proposed denomination: **'Norwhinat'**
Tradename: **White Natalie**

CORN
(*Zea mays* L.)

➤ **Applicant:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Monsanto Canada Inc., London, Ontario
Application number: 03-3695
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'I161538'**

➤ **Applicant:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Monsanto Canada Inc., London, Ontario
Application number: 03-3696
Application date: 2003/05/22
Proposed denomination: **'I294213'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Applicant:** Fa. Gebr. Verwer, Lisse, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3635
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Melody Lisa'**
Tradename: **Garden™ Melody Lisa**

DIANTHUS
(*Dianthus caryophyllus* L.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3504
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEN03030'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3505
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEN03031'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3506
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEN03057'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3507
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEN03060'**

DIASCIA
(*Diascia integerrima* Benth.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3605
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balwhiswhit'**
Tradename: Whisper™White

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3606
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balwincor'**
Tradename: Wink™Coral

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3607
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balwinstry'**
Tradename: Wink™Strawberry

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3608
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balwinlapi'**
Tradename: Wink™Lavender Pink

DIASCIA
(*Diascia x hybrida* Link et Otto)

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3492
Application date: 2003/03/27
Proposed denomination: **'Codilav'**
Tradename: Sun Chimes Lavender

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3493
Application date: 2003/03/27
Proposed denomination: **'Coditer'**
Tradename: Sun Chimes Terracotta

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3494
Application date: 2003/03/27
Proposed denomination: **'Codiusre'**
Tradename: Sun Chimes Red

FABA BEAN
(*Vicia faba* L. (sensu lato))

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Application number: 03-3528
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Ben'**

FLAX
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Applicant:** United Grain Growers Ltd., Morden, Manitoba
Application number: 03-3518
Application date: 2003/04/01
Proposed denomination: **'2090'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Morden, Manitoba
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3556
Application date: 2003/04/10
Proposed denomination: **'Prairie Blue'**

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan (CDC), Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3673
Application date: 2003/05/14
Proposed denomination: **'CDC Gold'**

GAILLARDIA
(*Gaillardia pulchella* Foug.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3609
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Baltorflam'**
Tradename: Torch™Flame

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3610
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Baltoryell'**
Tradename: Torch™ Yellow

HIBISCUS
(*Hibiscus moscheutos* L.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3685
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balhiblu'**
Tradename: Luna Blush

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3686
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balhibred'**
Tradename: Luna Red

IMPATIENS
(*Impatiens hawkeri* W. Bull.)

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3576
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisnics Redice'**
Tradename: Sonic Scarlet Ice

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3577
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisnics Zorred'**
Tradename: Sonic Zorro Red

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3578
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Hotpink'**
Tradename: Super Sonic Hot Pink 2004

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3579
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Tallred'**
Tradename: Super Sonic Red 2004

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3580
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Flame'**
Tradename: Super Sonic Flame

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3581
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisnics Redgold'**
Tradename: Sonic Red on Gold

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3582
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Lipink'**
Tradename: Super Sonic Light Pink

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3583
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisnics Burgsweet'**
Tradename: Sonic Sweet Burgundy

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3584
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Burgy'**
Tradename: Super Sonic Burgundy

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3585
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisnics Lil'**
Tradename: Sonic Lilac

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3586
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Chersweet'**
Tradename: Super Sonic Sweet Cherry

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3587
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Violeye'**
Tradename: Super Sonic Violet Ice

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3588
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Pinkeye'**
Tradename: Super Sonic Pink

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3589
Application date: 2003/04/29
Proposed denomination: **'Fisupnic Mapink'**
Tradename: Super Sonic Pastel Pink 2004

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3624
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balcelichey'**
Tradename: Celebration™Cherry Red Improved

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3625
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balcelipurt'**
Tradename: Celebration™Purple Star Improved

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3698
Application date: 2003/05/30
Proposed denomination: **'Balcebpiel'**
Tradename: Celebrette Pink Jewel

IMPATIENS
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3529
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE011037'**
Tradename: Paradise White Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3530
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE011210'**
Tradename: Paradise Cabernet Red

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3531
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE01997'**
Tradename: Painted Paradise Red Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3532
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE01956'**
Tradename: Pure Beauty Scarlet Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3533
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE011024'**
Tradename: Paradise Salmon Pink

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3534
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE01019'**
Tradename: Painted Paradise Orange Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3535
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE00031'**
Tradename: Pure Beauty White

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3536
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE00013'**
Tradename: Paradise Hot Rose Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3537
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE00600'**
Tradename: Pure Beauty Bright Orange

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3538
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'KIE01001'**
Tradename: Painted Paradise Lavender

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3680
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balgeoapt'**
Tradename: Georgia Apricot

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3681
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balgeocher'**
Tradename: Georgia Cherry

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3682
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balgeolem'**
Tradename: Georgia Lemon

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3683
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balgeopink'**
Tradename: Georgia Pink

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3684
Application date: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Balgeopeac'**
Tradename: Georgia Peach

IMPATIENS
(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

➤ **Applicant:** Tioga Genetics, Rogue River, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3498
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'TiLip II'**
Tradename: Tioga Light Pink

➤ **Applicant:** Tioga Genetics, Rogue River, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3499
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'TiCoPur'**
Tradename: Tioga Compact Purple

➤ **Applicant:** Tioga Genetics, Rogue River, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3500
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'TiWhit'**
Tradename: Tioga White

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3602
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balfiesink'**
Tradename: Fiesta™Sparkler Hot Pink

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3603
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balolerose'**
Tradename: Fiesta™Ole Rose

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3604
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balolespur'**
Tradename: Fiesta™Ole Sparkler Purple

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3620
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balpixdobur'**
Tradename: Pixie™Double Sparkler Burgundy

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3621
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balpixotse'**
Tradename: Pixie™Hot Rose

LANTANA
(*Lantana camara* L.)

➤ **Applicant:** Robert J. Roberson, Grain Valley, Missouri, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3574
Application date: 2003/04/30
Proposed denomination: **'Robmornrog'**
Tradename: Morning Glow Rose Gold

➤ **Applicant:** Robert J. Roberson, Grain Valley, Missouri, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3575
Application date: 2003/04/30
Proposed denomination: **'Robmornvan'**
Tradename: Morning Glow Vanilla

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3614
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balandflam'**
Tradename: Landmark™Flame

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3615
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balandgold'**
Tradename: Landmark™Gold

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3616
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balandfro'**
Tradename: Landmark™Lemon Frost

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3617
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balandpawn'**
Tradename: Landmark™Pink Dawn

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3618
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balandroglo'**
Tradename: Landmark™Rose Glow

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3619
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balucwhit'**
Tradename: Lucky™White

MUSTARD
(*Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. in Czern.)

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3592
Application date: 2003/05/01
Proposed denomination: **'J00D-09439'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3593
Application date: 2003/05/01
Proposed denomination: **'J00D-11028'**

NEMESIA
(*Nemesia caerulea* hybrid)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3521
Application date: 2003/04/03
Proposed denomination: **'Nemrowhi'**
Tradename: Antique Rose Sachet

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3623
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balarcomwit'**
Tradename: Aromatica™Compact White

NEMESIA
(*Nemesia foetens* Venten.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3622
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balartublue'**
Tradename: Aromatica™True Blue

NEMESIA
(*Nemesia hybrida*)

➤ **Applicant:** InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3597
Application date: 2003/05/05
Proposed denomination: **'N006-9BLAU'**

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3508
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEO03101'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3509
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEO03103'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3510
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEO03105'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3511
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEO03106'**

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum* hybrid)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3544
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Akavol'**
Tradename: Cape Daisy Volta Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3545
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Aknai'**
Tradename: Cape Daisy Nairobi Improved

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3546
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Iringa'**
Tradename: Cape Daisy Iringa

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Application number: 03-3473
Application date: 2003/03/07
Proposed denomination: **'Miser'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Application number: 03-3477
Application date: 2003/03/14
Proposed denomination: **'SW Midas'**

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 03-3525
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Tudor'**

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 03-3526
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Camry'**

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Application number: 03-3527
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Serena'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3573
Application date: 2003/04/28
Proposed denomination: **'SW Cabot'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium crispum - Hybridae* (P.J. Bergius) L'Hér.)

➤ **Applicant:** Elsner pac Jungpflanzen, Dresden, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3480
Application date: 2003/03/21
Proposed denomination: **'Pacburg'**
Tradename: Angeleyes Burgundy

➤ **Applicant:** Elsner pac Jungpflanzen, Dresden, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3481
Application date: 2003/03/21
Proposed denomination: **'Paceyes'**
Tradename: Angeleyes Light

➤ **Applicant:** Elsner pac Jungpflanzen, Dresden, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3482
Application date: 2003/03/21
Proposed denomination: **'Pacbicolor'**
Tradename: Angeleyes Bicolor

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3613
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balfansal'**
Tradename: Fantasia™Salmon

➤ **Applicant:** Silze GmbH & Co. KG, Weener, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3637
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Sil Claudio'**
Tradename: Fantasia™ Strawberry Sizzle

➤ **Applicant:** Silze GmbH & Co. KG, Weener, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3638
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balshopink'**
Tradename: Showcase™ Pink

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum x P. zonale*)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3611
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balcolreim'**
Tradename: Colorcade™Red Improved

PELARGONIUM
(*Pelargonium zonale* (L.) L'Hér.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3512
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEP03106'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3513
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEP03107'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3514
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLEP03111'**

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3612
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Baldesbrila'**
Tradename: Designer™Bright Lavender

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3630
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balshobrili'**
Tradename: Showcase™Bright Lilac

PETUNIA
(*Petunia hybrida* Hort. ex E. Vilm.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3626
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balrufimvein'**
Tradename: Ruffle™Plum Veined Improved

PHOTINIA
(*Photinia x fraserii* Dress.)

➤ **Applicant:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3647
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Cassini'**
Tradename: Pink Marble

PLUM
(*Prunus domestica* L.)

➤ **Applicant:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Application number: 03-3519
Application date: 2003/04/02
Proposed denomination: **'V70034'**

➤ **Applicant:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Application number: 03-3520
Application date: 2003/04/02
Proposed denomination: **'V72511'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 03-3678
Application date: 2003/05/20
Proposed denomination: **'Festival Pink'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 03-3679
Application date: 2003/05/20
Proposed denomination: **'Gala Red'**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:** HZPC Holland B.V., Joure, The Netherlands
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 03-3474
Application date: 2003/03/10
Proposed denomination: **'Red Scarlett'**

➤ **Applicant:** HZPC Holland B.V., Joure, The Netherlands
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 03-3475
Application date: 2003/03/11
Proposed denomination: **'Rodeo'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Lethbridge, Alberta
Application number: 03-3558
Application date: 2003/04/11
Proposed denomination: **'Alta Russet'**
Protective direction granted: 2003/04/11

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Lethbridge, Alberta
Application number: 03-3569
Application date: 2003/04/22
Proposed denomination: **'CV92028-1'**
Protective direction granted: 2003/04/22

➤ **Applicant:** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes, Quebec
Application number: 03-3649
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'Abeille'**

➤ **Applicant:** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes, Quebec
Application number: 03-3650
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'Altitude'**

➤ **Applicant:** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes, Quebec
Application number: 03-3651
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'Bombance'**

➤ **Applicant:** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes, Quebec
Application number: 03-3652
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'Peribonka'**

➤ **Applicant:** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes, Quebec
Application number: 03-3653
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'Fjord'**

➤ **Applicant:** Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, U.S.A.
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 03-3697
Application date: 2003/05/26
Proposed denomination: **'TX1523-1Ru/Y'**

ROSE
(*Rosa* hybrid)

➤ **Applicant:** Reinhard Noack, Gutersloh, Germany
Agent in Canada: Pan American Nursery Products Inc., Surrey, British Columbia
Application number: 03-3559
Application date: 2003/04/14
Proposed denomination: **'Noalesa'**
Tradename: Yellow Flower Carpet
Tradename: Noalin
Protective direction granted: 2003/03/26

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3666
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULac006'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3667
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULac015'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3668
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULac017'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3669
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULhi013'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3670
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULhi018'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3671
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULra023'**

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3672
Application date: 2003/05/08
Proposed denomination: **'POULra024'**

➤ **Applicant:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3675
Application date: 2003/05/15
Proposed denomination: **'Radcon'**
Tradename: Pink Knockout

➤ **Applicant:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3676
Application date: 2003/05/15
Proposed denomination: **'Radyod'**
Tradename: Blushing Knockout

➤ **Applicant:** Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Application number: 03-3677
Application date: 2003/05/16
Proposed denomination: **'POULac016'**

ROSE (*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3483
Application date: 2003/03/24
Proposed denomination: **'Radsun'**
Tradename: Carefree Beauty

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3522
Application date: 2003/04/03
Proposed denomination: **'Ruix001'**

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3523
Application date: 2003/04/03
Proposed denomination: **'Ruix002'**

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3524
Application date: 2003/04/03
Proposed denomination: **'Ruiw001'**

➤ **Applicant:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3645
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Meipreston'**
Tradename: Ruby Meidiland

➤ **Applicant:** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3646
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Meirameca'**
Tradename: Carefree Marvel

SNAPDRAGON
(*Antirrhinum* hybrid)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3539
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Sant 229A'**
Tradename: Crocodile Lilac

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3540
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Sant 214E'**
Tradename: Crocodile Deep Pink

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3541
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Sant 218A'**
Tradename: Crocodile White

➤ **Applicant::** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3542
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Sant 217A'**
Tradename: Crocodile Pink Bicolor

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3543
Application date: 2003/04/04
Proposed denomination: **'Sant 219A'**
Tradename: Crocodile Primrose Vein

➤ **Applicant:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3562
Application date: 2003/04/15
Proposed denomination: **'Yacrey'**
Tradename: Crocodile Rose & Yellow

➤ **Applicant:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3565
Application date: 2003/04/16
Proposed denomination: **'Yacoy'**
Tradename: Crocodile Orange and Red

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3478
Application date: 2003/03/18
Proposed denomination: **'X3604-B-B-11-5'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3479
Application date: 2003/03/18
Proposed denomination: **'X3555-B-B-15-5'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 03-3564
Application date: 2003/04/15
Proposed denomination: **'M709710'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 03-3568
Application date: 2003/04/23
Proposed denomination: **'S00-Z1'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 03-3572
Application date: 2003/04/24
Proposed denomination: **'S12-C2'**

➤ **Applicant:** CÉROM, St-Bruno-de-Montarville, Quebec
Application number: 03-3648
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Albinos'**

STRAWFLOWER / PAPER DAISY (*Bracteantha bracteata* Anderb. and Haegi)

➤ **Applicant:** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3639
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'OHB00-37.90'**
Tradename: Dreamtime™ Jumbo Yellow

SUTERA (*Jamesbrittenia* Kuntz)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3601
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balbreupla'**
Tradename: Breeze™Upright Lavender

➤ **Applicant:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3560
Application date: 2003/04/15
Proposed denomination: **'Yasal'**
Tradename: Penny Candy Salmon

➤ **Applicant:** A.T. Yates & Son, Cheshire, England, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 03-3561
Application date: 2003/04/15
Proposed denomination: **'Yasi'**
Tradename: African Sunset Improved

SUTERA (*Sutera cordata* Roth)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3600
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balablue'**
Tradename: Abunda™Blue

➤ **Applicant:** Fa. Wilhelm Schmülling, Billerbeck, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3636
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Blisch'**
Tradename: Abunda™ Giant White

SUTERA
(*Sutera diffusa* Roth.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3515
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLESU03186'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3516
Application date: 2003/03/31
Proposed denomination: **'KLESU03187'**

VERBENA
(*Verbena hybrida* Hort. ex Groenl. & Rumpler)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3627
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balazgagic'**
Tradename: Aztec™Grape Magic

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3628
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balazcherd'**
Tradename: Aztec™Cherry Red

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3629
Application date: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Balazpeach'**
Tradename: Aztec™Peach

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3563
Application date: 2003/04/15
Proposed denomination: **'BW 776'**

WHEAT
(*Triticum turgidum* var. *durum* (Desf.) Bowden)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3567
Application date: 2003/04/17
Proposed denomination: **'DT712'**

3. APPLICATIONS UNDER EXAMINATION

Any objections to the following applications must be submitted in writing to the Commissioner of Plant Breeders' Rights within six months from the date of publication of this issue, along with the appropriate fee.

Unless otherwise indicated, all colour measurements were determined by using the Royal Horticultural Society (RHS) colour chart.

The following provides detailed descriptions of the characteristics of the candidate varieties. The summaries compare the distinguishing characteristics of the candidate varieties to the reference varieties.

All photographs are supplied by the applicants. Where photographs do not adequately show distinctness, they may not be published.

APPLE
(*Malus* Mill.)

Proposed denomination: **'Hidala'** (see figure 1)
Tradename: Hillwell
Application number: 95-556
Application date: 1995/05/31
Applicant: John & Sue Hill, Hillwell Orchard, Hastings, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'Lochbuie Red Braeburn' and 'Braeburn'

Summary: *'Hidala' is an apple variety which produces large fruit that are greater in diameter than the reference varieties. The fruit of 'Hidala' are globose conical in shape whereas 'Braeburn' has ellipsoid conical fruit. There is more red overcolour on the fruit of 'Hidala' than there is on 'Lochbuie Red Braeburn' and the overcolour on the candidate variety is more intense than it is on 'Braeburn'. 'Hidala' has significantly longer sepals than either reference variety. The fruit of 'Hidala' colours earlier and is harvested slightly earlier than the reference varieties. The fruit setting efficiency of 'Hidala' is significantly higher than that of 'Lochbuie Red Braeburn' but lower than the fruit setting of 'Braeburn'.*

Description: 'Hidala' is a dessert apple variety which produces trees with an upright growth habit. The major fruit load is borne on spurs. One year old shoots have weakly shiny, purplish brown bark, strong pubescence on the upper half and moderately few medium to large sized lenticels. The bud tips are rounded and the buds are adpressed to the shoot with a small to medium sized bud support. In cross section the shoot tip leaves are concave to flat and have strong pubescence on the upper side. The lower side of the shoot tip leaves is purple-green with purple on the veins and petiole. There is no leaf lobing. The fully expanded leaves of 'Hidala' are medium sized and oriented upwards. The apex is cuspidate, the margins are crenate and the upper side is medium to dark green and moderately glossy. The lower side of the leaf is strongly pubescent. The stipules are moderately large. 'Hidala' flowers mid to late-season and has pinkish purple flower buds and a green pedicel. The flowers are single with overlapping petal margins. The petals are light pinkish purple on the upper side and purplish to white on the lower side. The upper side of the petals fade to white as the flower ages.

'Hidala' produces very large fruit that are asymmetrical and globose conical in shape. Slight ribbing is present. Crowning at the distal end is weak to medium. The eye is moderately large with an open aperture. The sepals are long and are free at the base (not overlapping). The eye basin of 'Hidala' is moderately deep and broad. The fruit stalk is long and medium in thickness. 'Hidala' has a wide and moderately deep stalk cavity. The surface of the fruit is smooth and the skin is moderately glaucous, with weak waxiness and medium thickness. The ground colour of the fully mature fruit is green-yellow and there is a moderately high amount (approximately 60%) of red to brownish red overcolour in a blush pattern with some moderate streaking. There is no russet on 'Hidala'. The lenticels are medium in size and intermediate in conspicuousness. 'Hidala' has yellowish coloured flesh and in cross-section the core line is moderately distinct. The locules are closed. 'Hidala' matures late-season and has good fruit setting. At maturity the seeds are brown and normal in shape. Browning of the flesh is moderately strong one hour after being cut. The fruit flesh is moderately coarse in texture, juicy and very firm. Sugar content in the fruit juice is high.

Origin and Breeding: 'Hidala' is a mutation of the variety 'Braeburn'. The mutation was discovered by the breeders in February 1981. It was in the form of a single limb mutation growing in the orchard in Hastings, New Zealand. After detection, it was reproduced in October 1983 by grafting budwood onto MM106 rootstock at the breeders' orchard.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Hidala' were conducted by the okanagan Plant Improvement Co. Ltd., (PICO) at the

Pacific Agri-Food Research Centre in Summerland, B.C. during 2002. The trials consisted of 6 trees, grown on M7 rootstock and planted in 1999. Measured characteristics were based on a minimum of 10 measurements.

Table 1: Comparison table for 'Hidala' and 'Lochbuie Red Braeburn'

	'Hidala'	'Lochbuie Red Braeburn'*	'Braeburn'*
Leaf length (mm)			
mean	90.5	95.4	91.1
std. deviation	5.93	4.55	4.86
Leaf width (mm)			
mean	53.6	58.7	57.8
std. deviation	2.41	3.89	3.43
Petiole length (mm)			
mean	23.6	24.8	24.5
std. deviation	1.71	1.99	2.46
Flower diameter (mm)			
mean	56.27	52.55	56.27
std. deviation	8.20	6.89	8.20
Fruit diameter (mm)			
mean	87.22	80.29	80.05
Percentage total sugars in fruit juice (%)			
	13.2	14.6	13.2

* reference varieties

Proposed denomination: **'Sciglo'** (see figure 2)
Trade name: Southern Snap
Application number: 96-928
Application date: 1996/08/13
Applicant: The Horticulture & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'Spartan', 'Royal Gala' and 'Splendour'

Summary: *'Sciglo' is an apple variety that produces trees with a more spreading growth habit than any of the reference varieties. The flowers bloom later than 'Spartan' and 'Royal Gala'. The fruit of 'Sciglo' are significantly smaller in diameter with less crowning at the distal end than the fruit of 'Royal Gala' and 'Splendour'. 'Sciglo' has a deeper eye basin than 'Spartan' and 'Royal Gala'. The overcolour of 'Sciglo' is bright red with darker red streaks whereas the overcolour of 'Spartan' is a dark purplish red or greyed red and for 'Splendour' the overcolour is lighter red. The fruit of 'Sciglo' matures earlier than all the reference varieties, up to a week before 'Royal Gala' in the Okanagan Valley.*

Description: 'Sciglo' is a dessert apple variety which produces trees with a spreading growth habit and many branches. The major fruit load is borne on spurs. One year old shoots have very shiny, purplish brown bark, medium pubescence on the upper half and a medium number of small lenticels. The branches are slightly thin and the internodes are short. The bud tips are pointed and the buds are adpressed to the shoot with a small sized bud support. In cross section the shoot tip leaves are concave and have no pubescence on the upper side. The lower side of the shoot tip leaves is purple-green with purple colouration at the apex and margins. There is no leaf lobing. The fully expanded leaves of 'Sciglo' are medium sized and oriented upwards and slightly outwards. The apex is cuspidate, the margins are crenate and the upper side is medium green and glossy. The lower side of the leaf is strongly pubescent. Anthocyanin colouration on the veins is weak. The leaf petioles are short and the stipules are moderately large. Bud burst for 'Sciglo' is early but full bloom occurs very late in the season. The variety has medium pink flower buds and a green pedicel. The flowers are average in size and single with overlapping petal margins. The petals are medium pink on the upper side and purplish pink fading to white on the lower side. The upper side of the petals fades to white as the flower ages.

'Sciglo' produces moderately large fruit that are symmetrical and globose in shape. Moderate ribbing is present. Crowning at the distal end is weak. The eye is moderately large with a half open aperture. The sepals are moderately short and touching at the base. The eye basin of 'Sciglo' is deep and narrow. The fruit stalk is medium in length and thickness and the stalk cavity is medium in width and moderately shallow. The surface of the fruit is smooth and the skin is moderately glaucous, with weak waxiness and medium in thickness. The ground colour of the fully mature fruit is yellow and there is a very high amount (approximately 85%) of bright red overcolour in a blush pattern with fine, darker red streaks in the blush. There is a low to medium amount of russet on 'Sciglo'. The lenticels are large and moderately prominent. 'Sciglo' has creamy yellow coloured flesh and in cross-section the core line is strongly distinct. The locules are open. 'Sciglo' matures mid-season (September 13-18 in Summerland, B.C.) and has good fruit setting. At maturity the seeds are dark brown and conical in shape. Browning of the flesh is moderately strong one hour after being cut. The fruit flesh is coarse in texture, juicy and firm. Sugar content in the fruit juice is very high.

Origin and Breeding: 'Sciglo' was selected in 1984 from a population of seedlings derived from crossing the apple varieties 'Gala' and 'Splendour'. The selection was carried out by HortResearch in Havelock North, New Zealand. The criteria for selection were bright red fruit colour, excellent eating quality and long storing ability. After selection the variety was increased by asexual propagation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Sciglo' were conducted by the okanagan Plant Improvement Co. Ltd., (PICO) at the Pacific Agri-Food Research Centre in Summerland, B.C. during 2002. The trials consisted of 6 trees, grafted onto M26 rootstock and planted in 1999. Measured characteristics were based on a minimum of 10 measurements.

Table 2: Comparison table for 'Sciglo'

	'Sciglo'	'Spartan'*	'Royal Gala'*	'Splendour'*
Petiole length (mm)				
mean	21.6	24.1	24.0	29.7
std. deviation	2.80	1.60	2.91	1.25
Flower diameter (mm)				
mean	50.6	56.5	51.0	49.5
std. deviation	3.05	7.54	5.65	3.54
Fruit diameter (mm)				
mean	76.9	79.1	81.2	90.9
Length of fruit stalk (mm)				
mean	21.8	18.7	25.5	26.7
Percentage total sugars in fruit juice (%)				
	18.4	12.2	14.9	13.4

* reference varieties

Proposed denomination: **'Sciros'** (see figure 3)
Trade name: Pacific Rose
Application number: 96-929
Application date: 1996/08/13
Applicant: The Horticulture & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'Mutsu', 'Ambrosia' and 'Splendour'

Summary: *'Sciros' is an apple variety that produces vigourous trees which begin flowering significantly later than 'Ambrosia' and 'Splendour'. The fruit of 'Sciros' is globose in shape, whereas 'Ambrosia' and 'Splendour' have globose conical shaped fruit. There is significantly more glaucosity (bloom) and less waxiness on the skin of 'Sciros' fruit than that of 'Ambrosia'. 'Sciros' has a creamy yellow ground colour with a moderately high amount of pinkish red overcolour. 'Ambrosia' has bright yellow ground colour with a medium amount of red overcolour. 'Mutsu' has greenish yellow ground colour and little or no overcolour. The overcolour of 'Splendour' is a much darker red than that of 'Sciros'. The fruit of 'Sciros' matures very late in the harvest season, about two weeks later than 'Ambrosia' in the Okanagan Valley.*

Description: 'Sciros' is a dessert apple variety which produces vigourous trees with an upright to spreading growth habit and many branches. The major fruit load is borne on spurs. One year old shoots have moderately shiny, purplish brown bark, moderately strong pubescence on the upper half and a medium number of small lenticels. The branches are slightly thin and the internodes are short. The bud tips are pointed and the buds are adpressed to the shoot with a medium sized bud support. In cross section the shoot tip leaves are concave to flat and have weak pubescence on the upper side. The lower side of the shoot tip leaves is purple-green with purple colouration on the veins and petiole. There is no leaf lobing. The fully expanded leaves of 'Sciros' are moderately large and oriented upwards and slightly outwards. The apex is acuminate, the margins are crenate and the upper side is medium to dark green and glossy. The lower side of the leaf is moderately pubescent. Anthocyanin colouration on the veins is weak. The leaf petioles are medium in length and the stipules are moderately small. Bud burst for 'Sciros' is mid to late-season but full bloom occurs very late in the season. The variety has white and purple flower buds and a green pedicel. The flowers are average in size and single with overlapping petal margins. The petals are light to medium pink on the upper side and purplish pink fading to white on the lower side. The upper side of the petals fade to white as the flower ages.

'Sciros' produces very large fruit that are symmetrical and globose in shape. Moderate ribbing is present. Crowning at the distal end is moderately strong. The eye is large and has an open aperture. The sepals are long and free (not touching). The eye basin of 'Sciros' is moderately deep and broad. The fruit stalk is medium in length and thickness and the stalk cavity is medium in width and depth. The surface of the fruit is smooth and the skin is glaucous, with no waxiness and moderate thickness. The ground colour of the fully mature fruit is creamy yellow and there is a moderately high amount (approximately 65%) of bright pink-red overcolour in a blush pattern. There is a low amount of russet on 'Sciros', positioned around the eye basin and on the cheeks. The lenticels are large and very prominent. 'Sciros' has creamy

yellow coloured flesh and in cross-section the core line is moderately distinct. The locules are open. 'Sciros' matures very late (end of October in Summerland, B.C.) and has good fruit setting. At maturity the seeds are brown and conical in shape. Browning of the flesh is strong one hour after being cut. The fruit flesh is moderately fine in texture, juicy and firm. Sugar content in the fruit juice is high.

Origin and Breeding: 'Sciros' was selected in 1984 from a population of seedlings derived from crossing the apple varieties 'Gala' and 'Splendour'. The selection was carried out by HortResearch in Havelock North, New Zealand. The criteria for selection were bright red fruit colour, excellent eating quality and long storing ability. After selection the variety was increased by asexual propagation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Sciros' were conducted by the okanagan Plant Improvement Co. Ltd., (PICO) at the Pacific Agri-Food Research Centre in Summerland, B.C. during 2002. The trials consisted of 6 trees, grafted onto M26 rootstock and planted in 1999. Measured characteristics were based on a minimum of 10 measurements.

Table 3: Comparison table for 'Sciros'

	'Sciros'	'Ambrosia'*	'Splendour'*	'Mutsu'*
Petiole length (mm)				
mean	26.6	26.3	29.7	20.4
std. deviation	2.59	2.00	1.25	1.43
Flower diameter (mm)				
mean	56.9	57.4	49.5	55.0
std. deviation	5.09	3.69	3.54	4.11
Fruit diameter (mm)				
mean	92.4	82.8	90.9	94.8
Length of fruit stalk (mm)				
mean	23.6	23.9	26.7	32.0
Percentage total sugars in fruit juice (%)				
	13.6	14.0	13.4	13.8

* reference varieties

Proposed denomination: **'Huaguan'** (see figure 4)
Application number: 96-972
Application date: 1996/11/27
Applicant: Professor Wang Yu-Lin, Auckland, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'Spartan', and 'Fuji#2'

Summary: *'Huaguan' is an apple variety that produces lower vigour trees than 'Spartan' and 'Fuji#2'. The fruit of 'Huaguan' is smaller than that of the reference varieties. 'Huaguan' has a narrower and more shallow eye basin than 'Fuji#2' and a significantly narrower stalk cavity. There is less glaucosity (bloom) on the skin of 'Huaguan' than the references. 'Huaguan' has a green-yellow ground colour whereas 'Spartan' and 'Fuji#2' have a green ground colour. 'Huaguan' has less overcolour and a higher amount of russet than the reference varieties. The flesh is yellowish, whereas it is white in 'Spartan'. The core line is less distinct in 'Huaguan' than 'Fuji#2'. 'Huaguan' matures very late in the harvest season, up to a month after 'Spartan' in the Okanagan Valley.*

Description: 'Huaguan' is a dessert apple variety which produces trees with an upright to spreading growth habit and a low frequency of branching. The trees have weak to moderate vigour. The major fruit load is borne on spurs. One year old shoots have moderately shiny, dark brown bark, strong pubescence on the upper half and many small lenticels. The branches are slightly thin and the internodes are short. The bud tips are pointed and the buds are adpressed to the shoot with a small bud support. In cross section the shoot tip leaves are concave and have no pubescence on the upper side. The lower side of the shoot tip leaves is green with no other colouration. There is no leaf lobing. The fully expanded leaves of 'Huaguan' are moderately small and oriented upwards. The apex is cuspidate, the margins are serrate and the upper side is medium to dark green and weakly glossy. The lower side of the leaf is moderately pubescent. Anthocyanin colouration on the veins is weak. The leaf petioles are moderately long and the stipules are medium in size. Bud burst for 'Huaguan' is mid-season and flowering begins moderately late in the season. The variety has red-purple flower buds and a green pedicel. The flowers are average in size and single with overlapping petal margins. The petals are light to medium purplish pink on the upper side and red-purple fading to white on the lower side. The upper side of the petals fade to white as the flower ages.

'Huaguan' produces medium sized fruit that are symmetrical and globose conical to short globose conical in shape. There is no ribbing. Crowning at the distal end is weak. The eye is small and has a closed aperture. The sepals are moderately short and overlapping. The eye basin of 'Huaguan' is moderately deep and narrow. The fruit stalk is medium in length and thickness and the stalk cavity is narrow and moderately shallow. The surface of the fruit is smooth and the skin is moderately glaucous, with no waxiness and moderate thickness. The ground colour of the fully mature fruit is green-yellow and there is a medium amount (approximately 65%) of red overcolour in a blush and flecked pattern. There is a low

amount of russet on 'Huaguan', positioned around the eye basin, stalk cavity and on the cheeks. The lenticels are medium sized and slightly prominent. 'Huaguan' has yellowish coloured flesh and in cross-section the core line is moderately distinct. The locules are closed. 'Huaguan' matures very late (mid to late October in Summerland, B.C.) and has intermediate fruit setting. At maturity the seeds are dark brown and conical in shape. Browning of the flesh is weak one hour after being cut. The fruit flesh is moderately fine in texture, juicy and firm. Sugar content in the fruit juice is very high.

Origin and Breeding: 'Huaguan' is the result of a cross between 'Golden Delicious' (female parent) and 'Fuji' (male parent). Artificial hybridization was carried out in the spring of 1976 at the Zenghou Fruit Research Institute by the breeder. The seeds were harvested the following autumn and then planted out to form a population for selection of new cultivars. From this population, one seedling in particular showed desirable characteristics such as attractive appearance, large size, crisp fruit texture, pleasant flavour and long storage ability. This selection was named 'Huaguan'.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Huaguan' were conducted by the okanagan Plant Improvement Co. Ltd., (PICO) at the Pacific Agri-Food Research Centre in Summerland, B.C. during 2002. The trials consisted of 5 trees, grafted onto M26 rootstock and planted in the spring of 2000. Measured characteristics were based on a minimum of 10 measurements.

Table 4: Comparison table for 'Huaguan'

	'Huaguan'	'Spartan'*	'Fuji#2'*
Length of internodes on one-year old shoot (mm)			
mean	17.5	28.1	40.1
std. deviation	4.53	8.97	7.10
Leaf length (mm)			
mean	75.4	81.8	92.6
std. deviation	7.37	3.12	8.28
Leaf width (mm)			
mean	49.6	64.2	69.4
std. deviation	3.78	3.16	13.53
Flower diameter (mm)			
mean	47.5	56.5	46.6
std. deviation	5.58	7.54	10.23
Fruit diameter (mm)			
mean	67.5	79.1	82.4
Percentage total sugars in fruit juice (%)			
	17.4	12.2	14.4

* reference varieties

Proposed denomination: **'Lochbuie Red Braeburn'** (see figure 1)
Application number: 97-1084
Application date: 1997/05/30
Applicant: William Turner, Lochbuie Orchard, Christchurch, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'Hidala' and 'Braeburn' (see table 1 on page 32)

Summary: *'Lochbuie Red Braeburn' is an apple variety which produces globose conical fruit, similar in shape to 'Hidala' but different from 'Braeburn' which has ellipsoid conical fruit. When grown in the Okanagan Valley the fruit of 'Lochbuie Red Braeburn' develops a significantly lower amount of overcolour than either 'Hidala' or 'Braeburn'. The overcolour is less intense than 'Hidala' which has dark red to brownish red overcolour and 'Braeburn' which has a pink-red to bright red overcolour. 'Lochbuie Red Braeburn' fruit colour does not develop as early as the colour of 'Hidala'. The fruit of 'Lochbuie Red Braeburn' matures later than 'Hidala'.*

Description: 'Lochbuie Red Braeburn' is a dessert apple variety which produces moderately vigourous trees with an upright growth habit. The major fruit load is borne on spurs. One year old shoots have weakly shiny, purplish brown bark, strong pubescence on the upper half and a medium number of moderately large sized lenticels. The bud tips are rounded and the buds are adpressed to the shoot with a small to medium sized bud support. In cross section the shoot tip leaves are concave to flat and have strong pubescence on the upper side. The lower side of the shoot tip leaves is purple-green with purple on the veins and petiole. There is no leaf lobing. The fully expanded leaves of 'Lochbuie Red Braeburn' are medium sized and oriented upwards. The apex is cuspidate, the margins are crenate and the upper side is medium to dark green and moderately glossy. The lower side of the leaf is very strongly pubescent. The stipules are moderately large. 'Lochbuie Red Braeburn' flowers mid to late-season and has dark pink and white flower buds and a green pedicel. The flowers are single with touching petal margins. The petals are white on the upper side and purplish to white on the lower side.

'Lochbuie Red Braeburn' produces large fruit that are asymmetrical and globose conical in shape. Slight ribbing is present. Crowning at the distal end is weak to medium. The eye is moderately large with an open aperture. The sepals are medium in length and are free at the base (not overlapping). The eye basin of 'Lochbuie Red Braeburn' is deep and broad. The fruit stalk is moderately short and medium in thickness. 'Lochbuie Red Braeburn' has a moderately shallow and broad stalk cavity. The surface of the fruit is smooth and the skin is moderately glaucous, with weak waxiness and medium thickness. The ground colour of the fully mature fruit is green-yellow and there is a low to medium amount (approximately 48%) of orange-red to brownish red overcolour in a faded blush pattern with some very thin, faint streaking. There is no russet on 'Lochbuie Red Braeburn'. The lenticels are medium in size and intermediate in prominence. 'Lochbuie Red Braeburn' has yellowish coloured flesh and in cross-section the core line is moderately distinct. The locules are closed. 'Lochbuie Red Braeburn' matures very late in the harvest season and has poor to medium fruit setting. At maturity the seeds are brown and normal in shape. Browning of the flesh is moderately strong one hour after being cut. The fruit flesh is moderately coarse in texture, juicy and very firm. Sugar content in the fruit juice is high.

Origin and Breeding: 'Lochbuie Red Braeburn' originated as a mutation which was discovered in 1985 on an apple tree that had been grafted over to the 'Braeburn' variety on the grower's orchard near Christchurch, New Zealand. Two of the grafted 'Braeburn' branches were producing apples that were distinctly redder than the standard 'Braeburn' variety. Graftwood from these branches was taken in 1987 and used to produce 27 further trees on MM106 rootstock. The high colour fruit characteristic was consistent in all these trees. This block was then used as a budwood source for the future development of the variety.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Lochbuie Red Braeburn' were conducted by the okanagan Plant Improvement Co. Ltd., (PICO) at the Pacific Agri-Food Research Centre in Summerland, B.C. during 2002. The trials consisted of 5 trees, grafted onto M7 rootstock and planted in 1999. Measured characteristics were based on a minimum of 10 measurements.

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

Proposed denomination: **'NS4303'** (see figure 5)
Application number: 02-3005
Application date: 2002/03/04
Applicant: Pioneer Hi-Bred Production Ltd, Georgetown, Ontario
Breeder: Pioneer Hi-Bred Production Ltd, Georgetown, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: '45A51', '45A54', '46A65', 'Legacy', and 'NS4304' (see table 5 on page 38)

Summary: *'NS4303' has a wider cotyledon than 'NS4304' and '46A65'. The cotyledon is longer in 'NS4303' than in 'NS4304', '45A51', '45A54', '46A65' and 'Legacy'. 'NS4303' has a shorter leaf than '45A54'. 'NS4303' has a longer petiole than 'NS4304'. The flower petal is shorter in 'NS4303' than in '46A65'. 'NS4303' has a narrower flower petal than 'NS4304', '45A54', '46A65' and 'Legacy'. The silique length is shorter in 'NS4303' than in '45A54' and 'Legacy' but longer than in 'NS4304'. 'NS4303' has a wider silique than 'NS4304'. 'NS4303' has a shorter beak than '45A51', '46A65' and 'Legacy' but longer than 'NS4304'. The pedicel is shorter in 'NS4303' than in '46A65'. 'NS4303' produces a taller plant than '45A51', '45A54' and 'Legacy'. 'NS4303' is susceptible to glyphosate while '45A51' and '45A54' are resistant.*

Description: 'NS4303' is a spring canola variety. The cotyledons are wide and long in length. Leaf blades are medium to dark green with few to medium number of rounded to sharp lobes which are shallow to medium in depth. The leaves are medium in length and width with a long petiole. The yellow flower petals are medium in length and narrow in width. The anthers shed pollen. The erect to semi-erect siliques are short to medium in length and medium in width with a medium beak and short pedicel. The plants are medium in height and mature mid-season. Seed colour is brown to black. 'NS4303' has very low erucic acid content and medium glucosinolates. The chlorophyll content is medium in 'NS4303'. 'NS4303' is susceptible to glyphosate and imidazolinone.

Origin and Breeding: 'NS4303' was developed by pedigree selection at Georgetown Research Center of Pioneer Hi-Bred Production Ltd. in 1998. The F_1 plants were grown in the greenhouse and were harvested in bulk. The F_2 plants were also grown in the greenhouse and plants were individually harvested to produce F_3 lines. The F_3 lines were evaluated in the 1999 nursery in Georgetown where the lines were selected for uniformity, early maturity, high oil, high protein, low glucosinolates and general vigour. The remnant seed of the F_3 line was simultaneously planted in the greenhouse and were selected based on marker assisted selection. Each selfed F_3 plant was harvested individually and then the F_4 rows were grown in isolation in Chile to observe for general vigour and uniformity. The F_5 seed produced under large bags was bulked from about 30 rows. The F_5 seed became the source of breeder seed.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted at Georgetown Research Center of Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown, Ontario in the summers of 2000 and 2002. Each plot consisted of two rows spaced 0.5 m apart and 2 m in length, replicated three times in a Randomized Complete Block Design (RCBD).

Proposed denomination: **'NS4304'** (see figure 6)
Application number: 02-3006
Application date: 2002/03/04
Applicant: Pioneer Hi-Bred Production Ltd, Georgetown, Ontario
Breeder: Pioneer Hi-Bred Production Ltd, Georgetown, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: '46A65', 'Legacy', '46A76', 'Q2' and 'NS4303' (see table 5 on page 38)

Summary: *'NS4304' has a narrower and shorter cotyledon than 'NS4303'. 'NS4304' has a shorter petiole than '46A76'. The flower petal length is shorter in 'NS4304' than in '46A65'. 'NS4304' has a wider flower petal than 'NS4303'. 'NS4304' has a shorter silique and beak than 'NS4303', '46A65', '46A76', 'Legacy', and 'Q2'. The silique width is narrower in 'NS4304' than in 'NS4303', '46A65', 'Legacy', and 'Q2'. 'NS4304' has a shorter pedicel than '46A65', and 'Legacy'. 'NS4304' is susceptible to imidazolinone while '46A76' is resistant.*

Description: 'NS4304' is a spring canola variety. The cotyledons are medium in width and length. Leaf blades are medium to dark green with very few, rounded to sharp lobes which are shallow to medium in depth. The leaves are medium in length and width with a very short petiole. The yellow flower petals are medium in length and narrow to medium in width. The anthers shed pollen. The erect to semi-erect siliques are very short in length and narrow in width with a short beak and short to medium pedicel length. The plants are short in height and mature mid-season. Seed colour is brown to black. 'NS4304' has very low erucic acid content and medium glucosinolates. The chlorophyll content is medium in 'NS4304'. 'NS4304' is susceptible to glyphosate and imidazolinone.

Origin and Breeding: 'NS4304' was developed by pedigree selection at Georgetown Research Center of Pioneer Hi-Bred Production Ltd. in 1998. The F_1 plants were grown in the greenhouse and were harvested in bulk. The F_2 plants were also grown in the greenhouse, and plants were individually harvested to produce F_3 lines. The F_3 lines were evaluated in the 1999 nursery in Georgetown where the lines were selected for uniformity, early maturity, high oil, high protein, low glucosinolates and general vigour. The remnant seed of the F_3 line was simultaneously planted in the greenhouse and were selected based on marker assisted selection. Each selfed F_3 plant was harvested individually and then the F_4 rows were grown in isolation in Chile to observe for general vigour and uniformity. The F_5 seed produced under large bags was bulked from about 30 rows. The F_5 seed became the source of breeder seed.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted at Georgetown Research Center of Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown, Ontario in the summers of 2000 and 2002. Each plot consisted of two rows spaced 0.5 m apart and 2 m in length, replicated three times in a RCBD.

Table 5: Comparison table for 'NS4303' and 'NS4304'

	'NS4303'a	'NS4304'b	'45A51'*a	'45A54'*a	'46A65'*ab	'Legacy'*ab	'46A76'*b	'Q2'*b
Cotyledon width (mm)								
mean	21.66	19.59	20.13	20.86	18.30	19.20	17.55	20.20
significance		p<.001a	ns	ns	p<.001a	ns	ns	ns
Cotyledon length (mm)								
mean	10.30	8.83	9.96	9.83	8.99	8.71	8.55	9.88
significance		p<.001a	ns	p<.001	p<.001a	p<.001a	ns	ns
Leaf length (cm)								
mean	22.94	22.18	24.32	26.05	23.27	20.16	23.77	24.72
significance		ns	ns	p<.001	ns	ns	ns	ns
Petiole length (cm)								
mean	10.46	4.61	9.22	13.70	7.66	6.72	13.99	6.46
significance		p<.001a	ns	ns	ns	ns	p<.001	ns
Flower petal length (mm)								
mean	12.43	13.00	11.83	12.20	13.93	12.73	13.35	13.60
significance		ns	ns	ns	p<.001a	ns	ns	ns
Flower petal width (mm)								
mean	5.08	6.17	5.22	5.56	6.38	5.97	5.85	6.23
significance		p<.001a	ns	p<.001	p<.001a	p<.001a	ns	ns
Silique length (mm)								
mean	52.99	48.45	56.59	56.49	54.03	60.54	56.83	65.64
significance		p<.001a	ns	p<.001	p<.001b	p<.001ab	p<.001	p<.001
Silique width (mm)								
mean	4.91	4.28	5.13	5.10	4.89	5.20	4.82	4.88
significance		p<.001a	ns	ns	p<.001b	p<.001b	ns	p<.001
Beak length (mm)								
mean	8.51	7.35	10.52	8.88	10.51	10.08	8.46	9.09
significance		p<.001a	p<.001	ns	p<.001ab	p<.001ab	p<.001	p<.001
Pedicel length (mm)								
mean	19.60	18.70	18.75	21.79	23.32	21.97	17.59	18.62
significance		ns	ns	ns	p<.001ab	p<.001b	ns	ns
Plant height (cm)								
mean	103.73	97.25	94.57	95.00	103.43	95.60	104.42	97.77
significance		ns	p<.001	p<.001	ns	p<.001a	ns	ns

* reference varieties
p - probability value
ns - not significant

Means are based on a two year average of 60 plant parts for silique traits, 30 plants for leaf and petal characteristics and 50 cotyledon measurements. Differences are significant at the 2% probability level based on LSD values.

Proposed denomination: **'43A56'** (see figure 7)
Previous denomination: NS4571
Application number: 02-3065
Application date: 2002/04/26
Applicant: Pioneer Hi-Bred Production Ltd, Georgetown, Ontario
Breeder: Pioneer Hi-Bred Production Ltd, Georgetown, Ontario

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: '45A01', 45A51', '45A71'and 'Excel'

Summary: *'43A56' has narrower flower petals than 'Excel'. '43A56' has a narrower silique than '45A71'. The beak in '43A56' is longer than in '45A01' but shorter than in '45A51' and '45A71'. '43A56' is resistant to glyphosate while '45A01', '45A71', and 'Excel' are susceptible. '43A56' is susceptible to imidazolinone while '45A71' is resistant.*

Description: '43A56' is an open pollinated Roundup Ready spring canola variety. The cotyledons are medium in width and long. Leaf blades are medium to dark green with few sharp lobes which are shallow to medium in depth. The leaves are medium in length and width with a medium length petiole. The yellow flower petals are medium in length and narrow in width. The anthers shed pollen. The semi-erect to horizontal siliques are short to medium in length and narrow in width with a short to medium beak and pedicel length. The plants are short in height and mature very early in the season. Seed colour is brown to black. '43A56' has very low erucic acid content and low glucosinolates. The chlorophyll content is medium in '43A56'. '43A56' is resistant to glyphosate and susceptible to imidazolinone.

Origin and Breeding: '43A56' was developed using the pedigree method at the Edmonton Research Center of Pioneer Hi-Bred International Inc. in 1998. Single plants and their progenies were selected for early maturity, lodging resistance, high oil, high protein, general vigor and uniformity. '43A56' was first evaluated in the preliminary yield tests in 2000, before it was entered in the wide area trials of Pioneer Hi-Bred in 2001. It was tested in the Western Canadian Public Coop test in 2002.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted at Georgetown Research Center of Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown, Ontario in the summers of 2001 and 2002. Each plot consisted of two rows spaced 0.5 m apart and 2 m in length, replicated three times in a RCBD.

Table 6: Comparison table for '43A56'

	'43A56'	'45A01'*	'45A51'*	'45A71'*	'Excel'*
Flower petal width (mm)					
mean	5.23	5.62	5.45	5.47	5.93
signif.		ns	ns	ns	p<.001
Silique width (mm)					
mean	4.39	4.72	4.74	4.90	4.42
signif.		ns	ns	p<.001	ns
Beak length (mm)					
mean	7.63	6.43	9.39	8.63	7.92
signif.		p<.001	p<.001	p<.001	ns

* reference varieties
p - probability value
ns - not significant

Means are based on a two year average of 60 plant parts for silique traits, 30 plants for leaf and petal characteristics and 50 cotyledon measurements. Differences are significant at the 2% probability level based on LSD values.

CHERRY
(*Prunus avium* L.)

Proposed denomination: **'13S2101'** (see figure 8)
Application number: 02-3216
Application date: 2002/08/16
Applicant: Agriculture & Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia
Agent in Canada: okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland, British Columbia

Varieties used for comparison: 'Sweetheart' and '13S2009' (trade name Staccato)

Summary: *'13S2101' is a sweet cherry variety which produces spreading trees, whereas the growth habit of trees of 'Sweetheart' is more upright. '13S2101' does not bear as heavy a crop of fruit as the reference varieties. However, the average fruit weight of '13S2101' is higher than that of '13S2009'. The fruit of '13S2101' differs in shape from the two reference varieties. '13S2101' is elongated cordate in shape, '13S20209' has compressed cordate fruit and 'Sweetheart' fruit are round. The fruit skin colour of*

'13S2101' is red at maturity, whereas the references have red to dark red-purple fruit. The flesh of '13S2101' is also red and not as dark as the references. '13S2101' is a very late maturity cherry variety. In the Okanagan Valley the fruit is harvested 2 to 4 days later than '13S2009' and about 12 to 16 days after 'Sweetheart'.

Description: '13S2101' is a sweet cherry variety which has normal type trees that are spreading in habit. The one-year old shoots have little or no anthocyanin colouration and are erect to horizontal in attitude and moderate in thickness. The internodes of the one-year shoots are moderately short, pubescence is absent to very weak and there is a medium to large number of lenticels. The vegetative buds are large and conical in shape and are slightly held out from the shoot. The bud support is moderately large. On the current year's shoots the pubescence is absent to very weak and anthocyanin colouration is weak.

The leaves of '13S2101' are horizontal to slightly downwards in relation to the shoot and are elliptical with a rounded base. The angle of the leaf tip is acute and the shape of the apex is cuspidate to acuminate. The profile of the leaf is concave. '13S2101' has weak pubescence on the lower side of the leaf and the upper side is dark green, moderately glossy with no anthocyanin. The margins are dentate, with medium to deep indentations. Before leaf fall the leaves are yellow green. The petioles of '13S2101' have anthocyanin colouration and usually more than two nectaries which are yellow and orange in colour and kidney shaped.

'13S2101' has sparse to medium flowering density and produces single flowers in clusters. The buds are white. The flower pedicel is moderately thin with no pubescence. '13S2101' has small to medium sized, broad elliptic petals which are free (not touching). '13S2101' produces pollen. The pistil is normal and the ovary has no pubescence.

'13S2101' produces medium to large sized fruit which are elongate to cordate in shape. In lateral view '13S2101' fruit are round with the largest diameter towards the middle. There are a moderate number of light coloured, small dots on the skin. The fruit skin is a wine red colour and the suture has low prominence. The fruit juice of '13S2101' is red in colour and the flesh is red. The fruit is firm and high in sweetness. '13S2101' is moderately juicy. The fruit apex is flat to slightly pointed and susceptibility to rain induced cracking is moderately low. The fruit stalk is long and moderately thick.

The stone of '13S2101' is large and semi-adherent to the flesh. In lateral view it is symmetrical and spherical to elongate in shape. In front view it is ovate and in basal view the stone is round. The keel is moderately developed.

'13S2101' has a moderate precocity of fruit bearing. Leaf bud burst is earlier than the beginning of full flowering. The variety is self-fertile. Time of flowering is late and the fruit matures very late (last week of August in Summerland, B.C.). Fruit setting of '13S2101' is low to medium and leaf fall occurs late in the season.

Origin and Breeding: '13S2101' originated from a cross made at the Pacific Agri-Food Research Centre, Summerland, B.C. in 1982. It resulted from an open pollination of the blossoms of the variety 'Sweetheart'. The variety was selected in 1991 and designated 13S-21-01. Five propagations were made in 1991 on *Prunus avium* rootstock and planted out in a trial block at the Summerland Research Centre. Evaluation on the selection began upon fruiting. The variety was selected based on maturity date, fruit size, firmness, field splits, fruit shape, skin and flesh colour, fertility, lustre and productivity and precocity.

Tests and Trials: Tests and trials for '13S2101' were conducted by PICO (okanagan Plant Improvement Co. Ltd.) at Clive Sutherland's orchard in Peachland, B.C. during 2002. The trials consisted of twenty-two trees of the candidate variety and 10 trees of each of the reference varieties. All varieties were grafted onto Mazzard rootstock and planted in 1998. Measured characteristics were based on a minimum of 15 measurements.

Table 7: Comparison table for '13S2101'

	'13S2101'	'Sweetheart'*	'13S2009'*
Leaf length (mm)			
mean	162.1	173.5	158.6
std. deviation	6.24	11.00	8.72
Leaf width (mm)			
mean	71.3	75.0	73.7
std. deviation	6.05	6.62	5.04
Length of petiole (mm)			
mean	33.9	40.6	37.9
std. deviation	3.72	2.56	4.05
Length of fruit stalk (mm)			
mean	61.4	46.2	56.9
std. deviation	6.01	4.95	6.54
Average fruit weight (grams)			
mean	10.3	10.6	9.5
number measured	55	50	50
Soluble solids (%)			
mean	20.60	20.80	20.40

* reference varieties

CORN
(Zea mays L.)

Proposed denomination: **'I181664'** (see figure 9)
Application number: 01-2809
Application date: 2001/08/21
Applicant: DEKALB Genetics Corporation, DeKalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., Chatham, Ontario

Variety used for comparison: '3AZA1'

Summary: *Principal ear insertion of 'I181664' is higher than that of '3AZA1'. 'I181664' has no anthocyanin colouration of the glume ring, glume tip and body whereas it is weak in '3AZA1'. The attitude of the lateral branches of the tassel of 'I181664' are erect to semi-erect whereas they are semi-erect to horizontal in '3AZA1'.*

Description: 'I181664' is an inbred corn variety. At inflorescence emergence, the angle of the leaf with the stalk is semi-erect (30-40°). After male flowering, the leaf blade is medium to wide with no anthocyanin colouration of the sheath. There are few leaves per stem (11 - 13) with no anthocyanin colouration of the stem nodes and internodes.

Tassel emergence and male flowering of 'I181664' is early to mid-season. The intensity of anthocyanin colouration on the ring at the base of the glumes, at the tips and on the bodies of the glumes and on the anthers is absent. At the end of male flowering, the main axis above the lowest side branch is medium to long and long above the upper side branch. Density of the branches on the main axis of the tassel is sparse to intermediate. There are few (3-10) erect to semi-erect lateral branches with a medium size angle (30-60°) between the main axis and the lateral branches.

The silks have no anthocyanin colouration one to two days after emergence and two to three days after emergence. The shank or peduncle is long to very long.

The percentage of plants with ear wings is very low. The ear of 'I181664' is cylindrical-conical in shape with a medium-sized diameter in the middle-third of the ear (including kernels) and a small to medium diameter at mid-cob (excluding kernels). There are a medium number of rows (13-14) of kernels. Anthocyanin colouration of cob glumes is present. The wedge-shaped kernels of 'I181664' are a flint/dent type and yellow-orange in colour on the dorsal side. The kernel tip is yellow.

Origin and Breeding: 'I181664' was derived from the cross '3AVB3' x '3AZA1' made in the summer of 1994. Seed was grown ear-to-row from 1994 to 1998. In the summer of 1997, corn inbred 'I181664' was coded and reproduced by self-pollination for the past two seasons. Selection criteria included yield in hybrid combination, earliness and high test weight.

Tests and Trials: Tests and trials for 'I181664' were conducted at London, Ontario in 2001 and 2002. The trials consisted of two replicates with two rows per replicate. The rows were 4.5 meters long with approximately 22 plants per row.

Table 8: Comparison table for 'I181664'

	'I181664'	'3AZA1'*
Plant height (cm)		
mean	184.5	180.9
std. deviation	9.3	11.27
Height of principle ear insertion (cm)		
mean	59.8	44.35
std. deviation	7.14	8.06
Number of days from emergence to 50% of plants in silk		
mean	76.5	78.5

* reference variety

Proposed denomination: **'I325350'** (see figure 10)
Application number: 01-2810
Application date: 2001/08/21
Applicant: DEKALB Genetics Corporation, DeKalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., Chatham, Ontario

Variety used for comparison: '3AZA1'

Summary: *The glume tips and bodies of 'I325350' have no anthocyanin colouration whereas it is weak in '3AZA1'. The branches of the tassels of 'I325350' are semi-erect whereas they are semi-erect to horizontal in '3AZA1'. The silks of 'I325350' are green with a hint of pink and tan whereas the silks of '3AZA1' are green. The ears of 'I325350' are longer than those of '3AZA1'.*

Description: 'I325350' is an inbred corn variety. At inflorescence emergence, the angle of the leaf with the stalk is semi-erect (30-40°). After male flowering, the leaf blade is

medium in width with no anthocyanin colouration of the sheath. There are few leaves per stem (11 - 13) with no anthocyanin colouration of the stem nodes and internodes.

Tassel emergence and male flowering is mid-season for '1325350'. There is no anthocyanin colouration on the ring at the base of the glumes, at the tips and on the bodies of the glumes and on the anthers. At the end of male flowering, the main axis above the lowest side branch and above the upper side branch is medium to long. Branches on the main axis of the tassel are sparse to intermediate. There are few (3-10) semi-erect lateral branches with a medium size angle (30-60°) between the main axis and lateral branches.

Anthocyanin colouration of the silks is absent one to two days after emergence and green with touches of pink and tan, two to three days after emergence. The shank or peduncle is very long. There is a medium to high amount of plants with ear wings. The ear of '1325350' is cylindrical-conical in shape with a small to medium diameter in the middle-third of the ear including and excluding kernels. There are few rows of kernels (10-12). Anthocyanin colouration of cob glumes is present. The wedge-shaped kernels of '1325350' are a flint/dent type (50/50%) and yellow-orange in colour on the dorsal side. The kernel tip is yellow.

Origin and Breeding: '1325350' was derived from the cross of the inbred lines '3AVB3' and '3AZA1' made in the summer of 1994. Seed was grown and selfed from 1994 to 2000 with the final selection made and bulked in summer 1994. Selection criteria included greater combining ability, improved stalk quality, plant health, intactness and grain quality.

Tests and Trials: Tests and trials for '1325350' were conducted at London, Ontario in 2001 and 2002. The trials consisted of two replicates with two rows per replicate. The rows were 4.5 meters long with approximately 22 plants per row.

Table 9: Comparison table for '1325350'

	'1325350'	'3AZA1'*
Plant height (cm)		
mean	184.95	180.9
std. deviation	13.09	11.27
Height of principle ear insertion (cm)		
mean	51.15	44.35
std. deviation	7.0	8.06
Number of days from emergence to 50% of plants in silk		
mean	78	79
Ear length (mm)		
mean	155	142
std. deviation	13.39	12.14

* reference variety

OAT
(*Avena sativa* L.)

Proposed denomination: '**CDC Orrin**' (figure 11)
Previous denomination: OT382
Application number: 02-2973
Application date: 2002/01/14
Applicant: Dr. Brian Rossnagel, University of Saskatchewan, Crop Development Centre, Saskatoon, Saskatchewan
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Breeder: Dr. Brian Rossnagel, University of Saskatchewan, Crop Development Centre, Saskatoon, Saskatchewan

Varieties used for comparison: 'CDC Boyer', 'CDC Pacer' and 'AC Assiniboia'

Summary: *The pubescence on the lower leaf blade is less on 'CDC Orrin' than the reference varieties. The pubescence of the leaf margin on the leaf below the flag leaf for 'CDC Orrin' is absent to very weak, while for 'CDC Boyer' it is weak, for 'CDC Pacer' it is medium to strong, and for 'AC Assiniboia' it is very strong. 'CDC Orrin' has medium to strong pubescence above and below the upper culm node, while for 'CDC Pacer' it is absent to very weak and for 'AC Assiniboia' it is strong to very strong. 'CDC Orrin' produces a plant that is taller than 'AC Assiniboia' and 'CDC Pacer' but shorter than 'CDC Boyer'. The panicle density is more compact for 'CDC Orrin' than for 'CDC Pacer'. 'CDC Orrin' has fewer shorter hairs or spines on the lower panicle node than 'AC Assiniboia'. The frequency of awns on the lemma is greater for 'CDC Orrin' than the reference varieties. 'CDC Orrin' and 'CDC Boyer' have cream coloured kernels while for 'CDC Pacer' they are yellow and for 'AC Assiniboia' they are light brown.*

Description: 'CDC Orrin' is a hulled spring oat variety. The seedlings have a green coleoptile and short to medium length hypocotyls. Juvenile growth habit is semi-erect with medium pubescence of the lower leaf sheath. The lower leaf blades

have very slight pubescence. The leaves at booting stage are medium green with strong glaucosity and there is no pubescence of the leaf margins. Leaf ligules are present with an intermediate flag leaf attitude and strong to very strong glaucosity of the sheath. The stem segment immediately above and below the upper culm node has medium pubescence. The culm is medium in thickness and yellowish white to yellow in colour at maturity.

The panicle of 'CDC Orrin' is symmetrical in shape, compact in density, medium to large in size and intermediate in length and width. The branches are medium in length, semi-erect, and the lower whorl of branches is attached at the first node. The rachis is straight with no secondary rachis node present. The angle between the rachis and dominant side branch is 30 to 45 degrees. There is a few to medium number of medium length hairs or spines on the lower panicle node. The rachilla is glabrous with a second floret which is medium to long and medium in width. At maturity the rachilla has medium depth grooves. Spikelet separation is by fracture and floret separation is by heterofracture. Spikelet attitude is nodding with an average number of 3 to 4 florets per spikelet

The glumes of 'CDC Orrin' are yellow in colour, mid-wide to wide, and long. The lemma is medium in length with a long pointed tip and is white to yellow in colour at maturity. The lateral and dorsal surfaces of the lemma are glabrous with weak to medium glaucosity at the green stage. Lemma awns are frequent and twisted to bent in shape. There is a medium overlap of the lemma on the palea. The length of the palea of 'CDC Orrin' reaches half way to all the way up the lemma.

The kernels show mixed fluorescence under ultraviolet lights. The kernels are cream coloured, mid-plump with no basal hairs. The caryopsis is moderately pubescent. The brush hairs are short to mid-long. There are two grains per spikelet. The scutellum is medium in size with a pointed tip.

'CDC Orrin' is moderately susceptible to susceptible to crown rust (*Puccinia coronata*) races CR13, CR181, CR185, CR192, CR223 and CR225, resistant to black loose smut (*Ustilago avenae*) races A13, A60 and A617, susceptible to stem rust (*Puccinia graminis* f.sp. *avenae*) races NA8, NA16, NA25, NA27, NA28, NA55 and NA67, resistant to covered smut (*Ustilago kolleri*) and moderately susceptible to red leaf barley yellow dwarf virus (*BYDV*). 'CDC Orrin' has fair to good lodging resistance, good shattering resistance and is sensitive to day length.

Origin and Breeding: 'CDC Orrin' was developed in 1993 at the Crop Development Center's oat breeding program using a pedigree breeding system from the cross OT349 x J775-1 The F_1 - F_4 generations were grown as bulks with the F_1 and F_3 generations grown in winter nurseries in New Zealand. 'CDC Orrin' was selected as a single panicle from an F_4 plant in the field at Saskatoon in 1995. Following that, it was grown and selected as a single F_5 hill plot at Saskatoon in 1996. The seed from that F_5 hill plot was bulked as the line which became 'CDC Orrin'. It was tested in the CDC yield trials as 'OT382' in 1997-1998, followed by testing in the Western Oat Coop trials during 1999-2000. It was selected based on its agronomic performance and disease reactions.

Tests and Trials: The tests and trials consisted of two row plots which were 3.7 m in length spaced 15 cm apart, replicated twice in a RCBD. The trials were conducted in Saskatoon, Saskatchewan in 2001 and 2002.

Table 10: Comparison table for 'CDC Orrin'

	'CDC Orrin'	'CDC Boyer'*	'CDC Pacer'*	'AC Assiniboia'*
Plant height (cm)				
mean	88.38	96.70	82.98	81.40
std. dev.	7.00	6.69	5.71	10.42
Kernel weight (grams per 1000 kernels)				
	39.01	41.19	39.42	37.70

* reference variety

Proposed denomination: **'Furlong'** (see figure 12)
Previous denomination: OT2009
Application number: 02-3108
Application date: 2002/05/27
Applicant: Agriculture and Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Breeder: Dr. Jennifer Mitchell Fetch
Agriculture and Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba

Varieties used for comparison: 'CDC Dancer', 'AC Assiniboia' and 'Ronald'

Summary: *'Furlong' has a shorter flag leaf than the reference varieties. The pubescence of the stem above and below the upper culm node is more dense for 'Furlong' than 'CDC Dancer' and 'Ronald'. 'Furlong' produces a taller plant than 'Ronald'. The lemmas are longer for 'Furlong' than for 'CDC Dancer' and 'Ronald'. 'Furlong' has a heavier thousand kernel weight than the reference varieties and slightly longer kernels than the reference varieties. 'Furlong' has better resistance to crown rust (Puccinia coronata races CR 13, 181, 185, 192, 223, 225) and barley yellow dwarf virus (BYDV) than 'CDC Dancer'. 'Furlong' is more*

susceptible to BYDV than 'Ronald'.

Description: 'Furlong' is a hulled spring oat variety. The seedlings have a green coleoptile and short hypocotyls. Juvenile growth habit is erect, with medium tillering capacity and medium pubescence of the lower leaf sheath. The lower leaf blades have very slight pubescence. The leaves at booting stage are medium green with medium glaucosity and there is no pubescence of the leaf margins. Leaf ligules are present with an intermediate flag leaf attitude and weak glaucosity of the sheath. The stem segment immediately above and below the upper culm node has strong pubescence. The culm is medium in thickness and yellowish white in colour at maturity.

The panicle of 'Furlong' is symmetrical in shape, lax in density, medium in size and intermediate in length and width. The branches are medium in length, semi-erect to horizontal in position, and the lower whorl of branches is attached at the first node. The rachis is straight with no secondary rachis node present. The angle between the rachis and dominant side branch is more than 45 degrees. There are a few short length hairs or spines on the lower panicle node. The rachilla has weak pubescence with a second floret which is medium in length and width. At maturity, the rachilla has medium depth grooves. Spikelet separation is by fracture and floret separation is by heterofracture. Spikelet attitude is semi-nodding with an average number of 2 or less florets per spikelet.

The glumes of 'Furlong' are white to yellow in colour, mid-wide and mid-long. The lemma is medium in length with a medium pointed tip and is white to yellow in colour at maturity. The lateral and dorsal surfaces of the lemma are glabrous with no glaucosity at the green stage. Lemma awns are frequent and bent in shape. There is a medium overlap of the lemma on the palea. The length of the palea of 'Furlong' reaches half way up the lemma.

The kernals show mixed fluorescence under ultraviolet lights. The kernals are light brown to dark brown in colour and plump with no basal hairs. The caryopsis is pubescent. The brush hairs are mid-long. There are two grains per spikelet. The scutellum is small to medium in size with a pointed tip.

'Furlong' is resistant to crown rust (*Puccinia coronata*) races CR13, CR181, CR185, CR192, CR223 and CR225, resistant to black loose smut (*Ustilago avenae*) races A13, A60 and A617, moderately susceptible to stem rust (*Puccinia graminis* f.sp. *avenae*) races NA8, NA16, NA25, NA27, NA28, NA55 but susceptible to NA67, resistant to covered smut (*Ustilago kolleri*) and moderately resistant to red leaf barley yellow dwarf virus (*BYDV*). 'Furlong' has good lodging resistance, and is sensitive to day length.

Origin and Breeding: 'Furlong' was developed by a modified pedigree method. The cross is W93069 x AC Assiniboia, where W93069=W86226(Pg 16) x Robert, and W86226=Dumont*4 x 83GH130, and AC Assiniboia=Pc68 x 7*Robert. The cross was made in the fall of 1994. F_1 plants were grown in the growth chamber during the winter of 1995. A bulk F_2 was grown in the 1995 Rust/Smut nursery at Glenlea, MB. The seed was harvested from these plants, bulked and sized, where the most uniform seed were sent to the winter nursery in New Zealand in 1995-1996. In the winter nursery, F_3 panicles were selected from a space planted nursery. Selection for oat crown rust resistance to the presence of Pc38, Pc39, and Pc68 gene combination, and BYDV tolerance was possible in this nursery. 338 F_4 head rows were screened in the 1996 Glenlea Rust/Smut nursery. Disease resistant, agronomically desirable rows were selected. F_5 rows were grown in the 1996-1997 winter nursery in New Zealand. Concurrently, F_5 plants were screened, using known tester races, in the greenhouse at Winnipeg to verify the New Zealand rust readings. Whole oat sub-samples from these lines were tested for hull, protein, and oil percent utilizing NIR technology. Panicles from desirable, disease resistant plants were selected in New Zealand, and rows from those panicles were planted in the 1997 Glenlea F_6 Rust/Smut nursery. The F_7 plants were screened for crown and stem rust in the 1997-1998 winter greenhouse and for BYDV tolerance in the 1997-1998 New Zealand winter nursery. OT2009 was tested for one year in the 1999 Rust area test, and two years in the Western Cooperative Oat test in 2000-2001. An isolation of 110 panicle plots of three foot rows was grown in Glenlea in 2000. Uniform rows were selected to provide the seed source for breeder seed.

Tests and Trials: The tests and trial for Furlong were conducted in Glenlea, Manitoba in 2001 and 2002, and consisted of randomized complete block design with 4 replications. Plot size was 3.25 square meters.

Table 11: Comparison table for 'Furlong'

	'Furlong'	'CDC Dancer'*	'CDC Assiniboia'*	'Ronald'*
Flag leaf length (mm)				
mean	148.35	176.10	192.25	165.40
std. dev.	22.769	28.904	35.792	23.676
Plant height (cm)				
mean	90.65	86.5	88.1	81.9
std. dev.	3.528	5.754	3.892	3.386

Kernel weight (grams per 1000 kernels)			
44.7	34.8	39.2	33.5

* reference variety

OSTEOSPERMUM
(*Osteosperum ecklonis* (DC.) Norl.)

Proposed denomination: **'Seidacre'** (see figure 13)
Synonym: **'Milk Symphony'**
Application number: 01-2886
Application date: 2001/12/04
Applicant: Masayuki Sekiguchi, Gunma-ken, Japan
Agent in Canada: Nordic Nurseries, Abbotsford, British Columbia

Varieties used for comparison: 'Seikilrem' and 'Akvarza'

Summary: *'Seidacre' has a taller plant height than the reference varieties and longer shoots than 'Akvarza'. The leaves of 'Seidacre' have absent to very weak lobing while the leaves of 'Akvarza' have weak lobing. The leaves of 'Seidacre' are medium green in colour while the leaves of 'Akvarza' are variegated. 'Seidacre' has a longer peduncle than 'Akvarza' and a smaller inflorescence diameter than both reference varieties. 'Seidacre' differs from the reference varieties in flower colour.*

Description: The shoots of 'Seidacre' have a semi-erect to horizontal attitude. The stems have no anthocyanin colouration. The leaves have absent to very weak lobing and are medium green in colour with no variegation.

'Seidacre' flowers early to mid-season (week 12). The inflorescence has two complete ray floret whorls with a third incomplete whorl. The ray florets are elliptic to obovate in shape. The upper sides of the ray florets are light yellow in colour with a purple band at the base. The lower sides of the ray florets are yellowish-grey with green colouration. The disc is purplish-brown in colour.

Origin and Breeding: 'Seidacre' originated from a cross made between two unidentified selections of *Osteosperum ecklonis* in April, 1986 in Gunma-Ken, Japan. The variety was discovered and selected by the breeder as a single flowering plant within the progeny of the stated cross. Asexual reproduction of the new variety by vegetative tip cuttings was first conducted in 1991, in a controlled environment in Gunma-den, Japan.

Tests and Trials: Trials for 'Seidacre' were conducted in a polyhouse during the winter-spring of 2003, in St. Thomas, Ontario. The trials included 15 plants per variety. Rooted cuttings were planted in 4.5 inch pots on February 18, 2003. Measured characteristics were based on ten measurements and colour determinations were made using the 2001 RHS colour chart.

Table 12: Comparison table for 'Seidacre'

	'Seidacre'	'Seikilrem'*	'Akvarza'*
Plant height (cm)			
mean	40.13	33.65	22.65
std. deviation	2.167	3.786	4.595
Shoot length (cm)			
mean	22.07	21.45	13.6
std. deviation	4.137	3.730	3.414
Inflorescence diameter (cm)			
mean	6.16	7.32	7.16
std. deviation	0.476	0.476	0.617
Peduncle length (cm)			
mean	9.95	9.95	5.9
std. deviation	2.354	2.114	3.161
Colour of upper side of ray floret (RHS)			
margin	13D	13B	155D
middle	13D (11D towards base)	13C (with streaks of 13B)	155D
base	N88A to 93A (N78C in centre)	N88A to 93A (N78C in centre)	155D

* reference varieties

Proposed denomination: **'Seikilrem'** (see figure 14)
Synonym: **'Mother Symphony'**
Application number: 01-2887
Application date: 2001/12/04
Applicant: Masayuki Sekiguchi, Gunma-ken, Japan
Agent in Canada: Nordic Nurseries, Abbotsford, British Columbia

Varieties used for comparison: 'Seidacre' and 'Zulu'

Summary: *'Seikilrem' has a shorter plant height than 'Seidacre' and longer shoot length than 'Zulu'. 'Seikilrem' has no anthocyanin in the stem while 'Zulu' has anthocyanin present. 'Seikilrem' has a larger inflorescence than 'Seidacre' and smaller inflorescence than 'Zulu'. 'Seikilrem' has narrower ray florets than 'Seidacre' and a longer peduncle than 'Zulu'. The ray florets of 'Seikilrem' differ in colour from the ray florets of the reference varieties. 'Seikilrem' has a*

purple-brown disc colour while 'Zulu' has a yellow disc.

Description: The shoots of 'Seikilrem' have a semi-erect to semi-drooping attitude. The stems have no anthocyanin colouration. The leaves have very weak lobing and are medium green in colour with no variegation.

'Seikilrem' flowers mid-season to late (week 14). The inflorescence has two complete ray floret whorls with a third incomplete whorl. The ray florets are elliptic in shape. The upper sides of the ray florets are yellowish-orange in colour with a purple band at the base. The lower sides of the ray florets are yellowish-brown in colour and the disc is purplish-brown.

Origin and Breeding: 'Seikilrem' was discovered as a naturally occurring whole plant mutation of the osteospermum variety 'Seidacre'. The new variety was discovered and selected by the breeder in April, 1993 as a single flowering plant within a population of plants of the parent variety. Asexual reproduction of the new variety by vegetative tip cuttings was first conducted in 1993, in a controlled environment in Gunma-den, Japan.

Tests and Trials: Trials for 'Seikilrem' were conducted in a polyhouse during the winter-spring of 2003, in St. Thomas, Ontario. The trials included 15 plants per variety. Rooted cuttings were planted in 4.5 inch pots on February 18, 2003. Measured characteristics were based on ten measurements and colour determinations were made using the 2001 RHS colour chart.

Table 13: Comparison table for 'Seikilrem'

	'Seikilrem'	'Seidacre'*	'Zulu'*
Plant height (cm)			
mean	33.65	40.13	35.83
std. deviation	3.786	2.167	4.434
Shoot length (cm)			
mean	21.45	22.07	12.35
std. deviation	3.730	4.137	2.212
Inflorescence diameter (cm)			
mean	7.32	6.16	8.31
std. deviation	0.476	0.476	0.840
Peduncle length (cm)			
mean	9.95	9.95	6.4
std. deviation	2.114	2.354	2.234
Colour of upper side of ray floret (RHS)			
margin	13B	13D	12A
middle	13C (with streaks of 13B	13D (11D towards base)	10A-B (with streaks of 12A
base	N88A to 93A (N78C in centre)	N88A to 93A (N78C in centre)	10A-B (with streaks of 12A)

* reference varieties

Proposed denomination: **'Seikimora'** (see figure 15)
Synonym: **'Sister Symphony'**
Application number: 01-2888
Application date: 2001/12/04
Applicant: Masayuki Sekiguchi, Gunma-ken, Japan
Agent in Canada: Nordic Nurseries, Abbotsford, British Columbia

Varieties used for comparison: 'Seikilrem' and 'Akope'

Summary: *'Seikimora' has a taller plant height than the reference varieties. 'Seikimora' has longer shoot length than 'Akope' and shorter shoots than 'Seikilrem'. 'Seikimora' has weaker leaf lobing than 'Akope'. 'Seikimora' has a smaller inflorescence and longer peduncle length than 'Akope'. 'Seikimora' has orange flower colour while 'Seikilrem' has yellow flowers and 'Akope' has reddish-pink flowers.*

Description: The shoots of 'Seikimora' have a semi-erect to semi-drooping attitude. The stems have no anthocyanin colouration. The leaves have very weak lobing and are medium green in colour with no variegation.

'Seikimora' flowers early (week 12). The inflorescence has two complete ray floret whorls with a third incomplete whorl. The ray florets are elliptic in shape. The upper sides of the ray florets are orange in colour with a purple band at the base. The lower sides of the ray florets are yellowish-brown in colour and the disc is purplish-brown.

Origin and Breeding: 'Seikimora' was discovered as a naturally occurring whole plant mutation of the osteospermum variety 'Seikilrem'. The new variety was discovered and selected by the breeder in April, 1996 as a single flowering plant within a population of plants of the parent variety. Asexual reproduction of the new variety by vegetative tip cuttings was first conducted in 1996, in a controlled environment in Gunma-den, Japan.

Tests and Trials: Trials for 'Seikimora' were conducted in a

polyhouse during the winter-spring of 2003, in St. Thomas, Ontario. The trials included 15 plants per variety. Rooted cuttings were planted in 4.5 inch pots on February 18, 2003. Measured characteristics were based on ten measurements and colour determinations were made using the 2001 RHS colour chart.

Table 14: Comparison table for 'Seikimora'

	'Seikimora'	'Seikilrem'*	'Akope'*
Plant height (cm)			
mean	38.55	33.65	28.75
std. deviation	4.487	3.786	2.880
Shoot length (cm)			
mean	17.95	21.45	11.65
std. deviation	1.606	3.730	3.309
Inflorescence diameter (cm)			
mean	7.63	7.32	8.83
std. deviation	0.562	0.476	0.533
Peduncle length (cm)			
mean	10.85	9.95	6.75
std. deviation	1.510	2.114	1.885
Colour of upper side of ray floret (RHS)			
margin	25A	13B	50D
middle	5B (with streaks of 25A)	13C (with streaks of 13B)	50D - 51D (with 13D ground colour)
base	N88A to 93A (N78C in centre)	N88A to 93A (N78C in centre)	13D

* reference varieties

Proposed denomination: **'Seitope'** (see figure 16)
Trade name: Peach Symphony'
Application number: 02-3295
Application date: 2002/10/03
Applicant: Jorn Hansson, Sonderso, Denmark
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario

Varieties used for comparison: 'Seikilrem' and 'Akope'

Summary: *'Seitope' has a taller plant height and longer shoots than the reference varieties. 'Seitope' has a smaller inflorescence diameter and longer peduncle length than the reference varieties. 'Seitope' has yellow flowers while 'Akope' has reddish-pink flowers.*

Description: The shoots of 'Seitope' have a semi-erect to semi-drooping attitude. The stems have no anthocyanin colouration. The leaves have very weak lobing and are medium green in colour with no variegation.

'Seitope' flowers mid season (week 13). The inflorescence has two complete ray floret whorls with a third incomplete whorl. The ray florets are elliptic in shape. The upper sides of the ray florets are yellow in colour with a purple band at the base. The lower sides of the ray florets are yellowish-brown in colour and the disc is purplish-brown.

Origin and Breeding: 'Seitope' was discovered as a naturally occurring whole plant mutation of the osteospermum variety 'Seikilrem'. The new variety was discovered and selected by the breeder in May, 1999, as a single flowering plant within a population of plants of the parent cultivar. Asexual reproduction of the new variety by vegetative tip cuttings was first conducted in June, 1999 in Denmark.

Tests and Trials: Trials for 'Seitope' were conducted in a polyhouse during the winter-spring of 2003, in St. Thomas, Ontario. The trials included 15 plants per variety. Rooted cuttings were planted in 4.5 inch pots on February 18, 2003. Measured characteristics were based on ten measurements and colour determinations were made using the 2001 RHS colour chart.

Table 15: Comparison table for 'Seitope'

	'Seitope'	'Seikilrem'*	'Akope'*
Plant height (cm)			
mean	38.65	33.65	28.75
std. deviation	5.323	3.786	2.880
Shoot length (cm)			
mean	32.55	21.45	11.65
std. deviation	5.002	3.730	3.309
Inflorescence diameter (cm)			
mean	6.18	7.32	8.83
std. deviation	0.274	0.476	0.533
Peduncle length (cm)			
mean	11.9	9.95	6.75
std. deviation	3.673	2.114	1.885
Colour of upper side of ray floret (RHS)			
margin	63B (12D ground colour)	13B	50D
middle	12D (with streaks of 64D)	13C (with streaks of 13B)	50D/51D (with 13D ground colour
base	83A (77A in centre)	N88A to 93A (N78C in centre)	13D

* reference varieties

Proposed denomination: **'Sevamil'** (see figure 17)
Trade name: Vanilla Symphony
Application number: 02-3357
Application date: 2002/11/21
Applicant: Jorn Hansson, Sonderso, Denmark
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario

Varieties used for comparison: 'Seikilrem' and 'Beira'

Summary: *'Sevamil' has a taller plant height, longer shoots and longer peduncles than the reference varieties. 'Sevamil' has white flowers while 'Seikilrem' has yellow flowers. 'Sevamil' flowers earlier than the reference varieties.*

Description: The shoots of 'Sevamil' have a semi-erect to horizontal attitude. The stems have no anthocyanin colouration. The leaves have very weak lobing and are medium green in colour with no variegation.

'Sevamil' flowers very early (week 11). The inflorescence has two complete ray floret whorls. The ray florets are elliptic in shape. The upper sides of the ray florets are white in colour with a purple band at the base. The lower sides of the ray florets are yellowish-brown in colour and the disc is purplish-brown.

Origin and Breeding: 'Sevamil' was discovered as a naturally occurring whole plant mutation of the osteospermum variety 'Seikilrem'. The new variety was discovered and selected by the breeder in June, 2000 based on its unique ivory coloured flowers. Asexual reproduction of the new variety by vegetative tip cuttings was first conducted in August, 2000 in Denmark.

Tests and Trials: Trials for 'Sevamil' were conducted in a polyhouse during the winter-spring of 2003, in St. Thomas, Ontario. The trials included 15 plants per variety. Rooted cuttings were planted in 4.5 inch pots on February 18, 2003. Measured characteristics were based on ten measurements and colour determinations were made using the 2001 RHS colour chart.

Table 16: Comparison table for 'Sevamil'

	'Sevamil'	'Seikilrem'*	'Beira'*
Plant height (cm)			
mean	45.9	33.65	30.35
std. deviation	1.449	3.786	3.019
Shoot length (cm)			
mean	28.88	21.45	10.75
std. deviation	2.854	3.730	1.799
Peduncle length (cm)			
mean	11.66	9.95	3.95
std. deviation	2.199	2.114	1.257
Colour of upper side of ray floret (RHS)			
margin	155D	13B	155D (whiter than)
middle	155D	13C (with streaks of 13B)	155D (whiter than)
base	N88A-B (N78C in centre)	N88A to 93A (N78C in centre)	83C (N78C in centre)

* reference varieties

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

Proposed denomination: **'Nessie'** (figure 18)
Application number: 01-2678
Application date: 2001/04/19
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Majoret', 'SW Capri', and 'SW Salute' (see table 17 on page 48)

Summary: *'Nessie' has a shorter vine length than 'SW Capri'. 'Nessie' has a shorter pod length than 'Majoret' and 'SW Capri'. The curvature of the pod is very weak to weak in 'Nessie' while it is medium in 'Majoret' and 'SW Capri'. The shape of the distal part of the pod in 'Nessie' is blunt while it is pointed in 'Majoret'. The cotyledons of 'Nessie' are green while in 'SW Capri' and 'SW Salute' they are yellow. 'Nessie' has a medium to large seed size while in 'SW Salute' the seed size is small to medium. The thousand seed weight of 'Nessie' is greater than 'SW Capri', and 'SW Salute'. 'Nessie' and 'Majoret' are susceptible to powdery mildew (Erysiphe polygoni) while 'SW Salute' is resistant.*

Description: 'Nessie' is a semi-leafless field pea variety whose plants are green in colour at flowering with medium length vines. Stipule development is normal, with flecking present.

'Nessie' flowers early to mid-season and bears one to two flowers per node. 'Nessie' produces green pods, with a very weak to weak concave curvature. The distal part of the pod is blunt in shape and there are an average of seven ovules per

pod. The immature seeds of 'Nessie' are light green in colour. The dry seeds are medium to large in size, with green cotyledons, and no black hilum. The starch grain is simple. 'Nessie' is susceptible to powdery mildew (*Erysiphe polygoni*).

Origin and Breeding: 'Nessie' originated from the cross Majoret x Solara made in 1992 at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigree method where the variety was selected as a single plant in the F4 generation on the basis of yield, semi-leafless trait, earliness, straw stiffness, good yellow colour, and good tendrils. Breeder seed was bulked in the F8 generation. The variety is maintained by Svalöf Weibull Ltd., in Saskatoon, Saskatchewan, and by Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted during the summers of 2001 and 2002 in Saskatoon, Saskatchewan. There were two replicates, each measuring 1.75m x 3.25m, where plant spacing was 40 plants per meter squared.

Proposed denomination: **'SW Capri'** (figure 20)
Application number: 01-2679
Application date: 2001/04/19
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Majoret', 'Carneval', 'Nessie' and 'SW Salute'(see table 17 on page 48)

Summary: *'SW Capri' has a longer vine length than 'Nessie'. 'SW Capri' flowers later than 'SW Salute'. The pod length is longer in 'SW Capri' than in 'Nessie' and 'SW Salute'. 'SW Capri' has a medium degree of curvature of the pod while in 'SW Salute' it is weak, in 'Nessie' it is very weak to weak, and in 'Carneval' it is absent to very weak. The shape of the distal end of the pod in 'SW Capri' is blunt while in 'Majoret' it is pointed. 'SW Capri' has yellow coloured cotyledons of the seed while 'Majoret' and 'Nessie' have green coloured cotyledons. The thousand seed weight is less in 'SW Capri' than in 'Majoret' and 'Nessie'. 'SW Capri' is susceptible to powdery mildew(Erysiphe polygoni) while 'SW Salute' is resistant.*

Description: 'SW Capri' is a semi-leafless field pea variety whose plants are green in colour at flowering with medium to long length vines. Stipule development is normal, with flecking present.

'SW Capri' flowers mid-season and bears one to two flowers per node.'SW Capri' produces green pods, with a medium concave curvature. The distal part of the pod is blunt in shape and there are an average of seven ovules per pod. The immature seeds of 'SW Capri' are light green in colour. The dry seeds are medium in size, with yellow cotyledons, and no black hilum. The starch grain is simple. 'SW Capri' is susceptible to powdery mildew (*Erysiphe polygoni*).

Origin and Breeding: 'SW Capri' originated from the cross Carneval x Sv 92536 made in 1992 at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigree method where the variety was selected as a single plant in the F4 generation on the basis of yield, semi-leafless trait, earliness, straw stiffness, good yellow colour, and good tendrils. Breeder seed was derived from a single plant selection in the F6 generation. The variety is maintained by Svalöf Weibull Ltd., in Saskatoon, Saskatchewan, and by Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted during the summers of 2001 and 2002 in Saskatoon, Saskatchewan. There were two replicates, each measuring 1.75m x 3.25m, where plant spacing was 40 plants per meter squared.

Proposed denomination: **'SW Salute'** (figure 23)
Application number: 01-2680
Application date: 2001/04/19
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Majoret', Carneval', 'Highlight', 'Nessie' and 'SW Capri' (see table 17 on page 48)

Summary: *'SW Salute' has a longer vine length than 'Highlight', but shorter than 'Carneval'. 'SW Salute' has more nodes on the stem than 'Highlight'. The stipule length at the second fertile node is shorter in 'SW Salute' than in 'Carneval'. 'SW Salute' flowers earlier than 'Majoret', 'Carneval' and 'SW Capri'. The pod length is shorter in 'SW Salute' than in 'Majoret', 'Carneval' and 'SW Capri'. 'SW Salute' has a weak curvature of the pod while 'Carneval' has absent to very weak curvature and 'Majoret' and 'SW Capri' have a medium degree of curvature to the pod.. The shape of the distal end of the pod is blunt in 'SW Salute' while it is pointed in 'Majoret'. The colour of the cotyledons in 'SW Salute' is yellow while it is green in 'Majoret' and 'Nessie'. 'SW Salute' has a smaller seed size and thousand seed weight than 'Majoret' and 'Nessie'. 'SW Salute' is resistant to powdery mildew (Erysiphe polygoni) while 'Carneval' is*

moderately susceptible, and 'Majoret', 'Nessie', and 'SW Capri' are susceptible.

Description: 'SW Salute' is a semi-leafless field pea variety whose plants are green in colour at flowering with medium length vines. Stipule development is normal, with flecking present.

'SW Salute' flowers early in the season and bears two flowers per node.'SW Salute' produces green pods, with a weak concave curvature. The distal part of the pod is blunt in shape and there are an average of seven ovules per pod. The immature seeds of 'SW Salute' are light green in colour. The dry seeds are small to medium in size, with yellow cotyledons and no black hilum. The starch grain is simple. 'SW Salute' is resistant to powdery mildew (*Erysiphe polygoni*).

Origin and Breeding: 'SW Salute' originates from the cross Highlight x Patriot made in 1990 at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigree method where the variety was selected as a single plant in the F4 generation on the basis of yield, semi-leafless trait, earliness, straw stiffness, good yellow colour and good tendrils. Breeder seed was derived from a single plant selection in the F6 generation. The variety is maintained by Svalöf Weibull Ltd., in Saskatoon, Saskatchewan, and by Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted during the summers of 2001 and 2002 in Saskatoon, Saskatchewan. There were two replicates, each measuring 1.75m x 3.25m, where plant spacing was 40 plants per meter squared.

Table 17: Comparison table for 'Nessie', 'SW Capri', and 'SW Salute'

	'Nessie'a	'SW Capri'b	'SW Salute'c	'Majoret'*abc	'Carneval'*bc	'Highlight'*c
Vine length (cm)						
mean	39.91	42.83	40.71	40.31	44.64	37.22
std. dev.	6.68	8.72	9.36	7.80	9.69	7.77
Number of stem nodes up to and including the first flowering node						
mean	15.4	16.6	16.2	16.3	16.6	14.8
std. dev.	2.38	2.70	2.52	3.22	2.52	2.83
Stipule length at the second fertile node (mm)						
mean	42.4	42.3	40.2	39.4	47.3	43.1
std. dev.	11.01	12.64	14.95	10.38	10.79	9.66
Pod length (mm)						
mean	61.9	70.3	63.8	72.7	68.9	65.6
std. dev.	8.04	6.04	5.98	6.71	6.59	5.52
Pod width (mm)						
mean	12.5	13.0	12.9	13.9	13.7	12.5
std. dev.	1.48	1.09	1.29	0.86	1.15	1.55
Number of ovules in the pod observed at second fertile node						
mean	6.9	7.1	6.8	7.7	7.1	7.2
std. dev.	1.03	0.88	1.09	1.14	0.90	0.95
1000 seed weight (g)						
	266	205	210	255	220	205

* reference varieties

Proposed denomination: **'SW Belfield'** (figure 25)
Application number: 02-3022
Application date: 2002/03/26
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Majoret' and 'Carneval' (see table 18 on page 53)

Summary: *'SW Belfield' is a field pea with larger stipules than those of 'Majoret'. The pods produced by 'SW Belfield' are shorter than those of the reference varieties. Shape of the distal part of the pods is blunt for 'SW Belfield' while it is pointed for 'Majoret'. Degree of curvature of the pods is weak for 'SW Belfield' while for 'Majoret', it is moderate and for 'Carneval', it is absent to very weak. 'SW Belfield' has yellow seed cotyledons while those of 'Majoret' are green in colour. The seeds of 'SW Belfield' are heavier than those of 'Carneval' and lighter than those of 'Majoret'. 'SW Belfield' is susceptible to powdery mildew (Erysiphe polygoni) while 'Carneval' is moderately susceptible.*

Description: 'SW Belfield' is a semi-leafless field pea variety whose plants are green in colour at flowering with vines which are medium in length. Stipule development is normal with flecking present.

'SW Belfield' flowers early to mid-season and bears one to two flowers per node. 'SW Belfield' produces green pods with a weak, concave curvature. The distal part of the pod is blunt in shape and there are an average of seven ovules per pod. The immature seeds of 'SW Belfield' are light green in colour. The dry seeds are medium in size with green cotyledons and no black colour of the hilum. The starch grain is simple. 'SW Belfield' is susceptible to powdery mildew (*Erysiphe polygoni*).

Origin and Breeding: 'SW Belfield' (experimental designation SW 975514) originated from a cross made in 1994 at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigree method where the variety was selected as a single plant in the F_4 generation. It was selected on the basis of yield, semi-leafless trait, straw stiffness, good seed colour and early maturity. Breeder seed was bulked in the F_5 generation. The variety is maintained by Svalöf Weibull Ltd. in Saskatoon, Saskatchewan and by Svalöf Weibull AB in Svalöv, Sweden.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted during the summers of 2001 and 2002 in Saskatoon, Saskatchewan. There were two replicates, each measuring 1.75m x 3.25m, where plant spacing was 40 plants per meter squared.

Proposed denomination: **'SW Prize'** (figure 28)
Application number: 02-3023
Application date: 2002/03/26
Applicant: Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd., Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Majoret' and 'Carneval' (see table 18 on page 53)

Summary: *'SW Prize' is a field pea with fewer nodes per stem than the reference varieties. 'SW Prize' has larger stipules than 'Majoret'. 'SW Prize' begins flowering earlier than the reference varieties. The pods produced by 'SW Prize' are shorter than those of the reference varieties. Shape of the distal part of the pods is blunt for 'SW Prize' while it is pointed for 'Majoret'. Degree of curvature of the pods is weak for 'SW Prize' while for 'Majoret', it is moderate and for 'Carneval', it is absent to very weak. 'SW Prize' has yellow seed cotyledons while those of 'Majoret' are green in colour. 'SW Prize' produces larger seed than 'Carneval' and heavier seed than either reference variety. 'SW Prize' is susceptible to powdery mildew (Erysiphe polygoni) while 'Carneval' is moderately susceptible.*

Description: 'SW Prize' is a semi-leafless field pea variety whose plants are green in colour at flowering and vines which are medium in length. Stipule development is normal with flecking present.

'SW Prize' flowers early and bears one to two flowers per node. 'SW Prize' produces green pods with a weak, concave curvature. The distal part of the pod is blunt in shape and there are an average of seven ovules per pod. The immature seeds of 'SW Prize' are light green in colour. The dry seeds are medium to large in size with yellow cotyledons and no black colour of the hilum. The starch grain is simple. 'SW Prize' is susceptible to powdery mildew (*Erysiphe polygoni*).

Origin and Breeding: 'SW Prize' (experimental designation SW 965210) originated from a cross made in 1994 at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigree method where the variety was selected as a single plant in the F_4 generation. It was selected on the basis of yield, semi-leafless trait, straw stiffness, retention of green colour and early maturity. Breeder seed was bulked in the F_5 generation. The variety is maintained by Svalöf Weibull Ltd. in Saskatoon, Saskatchewan and by Svalöf Weibull AB in Svalöv, Sweden.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted during the summers of 2001 and 2002 in Saskatoon, Saskatchewan. There were two replicates, each measuring 1.75m x 3.25m, where plant spacing was 40 plants per meter squared.

Proposed denomination: **'SW Circus'** (figure 29)
Application number: 02-3024
Application date: 2002/03/26
Applicant: Svalöf Weibull AB
Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Bonis & Company Ltd.
Lindsay, Ontario

Varieties used for comparison: 'Majoret' and Carneval' (see table 18 on page 53)

Summary: *'SW Circus' is a field pea with smaller stipules than those of 'Carneval' and shorter pods than 'Majoret'. Shape of the distal part of the pods is blunt for 'SW Circus' while it is pointed for 'Majoret'. Degree of curvature of the pods is absent to very weak for 'SW Circus' while for 'Majoret', it is moderate. 'SW Circus' has yellow seed cotyledons while those of 'Majoret' are green in colour. The seeds of 'SW Circus' are heavier than those of 'Carneval' and lighter than those of 'Majoret'. 'SW Circus' is susceptible to powdery mildew (Erysiphe polygoni) while 'Carneval' is moderately susceptible.*

Description: 'SW Circus' is a semi-leafless field pea variety whose plants are green in colour at flowering with vines which are medium in length. Stipule development is normal with flecking present.

SW Circus' flowers early to mid-season and bears one to two flowers per node. 'SW Circus' produces green pods with an absent to very weak, concave curvature. The distal part of the pod is blunt in shape and there are an average of seven ovules per pod. The immature seeds of 'SW Circus' are light green in colour. The dry seeds are medium in size with yellow cotyledons and no black colour of the hilum. The starch grain is simple. 'SW Circus' is susceptible to powdery mildew (*Erysiphe polygoni*).

Origin and Breeding: 'SW Circus' (experimental designation SW 975504) originated from a cross made in 1994 at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden. The breeding method was a pedigree method where the variety was selected as a single plant in the F_4 generation. It was selected on the basis of yield, semi-leafless trait, straw stiffness, yellow seed colour and early maturity. Breeder seed was bulked in the F_5 generation. The variety is maintained by Svalöf Weibull Ltd. in Saskatoon, Saskatchewan and by Svalöf Weibull AB in Svalöv, Sweden.

Tests and Trials: Tests and trials were conducted during the summers of 2001 and 2002 in Saskatoon, Saskatchewan. There were two replicates, each measuring 1.75m x 3.25m, where plant spacing was 40 plants per meter squared.

Table 18: Comparison table for 'SW Belfield', 'SW Prize' and 'SW Circus'

	'SW Belfield'	'SW Prize'	'SW Circus'	'Majoret'*	'Carneval'*
Number of stem nodes up to and including the first flowering node					
mean	16.1	13.8	16.2	16.3	16.6
std. deviation	2.57	1.87	2.53	3.22	2.52
Stipule length at the second fertile node (mm)					
mean	45.7	47.6	39.6	39.4	47.3
std. deviation	9.31	11.57	13.85	10.38	10.79
Stipule width at the second fertile node (mm)					
mean	32.1	33.1	25.8	27.1	31.6
std. deviation	8.04	10.58	5.34	5.93	9.23
Pod length (mm)					
mean	65.2	63.2	66.6	72.7	68.9
std. deviation	5.37	5.92	7.33	6.71	6.59
Pod width (mm)					
mean	13.6	13.1	13.5	13.9	13.7
std. deviation	1.48	1.28	1.20	0.86	1.15
Number of ovules in the pod observed at second fertile node					
mean	7.0	7.2	6.7	7.7	7.1
std. deviation	0.58	0.97	1.21	1.14	0.90
1000 seed weight (g)					
	240	260	250	255	220

* reference varieties

ROSE
(*Rosa hybrida*)

Proposed denomination: **'POULra016'** (see figure 30)
Trade name: Sterling Parade
Application number: 01-2790
Application date: 2001/07/19
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULhappy'

Summary: *'POULra016' has weak anthocyanin colouration in the young shoot while 'POULhappy' has no anthocyanin. 'POULra016' has larger overall leaf size and a larger terminal leaflet than 'POULhappy'. 'POULra016' flowers later and has a lower number of flowers per flowering shoot than 'POULhappy'. 'POULra016' has slightly darker flower colour than 'POULhappy'.*

Description: 'POULra016' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stem has a sparse number of short and long prickles which are linear in shape and white with brownish-red colour towards the base. The leaves are light to medium green in colour and have absent to very weak glossiness on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a thin/flexible texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULra016' flowers mid-season and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a low number of hairs or prickles. The flower bud is pointed in shape and sepal extensions are weak to medium. The flower is round to irregularly rounded in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from

the side and flat to flattened convex on the lower part when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is double. 'POULra016' has dark red flowers. The petals have a small to medium sized spot at the base of the inner and outer side. The petal margin has medium to strong reflexing and weak undulation. The outer stamen has a white filament with bluish-pink tones. The style is long in length, light green in colour with bluish-pink tones and has no hairs on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flower has no fragrance.

Origin and Breeding: 'POULra016' originated from a cross made in 1998 between an unnamed seedling and 'POULsabel' (Isabel Hit), in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra016' were conducted in Waterdown, Ontario in January of 2002. The trials consisted of 6 plants per variety grown in 15 cm pots. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 19: Comparison table for 'POULra016'

	'POULra016'	'POULhappy'*
Leaf length (mm)		
mean	98.67	70.6
std. deviation	12.11	3.32
Leaf width (mm)		
mean	59.5	40.5
std. deviation	3.94	2.92
Terminal leaflet length (mm)		
mean	40.83	30.7
std. deviation	6.15	2.31
Terminal leaflet width (mm)		
mean	22.67	15.90
std. deviation	3.56	1.37
Overall flower colour (RHS)	45A	46B
Colour of outer surface of petal (RHS)		
margin	46A	46B
middle zone	46A	46B
base	157D	155A
Colour of inner surface of petal (RHS)		
margin	45A	46B
middle zone	45A	46B
base	157D	155A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULhi005'** (see figure 31)
Trade name: Valentina Hit
Application number: 01-2794
Application date: 2001/07/25
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULypso' and 'POULrolyt'

Summary: *'POULhi005' has stronger anthocyanin colouration in the young shoot than the reference varieties. 'POULhi005' has larger overall leaf length and width than the reference varieties. 'POULhi005' has a larger flower diameter than 'POULrolyt'. 'POULhi005' has a double corolla while 'POULrolyt' has a very double corolla. 'POULhi005' has a lighter red flower colour than 'POULypso' and a less orange red flower colour than 'POULrolyt'.*

Description: 'POULhi005' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has medium to strong anthocyanin colouration which is bronze in colour. The stem has a sparse number of short and long prickles which are linear in shape and nearly white in colour. The leaves are medium to dark green in colour and have medium to strong glossiness on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a leathery texture. The leaflet base is obtuse to rounded in shape.

'POULhi005' flowers mid-season and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a low number of stipitate glands. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are weak. The flower is round in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and concave to flat on the lower part when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is double. 'POULhi005' has medium to dark red flowers. The petals have small to medium sized spots at the base of the inner and outer side. Reflexing of the petal margin is weak to medium and undulation is very weak to weak. The outer stamen has a yellow filament. The style is long in length, yellow-green in colour and has absent to very

weak hairiness on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is medium to large in size, pear shaped and has a few underdeveloped prickles and stipitate glands. The flower has a weak to medium, tea fragrance.

Origin and Breeding: 'POULhi005' originated from a cross made in 1998 between an unnamed seedling and 'POULsabel' (Isabel Hit), in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULhi005' were conducted in Waterdown, Ontario in January of 2002. The trials consisted of 6 plants per variety grown in 15 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 20: Comparison table for 'POULhi005'

	'POULhi005'	'POULypso'*	'POULrolyt'*
Leaf length (mm)			
mean	99.17	75.00	85.33
std. deviation	13.57	4.20	9.20
Leaf width (mm)			
mean	76.67	50.33	54.50
std. deviation	10.80	5.32	4.64
Terminal leaflet length (mm)			
mean	49.83	30.33	35.67
std. deviation	6.71	4.80	5.13
Terminal leaflet width (mm)			
mean	29.33	18.00	20.50
std. deviation	4.50	1.26	1.22
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	46B	46A	34A
upper surface	46B	46A	34A
lower surface	57A/46A	46A	42B
Overall flower colour (RHS)	46B	46A	44B
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	44A	46A	44D
middle zone	46B	46A	44C
base	157A	157D	157A
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	53C	46A/44A	43B
middle zone	53B	46A/44A	43A
base	157A	157D	157A
Flower diameter (mm)			
mean	45.50	45.00	36.33
std. deviation	4.09	4.47	3.83

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULhi008'** (see figure 32)
Trade name: Tiffany Hit
Application number: 01-2796
Application date: 2001/07/25
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULhilda'

Summary: *'POULhi008' has a shorter leaf length than 'POULhilda'. 'POULhi008' has darker reddish-pink flower colour and larger spots on the base of the inner and outer side of the petal than 'POULhilda'. 'POULhi008' has stronger reflexing of the petal margin than 'POULhilda'.*

Description: 'POULhi008' is a miniature rose variety which has a bushy growth habit. The young shoot has weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stem has no prickles or thorns. The leaves are dark green in colour and have medium to strong glossiness on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a leathery to rugose texture. The leaflet base is obtuse to rounded in shape.

'POULhi008' flowers mid-season and flowers almost continuously for more than ten weeks. There are a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a medium number of stipitate glands. The flower bud is ovoid in shape and sepal extensions are absent to weak. The flower is round in shape when viewed from above, flattened convex on the upper part when viewed from the side and flat on the lower part when viewed from the side. The flower center is infold to normal and the corolla is very double. 'POULhi008' has light reddish-pink flowers. The petals have small to medium sized spots at the base of the outer side and medium sized spots at the base of the inner side. Reflexing of the petal margin is medium to strong and undulation is weak. The outer stamen has a yellow filament. The style is long in length, white to yellow-green in colour with some reddish colouration at the distal end and hairless on the upper half. The stigma is positioned slightly above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flower has a weak to medium, fruit tropicana fragrance.

Origin and Breeding: 'POULhi008' originated from a cross made in 1998 between 'Patricia Kordana' and 'POULsabel' (Isabel Hit), in Fredensborg, Denmark.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULhi008' were conducted in Waterdown, Ontario in January of 2002. The trials consisted of 6 plants per variety grown in 15 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 21: Comparison table for 'POULhi008'

	'POULhi008'	'POULhilda'*
Leaf length (mm)		
mean	78.0	95.0
std. deviation	4.60	8.37
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)		
upon opening	51A/B	36D
upper surface	52C	39C/D (margin) 157D (middle)
lower surface	52C	39C/D (margin) 157D (middle)
Overall flower colour (RHS)		
	52D	38C-39C
Colour of outer surface of petal (RHS)		
margin	52D	36C
middle zone	52C	36D
base	3C	157A
Colour of inner surface of petal (RHS)		
margin	49B	36C
middle zone	49B	36D
base	4C	157A
Flower diameter (mm)		
mean	54.33	48.00
std. deviation	3.88	2.45

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULra017'** (see figure 33)
Trade name: Blanca Parade®
Application number: 02-3195
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULra015' (Denise Parade®) and 'POULra022' (Camilla Parade®)

Summary: *'POULra017' is a pot rose variety that differs from the reference variety 'POULra015' and the other candidate variety 'POULra022' in flower colour and numbers of petals. The flower of 'POULra017' has more petals than 'POULra015' but not as many as 'POULra022'. 'POULra017' also has a smaller flower diameter than 'POULra022'. The flower colour of the candidate 'POULra017' is a creamy yellowish white whereas 'POULra015' is a lighter colour of yellow-orange and 'POULra022' is nearly white.*

Description: 'POULra017' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour and is limited to the leaflet margins and undersides of the leaves. The stem has no prickles or thorns. The leaves are light green in colour and have weak to medium glossiness on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a thin/flexible texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULra017' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a medium number of prickles. The flower bud is pointed to ovoid in shape and there are weak sepal extensions. The flower is irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is flat to flattened convex when viewed from the side. The lower part is flattened convex to convex when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is very double. 'POULra017' has yellowish white flowers. The petals have very small spots at the base of the inner and outer side. Reflexing and undulation of the petal margin is weak. The outer stamen has a yellowish green filament. The style is short in length, greenish white in colour and has weak hairiness on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flower has no fragrance.

Origin and Breeding: 'POULra017' originated from a mutation of the variety 'POULra002', discovered early in 1997 in the glasshouses of the breeder in Fredensborg, Denmark. In the spring of 1998 the mutation was selected and propagated for further evaluation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra017' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 22: Comparison table for 'POULra017'

	'POULra017'	'POULra015'*	'POULra022'*
Flower diameter (mm)			
mean	33.0	30.5	50.5
std. deviation	2.68	5.50	2.66
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	158A/157C	27C	155D
upper surface	158A	27D	155D
lower surface	158B	27C	155D
Overall flower colour (RHS)	158A/159A	27D/18D/15D	155D/159 C
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	158B	27D	155D
middle zone	158B	15D	155D
base	2C-D	151C	1D
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	158B	27D	155D
middle zone	158B	15D-18D	155D
base	2B	151C	1D

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULra018'** (see figure 34)
Trade name: Chic Parade®
Application number: 02-3196
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULra014' (Julie Parade®), 'POULra004' (Claudia Parade®) and 'POULra021' (Lady Parade®) (see table 24 on page 59)

Summary: *'POULra018' is a pot rose variety that differs from the reference varieties in flower colour. The flowers of 'POULra018' are a darker salmon pink than the flowers of 'POULra014' and 'POULra004' which are lighter salmon pink. The other candidate variety 'POULra021' has flowers which are more pink (less salmon) than 'POULra018'.*

Description: 'POULra018' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has little or no anthocyanin colouration. The stem has no prickles or thorns. The leaves are light green in colour and are dull (not glossy) on the upper side. There are five to seven leaflets. The terminal leaflet has a finely serrated margin and a thin/flexible texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULra018' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a small to medium number of prickles. The flower bud is ovoid in shape and there are weak sepal extensions. The flower is irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is flat to flattened convex when viewed from the side. The lower part is flattened convex to convex when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is double to very double. 'POULra018' has light pink flowers. The petals have very small spots at the base of the inner and outer side. Reflexing of the petal margin is medium to strong. The outermost petals are double reflexed. Undulation of the petal margin is weak. The outer stamen has a yellowish green filament. The style is long, greenish white in colour and has weak to medium hairiness on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is small to medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flower has a moderately weak fragrance.

Origin and Breeding: 'POULra018' originated as a mutation of the Poulsen Roser ApS variety 'POULra002'. The mutation was discovered early in 1997 in the glasshouses of the breeder in Fredensborg, Denmark. In the spring of 1998 the mutation was selected and propagated for further evaluation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra018' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Proposed denomination: **'POULra019'** (see figure 35)
Trade name: Leonie Parade®
Application number: 02-3197
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULhappy' (Charming Parade®) and 'POULesta' (Fiesta Parade®)

Summary: *'POULra019' is a pot rose variety which differs from 'POULhappy' in the number of flowers per shoot and also in flower colour. 'POULhappy' has more flowers per shoot than the candidate variety, and the flower colour is more red, whereas 'POULra019' has fewer flowers per shoot and the flower colour is red-purple to red. The reference variety 'POULesta' has dark pink flowers which are very*

different in colour from 'POULra019'.

Description: 'POULra019' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stem has no prickles or thorns. The leaves are medium to dark green in colour and are moderately glossy on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a moderately leathery texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULra019' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a small to medium number of hairs and stipitate glands. The flower bud is ovoid in shape and there are weak sepal extensions. The flower is round to irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is a flattened convex when viewed from the side. The lower part is flattened convex when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is very double. 'POULra019' has medium red flowers. The petals have small spots at the base of the inner and outer side. Reflexing and undulation of the petal margin is moderate. Some of the outermost petals are double reflexed. The outer stamen has a greenish white filament. The style is medium in length, greenish white in colour and has weak hairiness on the upper half. The stigma is positioned at the same level as or just slightly above the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flower of 'POULra019' has a very weak to weak fragrance.

Origin and Breeding: 'POULra019' originated from a mutation of the variety 'POULra002', discovered early in 1998 in the glasshouses of the breeder in Fredensborg, Denmark. In the spring of 1998 the mutation was selected and propagated for further evaluation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra019' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 23: Comparison table for 'POULra019'

	'POULra019'	'POULhappy'*	'POULesta'*
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	60B	46B	57A-58A
upper surface	46A-60A	46B	57A-58A
lower surface	61B	46B	50B
Overall flower colour (RHS)	46A-60B	46B	57A-58A
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	53A/63A	46B	58B
middle zone	53A/63A	46B	58B
base	155D/6D	155A	4A
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	53B-C	46B	57A/58A
middle zone	53B-C	46B	57A/58A
base	155D/6D	155A	4A

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULra021'** (see figure 36)
Trade name: Lady Parade®
Application number: 02-3198
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULra014' (Julie Parade®), 'POULra018' (Chic Parade®) and 'POULra004' (Claudia Parade®)

Summary: *'POULra021' is a pot rose variety that differs from the reference varieties in flower colour. The flowers of 'POULra021' are more pink than the flowers of the references. 'POULra021' has no thorns on the stem whereas both 'POULra014' and 'POULra004' have red brown, linear thorns. There is significantly less anthocyanin on the young shoots of 'POULra021' than on the shoots of 'POULra014' and 'POULra004'.*

Description: 'POULra021' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour. The stem has no prickles or thorns. The leaves are medium to dark green in colour and are weakly glossy on the upper side (semi-matte appearance). There are five to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a thin, flexible texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULra021' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a small number of hairs and stipitate glands. The flower bud is ovoid in shape and there are moderately weak sepal extensions. The flower is round to irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is a flattened convex when viewed from the side. The lower part is concave when viewed from the side. The flower center is infold to normal and the corolla is double. 'POULra021' has light pink flowers. The petals

have very small spots at the base of the inner and outer side. Reflexing and undulation of the petal margin is moderate. Some of the outermost petals are double reflexed. The outer stamen has a yellow filament. The style is short, with the upper portion a greyed-purple colour and the lower part is greenish white. There is very weak hairiness on the upper half of the style. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, funnel shaped and has no prickles. The flower of 'POULra021' has a weak fragrance.

Origin and Breeding: 'POULra021' originated a controlled crossing between the varieties 'Patricia Kordana' and 'POULsabel'. The cross was made in the summer of 1998 in Fredensborg, Denmark. In the spring of 2000 the seedlings were selected and propagated for further evaluation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra021' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 24: Comparison table for 'POULra018' and 'POUL021'

	'POULra018'	'POULra021'	'POULra014'*	'POULra004'*
Entire leaf length (mm)				
mean	69.5	65.5	87.2	72.2
std. deviation	4.42	4.09	11.14	5.78
Entire leaf width (mm)				
mean	41.7	47.8	52.8	48.7
std. deviation	2.88	4.49	4.75	2.50
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)				
upon opening	29C-D	48C/194A-195B	37B/168A/168C	169C-D/138B-C
upper surface	26D	49B	37C	36A/49C
lower surface	26D	48C	37B-C/29C	36A/19B-C
Overall flower colour (RHS)	36B	49B-C	49B	49B-C/27B-C
Colour of outer surface of petal (RHS)				
margin	36B-C	49A-B	65A-B	27C
middle zone	36A	49A-B	65A-B	27B
base	7C	157C	157C/49D	15D
Colour of inner surface of petal (RHS)				
margin	36B-C	49B-C	36B	27A
middle zone	36A	49B-C	36A	27B/19C
base	7D	157C	157A	15C

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULra022'** (see figure 37)
Trade name: Camilla Parade®
Application number: 02-3199
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULra015' (Denise Parade®) and 'POULra017' (Blanca Parade®)

Summary: *'POULra022' is a pot rose variety that differs from 'POULra015' and 'POULra017' in flower colour. 'POULra022' has white flowers whereas the two reference varieties have yellowish white flowers. 'POULra022 has larger flowers than either reference and also has significantly more petals.*

Description: 'POULra022' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has weak to moderate anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour and is limited to the leaflet and sepal margins

and undersides of the leaves. The stem has moderately sparse thorns which are short, linear in shape and nearly white in colour. The leaves are medium to dark green in colour and are moderately glossy on the upper side. There are three to five leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a moderately thick, leathery texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULra022' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a medium to high number of prickles. The flower bud is ovoid in shape and there are very weak to weak sepal extensions. The flower is round to irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is a flattened convex when viewed from the side. The lower part is concave when viewed from the side. The flower center is infold to normal and the corolla is very double. 'POULra022' has white flowers. The petals have very small spots at the base of the inner and outer side. The petals are moderately to strongly reflexed and the petal margins are moderately undulating. The outer stamen has a greenish white filament. The style is moderately long, greenish white in colour and has no hairiness on the upper half. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is medium in size, broad-funnel shaped and has no prickles. The flower has a weak fragrance.

Origin and Breeding: 'POULra022' originated from a controlled cross between 'Patricia Kordana' and 'POULache'. The original cross was made in Fredensborg, Denmark in the summer of 1999. In the spring of 2000 the seedlings were selected and propagated for further evaluation. 'POULra022' is a selection of one seedling among these seedling plants.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULra022' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 25: Comparison table for 'POULra022'

	'POULra022'	'POULra017'*	'POULra015'*
Flower diameter (mm)			
mean	50.5	33.0	30.5
std. deviation	2.66	2.68	5.50
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	155D	158A/157C	27C
upper surface	155D	158A	27D
lower surface	155D	158B	27C
Overall flower colour (RHS)	155D/159C	158A/159A	27D/18D/15D
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	155D	158B	27D
middle zone	155D	158B	15D
base	1D	2C-D	151C
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	155D	158B	27D
middle zone	155D	158B	15D-18D
base	1D	2B	151C

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULhi012'** (see figure 38)
Trade name: Jolanda Hit®
Application number: 02-3200
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULdel' (Pure Hit®) and 'POULac003' (Dream Palace®)

Summary: *'POULhi012' differs from the reference variety 'POULdel' in flower colour and style colour. The flowers of 'POULhi012' are whiter than those of 'POULdel' which have a light yellow hue. The leaves of 'POULhi012' are larger than those of 'POULdel'. Also, the style of 'POULhi012' is off-white to pink, whereas it is red in 'POULdel'. 'POULhi012' differs from the other candidate variety 'POULac003' in flower colour.*

Description: 'POULhi012' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very weak to weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour and is limited to the undersides of the new leaflets. The stem has sparse thorns which are short, linear in shape and nearly white in colour. The leaves are medium to dark green in colour and are moderately glossy on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a thin/flexible texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULhi012' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has few prickles. The flower bud is ovoid to globular in shape and there are very weak to weak sepal extensions. The flower is round to irregularly rounded in shape when viewed from above and the

upper part is a flattened convex when viewed from the side. The lower part is concave when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is very double. 'POULhi012' has white flowers. The petals have small spots at the base of the inner and outer side. The petals are moderately to strongly reflexed and the petal margins are weakly undulating. The outer stamen has a yellow filament. The style is short, greenish white in colour and has no hairiness on the upper half. The stigma is positioned at the same level as the anthers. The receptacle is medium in size, broad-funnel shaped and has no prickles. The flower has a very weak fragrance.

Origin and Breeding: 'POULhi012' originated from a controlled cross between 'Patricia Kordana' and 'POULache'. The original cross was made in Fredensborg, Denmark in the summer of 1999. In the spring of 2000 the seedlings were selected and propagated for further evaluation. 'POULhi012' is a selection of one seedling among these seedling plants.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULhi012' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 26: Comparison table for 'POULhi0122'

	'POULhi012'	'POULdel'*	'POULac003'*
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	157C	2D	1C & 3C
upper surface	157C	2D	8B
lower surface	157C	2D	10B
Overall flower colour (RHS)			
	155A	2D	8C with 19C-D
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	155A	4D	8C-D
middle zone	155D	4D	8B-C
base	10D	4D	n/a
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	155A	2D	8C-D
middle zone	155A - 10D	2D	8B-C
base	10D	4D	8B

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULac003'** (see figure 39)
Trade name: Dream Palace®
Application number: 02-3201
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULrent' (Laurent Hit®)

Summary: *'POULac003' is a pot rose variety that differs from the reference variety 'POULrent' in flower colour, corolla type and style colour. The flowers of 'POULac003' are a lighter yellow than the flowers of 'POULrent'. 'POULac003' has significantly more petals than 'POULrent' and the style is pink, whereas it is red in 'POULrent'. 'POULac003' differs from the other candidate variety 'POULhi012' in flower colour. The flowers of 'POULhi012' are a lighter shade of yellow, almost white in colour.*

Description: 'POULac003' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour and is limited to the undersides of the new leaflets. The stem has sparse thorns which are short, linear in shape and nearly white in colour. The leaves are medium to dark green in colour and are moderately glossy on the upper side. There are three to seven leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a thin/flexible texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULac003' flowers early and flowers almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has numerous prickles and stipitate glands. The flower bud is ovoid to pointed in shape and there are very weak to weak sepal extensions. The flower is irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is a flattened convex to convex when viewed from the side. The lower part is concave when viewed from the side. The flower center is infold to normal and the corolla is very double. 'POULac003' has light to medium yellow flowers. The petals have very small spots at the base of the inner and outer side. The petal margins are moderately to strongly reflexed and the outermost petals are double reflexed. The petal margins are moderately undulating. The outer stamen has a yellow-green filament. The style is long, greenish white in colour near the top and pink at the base. There is no hairiness on the upper half. The stigma is positioned far above the anthers. The receptacle is medium in size, broad-funnel shaped and has no prickles. The flower has a weak to moderate fragrance.

Origin and Breeding: 'POULac003' originated from a controlled cross between two unnamed seedlings. The original cross was made in Fredensborg, Denmark in the spring of 1995. Seeds were planted in December 1995 and germinated during the winter and early spring. In the spring of 1996 the seedlings were selected and propagated for further evaluation. 'POULac003' is a selection of one seedling among these seedling plants.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULac003' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 27: Comparison table for 'POULac003'

	'POULac003'	'POULrent'*	'POULhi012'*
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	1C & 3C	6D	157C
upper surface	8B	6D	157C
lower surface	10B	6D	157C
Overall flower colour (RHS)			
	8C with 19C-D	6D	155A
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	8C-D	3D	155A
middle zone	8B-C	5C	155D
base	n/a	6B	10D
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	8C-D	3D	155A
middle zone	8B-C	5C	155A - 10D
base	8B	6B	10D

* reference varieties

Proposed denomination: **'POULty003'** (see figure 40)
Trade name: Cerise Party®
Application number: 02-3202
Application date: 2002/07/30
Applicant: Poulsen Roser ApS, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman, Barbacki Moreau, Montreal, Quebec

Variety used for comparison: 'POULtre' (Joy Party®) and 'POULfuna' (Fun Parade®)

Summary: *'POULty003' is a pot rose variety that differs from the reference 'POULtre' in flower colour. 'POULty003' differs from 'POULfuna' in flower colour, corolla type and diameter and size of the leaves. 'POULty003' has larger flowers and larger leaves than 'POULfuna'. 'POULty003' also has significantly fewer petals than 'POULfuna'.*

Description: 'POULty003' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The young shoot has very weak anthocyanin colouration which is reddish-brown in colour and is limited to the margins of the youngest leaves. The stem has no prickles or thorns. The leaves are light green in colour and have weak to medium glossiness on the upper side. There are three to five leaflets. The terminal leaflet has a serrate margin and a leathery texture. The leaflet base is obtuse in shape.

'POULty003' flowers early and almost continuously for more than ten weeks. There is a low number of flowers per flowering shoot and the flower pedicel has a medium number of prickles. The flower bud is pointed to ovoid in shape and there are moderately weak sepal extensions. The flower is irregularly rounded in shape when viewed from above and the upper part is a flattened convex when viewed from the side. The lower part is flattened convex when viewed from the side. The flower center is normal and the corolla is semi-double. 'POULty003' has deep pink flowers. The petals are large with small spots at the base of the outer side and medium sized spots at the base of the petal on the inner side. Reflexing of the petal margin is weak to medium and undulation of the petal margin is weak. The outer stamen has a light green filament. The style is long, greenish white at the base and red in the upper part with weak hairiness. The stigma is positioned above the anthers. The receptacle is small, broad funnel shaped and has no prickles. The flower has a very weak fragrance.

Origin and Breeding: 'POULty003' originated from a crossing between the varieties 'POULpeacy' and 'POULnys'. The cross was made in the summer of 1998 in Fredensborg, Denmark. In the spring of 1999 the seedlings were selected and propagated for further evaluation. 'POULty003' is a selection of one seedling among those seedling plants.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULty003' were conducted in Burlington, Ontario in the summer of 2002. The trials consisted of 8 plants per variety grown in 10 cm pots. Measured characteristics were based on six measurements. Colour determinations were made using the 1995 RHS colour chart.

Table 28: Comparison table for 'POULty003'

	'POULty003'	'POULtre'*	'POULfuna'*
Flower diameter (mm)			
mean	43.0	29.2	28.7
std. deviation		4.47	1.641.21
Colour of flower bud (one-quarter open) (RHS)			
upon opening	58A/59D	65C	53D
upper surface	57C	65B	53D
lower surface	58B	65C	53D
Overall flower colour (RHS)			
	58B	65C	66A
Colour of outer surface of petal (RHS)			
margin	58C	65B	66C
middle zone	58B	65C	66C
base	1D	1D	11D
Colour of inner surface of petal (RHS)			
margin	58B/C	65B	66A
middle zone	58B	65C	66A
base	157A	1D	3C

* reference varieties

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

Proposed denomination: **'Rodeo'**
Previously proposed denomination: **'OT99-4'**
Application number: 01-2558

Application date: 2001/03/09
Applicant: Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'OAC Clinton' and 'PS44'

Summary: *'Rodeo' has a shorter plant height and lighter seed weight than 'PS 44'. 'Rodeo' has a higher protein and oil content than the reference varieties.*

Description: 'Rodeo' is an oilseed soybean variety. The hypocotyl is purple in colour and the flowers are purple. The stem termination genotype is indeterminate and the plant pubescence is brown in colour. The mature pod colour is brown. 'Rodeo' has elongate flattened seed shape. The seed coat is yellow in colour and has a dull lustre. The hilum is imperfect yellow in colour and the cotyledon colour of mature seed is yellow. 'Rodeo' has good resistance to lodging.

Origin and Breeding: 'Rodeo' originated from the cross Maple Arrow/PI 361088B//3*Maple Glen/3/AC Harmony. The final cross was made in 1991 by the Eastern Cereal and Oilseed Research Centre, Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario. Pedigree selection was employed through the F5 generation. In the F5 generation, selected progeny rows were bulked for evaluation in following generations. 'Rodeo' was tested under the experimental designation X3519-4-5-2 in Ottawa in 1996 and 1997 and as OT99-4 in six sites in Ontario and Quebec in 1998. The variety was tested in private registration trials in Ontario and Quebec in 1999 and public registration trials in 2000.

Tests and Trials: 'Rodeo' was tested at the Central Experimental Farm, Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario in 2001 and 2002. The trials consisted of four replications per variety with four rows per replication.

Table 29: Comparison table for 'Rodeo'

	'Rodeo'	'OAC Clinton'*	'PS 44'*
Plant height (cm)			
mean	67	67	71
std. deviation	2.2	2.2	2.2
Heat unit rating	2550	2550	2700
Seed weight (grams per 100 seed)	15.1	15.4	17.2
Protein content (%)	41.1	39.6	40.1
Oil content (%)	24.6	23.3	23.6

* reference varieties

Proposed denomination: **'Dundas'** (see figure 41)
Previously proposed denomination: **'OT99-5'**
Application number: 01-2559
Application date: 2001/03/09
Applicant: Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario

Varieties used for comparison: 'OAC Bayfield' and 'AC 2001'

Summary: *'Dundas' has green hypocotyl colour and white flowers while the reference varieties have purple hypocotyls and flowers. 'Dundas' has shorter plant height than 'AC 2001'. The seed of 'Dundas' has lighter brown hilum colour*

than the seed of the reference varieties. 'Dundas' has a higher protein content than 'AC 2001'.

Description: 'Dundas' is an oilseed soybean variety. The hypocotyl is green in colour and the flowers are white. The stem termination genotype is indeterminate and the plant pubescence is brown in colour. The mature pod colour is brown. 'Dundas' has spherical flattened seed shape. The seed coat is yellow in colour and has a dull lustre. The hilum is light brown in colour and the cotyledon colour of mature seed is yellow. 'Dundas' has good resistance to lodging.

Origin and Breeding: 'Dundas' originated from the cross Maple Arrow/PI 361088B//3*Maple Glen/3/AC Harmony. The final cross was made in 1991 by the Eastern Cereal and Oilseed Research Centre, Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario. Pedigree selection was employed through the F5 generation. In the F5 generation, selected progeny rows were bulked for evaluation in following generations. 'Dundas' was tested under the experimental designation X3519-63-5-4 in Ottawa in 1996 and 1997 and as OT99-5 in six sites in Ontario and Quebec in 1998. The variety was tested in private registration trials in Ontario and Quebec in 1999 and public registration trials in 2000.

Tests and Trials: 'Dundas' was tested at the Central Experimental Farm, Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario in 2001 and 2002. The trials consisted of four replications per variety with four rows per replication.

Table 30: Comparison table for 'Dundas'

	'Dundas'	'OAC Bayfield'*	'AC 2001'*
Plant height (cm)			
mean	67	70	83
std. deviation	2.04	2.04	2.04
Heat unit rating	2750	2650	2750
Seed weight (grams per 100 seed)	17.1	17.3	16.3
Protein content (%)	40.3	40.1	37.9
Oil content (%)	23.5	23.6	24.8

* reference varieties

Proposed denomination: **'Ustie'**
Application number: 02-3261
Application date: 2002/09/05
Applicant: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan and Lyle Morrison & Partners, Norfolk, England
Agent in Canada: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan
Breeder: Ukraine Institute of Agriculture, Kiev, Ukraine

Variety used for comparison: 'Gentleman'

Summary: *'Ustie' flowers earlier than 'Gentleman'. The plants of 'Ustie' are determinate while 'Gentleman' has semi-determinate plants. 'Ustie' has more erect plants than the reference variety. The seed pods of 'Ustie' are brown, whereas 'Gentleman' has tan coloured pods. The seed is spherical flattened in shape for 'Ustie' while it is elongate flattened for 'Gentleman'.*

Description: 'Ustie' is an oilseed soybean variety. The hypocotyl is purple in colour and the leaves are medium green. The terminal leaflet is small and ovate in shape. The leaf texture is intermediate between smooth and wrinkled and there is moderate pubescence which is semi-appressed in form. There are three leaflets.

'Ustie' has purple flowers. The stem termination genotype is determinate and the plant growth habit is erect. 'Ustie' is sensitive to day length. The plant pubescence colour at mid-pod fill stage is brown and the mature pod colour is brown. The seed of 'Ustie' is spherical flattened in shape. The seed coat is shiny and is yellow in colour. The medium sized hilum is brown in colour. The cotyledon colour of mature seed is yellow. 'Ustie' has good resistance to shattering and lodging.

Origin and Breeding: 'Ustie' originated from the cross 'Belosnezhka' x 'Zhemchyzhna', made at the Ukraine Institute of Agriculture, Kiev, Ukraine in 1986. The final selection was made in 1994 and the variety was tested from 1996 to 1998. State testing occurred from 1999 to 2001 in the Ukraine where it was registered in 2002 for seed production.

Tests and Trials: 'Ustie' was tested at Qu'Appelle, Saskachewan in 2001 and 2002. The trials consisted of four replications per variety. Each replication was approximately 10 metres long and 1.5 metres wide.

Proposed denomination: 'Kievskaya98'
Application number: 02-3262
Application date: 2002/09/05
Applicant: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan and Lyle Morrison & Partners, Norfolk, England
Agent in Canada: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan
Breeder: Ukraine Institute of Agriculture, Kiev, Ukraine

Variety used for comparison: 'Gentleman'

Summary: *'Kievskaya98' flowers later and matures slightly later than 'Gentleman'. The plants of 'Kievskaya98' are taller than those of 'Gentleman'. The seed pods of 'Kievskaya98' are dark brown, whereas 'Gentleman' has tan coloured pods. The seed is spherical flattened in shape for 'Kievskaya98' while it is elongate flattened for 'Gentleman'.*

Description: 'Kievskaya98' is an oilseed soybean variety. The hypocotyl is purple in colour and the leaves are medium green. The terminal leaflet is small and ovate in shape. The leaf texture is intermediate between smooth and wrinkled and there is moderate pubescence which is semi-appressed in form. There are three leaflets.

'Kievskaya98' has purple flowers. The stem termination genotype is semi-determinate and the plant growth habit is erect. 'Kievskaya98' is sensitive to day length. The plant pubescence colour at mid-pod fill stage is brown and the mature pod colour is dark brown. The seed of 'Kievskaya98' is spherical flattened in shape. The seed coat is shiny and is yellow in colour. The medium sized hilum is brown in colour. The cotyledon colour of mature seed is yellow. 'Kievskaya98' has good resistance to shattering and lodging.

Origin and Breeding: 'Kievskaya98' originated from the cross 'Iskra' x '421968-7613', made at the Ukraine Institute of Agriculture, Kiev, Ukraine in 1984. The final selection was made in 1992 and the variety was tested from 1995 to 1997. State testing occurred from 1998 to 1999 in the Ukraine where it was registered in 2001 for seed production.

Tests and Trials: 'Kievskaya98' was tested at Qu'Appelle, Saskachewan in 2001 and 2002. The trials consisted of four replications per variety. Each replication was approximately 10 metres long and 1.5 metres wide.

Proposed denomination: 'Chernyatka'
Application number: 02-3263
Application date: 2002/09/05
Applicant: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan and Lyle Morrison & Partners, Norfolk, England
Agent in Canada: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan
Breeder: Ukraine Institute of Agriculture, Kiev, Ukraine

Variety used for comparison: 'Gentleman'

Summary: *The plants of 'Chernyatka' are slightly taller than the plants of 'Gentleman'. The leaves are lighter green in 'Chernyatka' and the terminal leaflets are larger than those of 'Gentleman'. The pubescence on the pods of 'Chernyatka' is gray, whereas it is brown (tawny) on 'Gentleman'. 'Chernyatka' matures later than 'Gentleman' and has a higher seed weight.*

Description: 'Chernyatka' is an oilseed soybean variety. The hypocotyl is purple in colour and the leaves are light to medium green. The terminal leaflet is ovate in shape and is medium in size. The leaf texture is intermediate between smooth and wrinkled and there is moderate pubescence which is semi-appressed in form. There are three leaflets.

'Chernyatka' has purple flowers. The stem termination genotype is determinate and the plant growth habit is erect. 'Chernyatka' is sensitive to day length. The plant pubescence colour at mid-pod fill stage is gray and the mature pod colour is tan. The seed of 'Chernyatka' is elongate flattened in shape. The seed coat is shiny and is yellow in colour. The medium sized hilum is brown in colour. The cotyledon colour of mature seed is yellow. 'Chernyatka' has fair resistance to shattering and good resistance to lodging.

Origin and Breeding: 'Chernyatka' originated from the cross 'Chayka' x '4/75' (a Swedish variety), made at the Ukraine Institute of Agriculture, Kiev, Ukraine in 1981. The final selection was made in 1985 and the variety was tested from 1991 to 1994. State testing occurred from 1995 to 1997 in the Ukraine where it was registered in 1998 for seed production.

Tests and Trials: 'Chernyatka' was tested at Qu'Appelle, Saskachewan in 2001 and 2002. The trials consisted of four replications per variety. Each replication was approximately 10 metres long and 1.5 metres wide.

Proposed denomination: **'Giessen'**
Application number: 02-3264
Application date: 2002/09/05
Applicant: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan and the Plant Breeding Institute of Giessen
Agent in Canada: Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle, Saskatchewan
Breeder: Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung, Giessen, Germany

Variety used for comparison: 'Gentleman'

Summary: *'Giessen' flowers earlier than 'Gentleman'. The plants of 'Giessen' have a lanceolate terminal leaflet whereas the terminal leaflet of 'Gentleman' is ovate. The plant pubescence of 'Giessen' is gray whereas it is brown for 'Gentleman'. 'Giessen' is insensitive to photoperiod while the reference variety is sensitive. The seed of 'Giessen' has a yellow hilum, compared with 'Gentleman' which has a brown hilum.*

Description: 'Giessen' is an oilseed soybean variety. The hypocotyl is purple in colour and the leaves are medium green. The terminal leaflet is small and lanceolate in shape. The leaf texture is intermediate between smooth and wrinkled and there is moderate pubescence which is semi-appressed in form. There are three leaflets. 'Giessen' has purple flowers. The stem termination genotype is semi-determinate and the plant growth habit is semi-erect. 'Giessen' is not sensitive to day length. The plant pubescence colour at mid-pod fill stage is gray and the mature pod colour is brown. The seed of 'Giessen' is elongate flattened in shape. The seed coat is shiny and is yellow in colour. The medium sized hilum is yellow in colour. The cotyledon colour of mature seed is yellow. 'Giessen' has good resistance to shattering and lodging.

Origin and Breeding: 'Giessen' originated from the cross 'GG51' x 'GG24', carried out at the Gross-Gerau Breeding Station in 1964. The pedigree of the two parental lines is not traceable beyond being originally sourced from an extended germplasm collection of landraces from Northeastern Asia during the 1935-1940 collection programme. The variety was grown and selected for uniformity, high yield and early maturity as the seed line was purified and stabilized. The seed line was provided to Terramax Holding Corporation in 1994 with authorization from Giessen University for multiplication and cross-breeding.

Tests and Trials: 'Giessen' was tested at Qu'Appelle, Saskachewan in 2001 and 2002. The trials consisted of four replications per variety. Each replication was approximately 10 metres long and 1.5 metres wide.

4. APPLICATIONS ABANDONED

BOUVARDIA
(*Bouvardia* species Salisb.)

➤ **Applicant:** Bouvardiakwekerij de Jong vof, Roelofarendsveen, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1675
Application date: 1999/05/20
Date abandoned: 2002/12/09
Proposed denomination: **'Green Spring'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 99-1574
Application date: 1999/03/22
Date abandoned: 2002/12/09
Proposed denomination: **'295 BX'**

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 99-1577
Application date: 1999/03/22
Date abandoned: 2002/12/09
Proposed denomination: **'Cartier BX'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 97-1080
Application date: 1997/05/23
Date abandoned: 2002/12/09
Proposed denomination: **'KORamvis'**

5. APPLICATIONS WITHDRAWN

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 02-3014
Application date: 2002/03/12
Date Withdrawn: 2003/03/19
Proposed denomination: **'TR169'**

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 02-3015
Application date: 2002/03/12
Date Withdrawn: 2003/03/19
Proposed denomination: **'BT483'**

BLUE GRAMA
(*Bouteloua gracilis* (H.B.K.) Lag. ex Steud.)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Ducks Unlimited Canada, Brandon, Manitoba
Application number: 01-2807
Application date: 2001/08/07
Date Withdrawn: 2003/05/22
Proposed denomination: **'BG-MB'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 97-1015
Application date: 1997/04/07
Date Withdrawn: 2003/03/31
Proposed denomination: **'NS2177'**

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 99-1575
Application date: 1999/03/22
Date Withdrawn: 2003/04/08
Proposed denomination: **'Armor BX'**

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 99-1576
Application date: 1999/03/22
Date Withdrawn: 2003/04/08
Proposed denomination: **'Zodiac BX'**

➤ **Applicant:** DSV Canada Inc., Winnipeg, Manitoba
Application number: 00-2203
Application date: 2000/04/14
Date Withdrawn: 2003/04/24
Proposed denomination: **'445RR'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3468
Application date: 2003/02/07
Date Withdrawn: 2003/04/30
Proposed denomination: **'NR00-1301'**

FLAX
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Applicant:** United Grain Growers Ltd., Morden, Manitoba
Application number: 00-2155
Application date: 2000/03/22
Date Withdrawn: 2003/04/25
Proposed denomination: **'2021'**

GREEN NEEDLEGRASS
(*Nassella viridula* (Trin.) Barkworth)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Brandon, Manitoba
Application number: 02-3109
Application date: 2002/05/31
Date Withdrawn: 2003/05/22
Proposed denomination: **'Mallard'**

HELIPTERUM / RHODANTHE
(*Helipterum anthemoides* (Spreng.) DC.)

➤ **Applicant:** Esma Salkin, Mt. Waverley, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-2002
Application date: 1999/12/20
Date Withdrawn: 2003/03/28
Proposed denomination: **'Paper Cascade'**

➤ **Applicant:** Plant Growers Australia Pty. Ltd., Wonga Park, Victoria, Australia
Application number: 99-2003
Application date: 1999/12/20
Date Withdrawn: 2003/03/28
Proposed denomination: **'Paper Star'**
Synonym: APS 91/B1

IMPATIENS
(*Impatiens hawkeri* W. Bull.)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 99-1844
Application date: 1999/11/05
Date Withdrawn: 2003/05/05
Proposed denomination: **'Ovation Hot Red'**
Tradename: Ovation Deep Orange

LITTLE BLUESTEM, BUNCHGRASS
(*Schizachyrium scoparium* (Michx.) Nash.)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Application number: 00-2198
Application date: 2000/04/07
Date Withdrawn: 2003/05/22
Proposed denomination: **'Taylor'**

NEMESIA
(*Nemesia* species Venten.)

➤ **Applicant:** Christopher & Martin Tellwright, Bognor Regis, West Sussex, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2141
Application date: 2000/03/03
Date Withdrawn: 2003/04/17
Proposed denomination: **'Fleuron'**
Tradename: Melanie
Tradename: Lavender Sachet

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1957
Application date: 1999/12/15
Date Withdrawn: 2003/04/02
Proposed denomination: **'Sunny Ingrid'**
Tradename: Ingrid

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1958
Application date: 1999/12/15
Date Withdrawn: 2003/04/02
Proposed denomination: **'Sunny Silvia'**
Tradename: Silvia

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1959
Application date: 1999/12/15
Date Withdrawn: 2003/04/02
Proposed denomination: **'Sunny Sonja'**
Tradename: Sonja

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2583
Application date: 2001/03/20
Date Withdrawn: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Akvarza'**

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2585
Application date: 2001/03/20
Date Withdrawn: 2003/05/06
Proposed denomination: **'Akvarlu'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 01-2934
Application date: 2001/12/11
Date Withdrawn: 2003/04/14
Proposed denomination: **'KLEP01002'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 01-2936
Application date: 2001/12/11
Date Withdrawn: 2003/04/14
Proposed denomination: **'KLEP01028'**
Tradename: Royal™ Candy Cane

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 01-2927
Application date: 2001/12/11
Date Withdrawn: 2003/04/14
Proposed denomination: **'KLEW01066'**

PRAIRIE JUNEGRASS
(*Koeleria macrantha* (Ledeb.) J.A. Schultes)

➤ **Applicant:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: Ducks Unlimited Canada, Brandon, Manitoba
Application number: 01-2806
Application date: 2001/08/07
Date Withdrawn: 2003/05/22
Proposed denomination: **'PG-MB'**

➤ **Applicant:** Native Plant Solutions, Winnipeg, Manitoba
Application number: 02-3114
Application date: 2002/06/14
Date Withdrawn: 2003/05/22
Proposed denomination: **'Battle River'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 97-1101
Application date: 1997/07/22
Date Withdrawn: 2003/03/31
Proposed denomination: **'TANiliram'**

➤ **Applicant:** Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 97-1192
Application date: 1997/12/03
Date Withdrawn: 2003/05/05
Proposed denomination: **'TANafira'**

➤ **Applicant:** W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1258
Application date: 1998/03/11
Date Withdrawn: 2003/03/24
Proposed denomination: **'KORlauka'**

SNAPDRAGON
(*Antirrhinum* L.)

➤ **Applicant:** A.T. Yates & Son, Cheshire, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2144
Application date: 2000/03/03
Date Withdrawn: 2003/04/17
Proposed denomination: **'Yapear'**
Tradename: Chandelier Pearl

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Applicant:** Hyland Seeds, Division of W.G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim, Ontario
Application number: 97-1150
Application date: 1997/09/16
Date Withdrawn: 2003/04/28
Proposed denomination: **'Starburst'**

SPELT
(*Triticum spelta* L.)

➤ **Applicant:** Pflanzenzucht Oberlimpurg, Schwaebisch Hall, Germany
Agent in Canada: Torys LLP, Toronto, Ontario
Application number: 99-1821
Application date: 1999/10/18
Date Withdrawn: 2003/06/03
Proposed denomination: **'Franckenkorn'**

SUTERA
(*Sutera* Roth.)

➤ **Applicant:** A.T. Yates & Son, Cheshire, United Kingdom
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2147
Application date: 2000/03/03
Date Withdrawn: 2003/04/17
Proposed denomination: **'Yagepin'**
Tradename: **Penny Candy Pink**

TIMOTHY
(*Phleum pratense* L.)

➤ **Applicant:** Hokuren, The Federation of Agricultural Co-operative Societies of Hokkaido, Sapporo, Japan
Agent in Canada: General Feed & Grain, Inc., Creston, British Columbia
Application number: 99-1566
Application date: 1999/03/08
Date Withdrawn: 2003/03/04
Proposed denomination: **'Aurora'**

VERBENA
(*Verbena hybrida* Hort. ex Groenl. & Rumpler)

➤ **Applicant:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Application number: 00-2172
Application date: 2000/03/23
Date Withdrawn: 2003/05/02
Proposed denomination: **'Balazrepi'**
Tradename: Aztec™ Rose Pink Improved

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** Virginia Tech Intellectual Properties, Inc., Blacksburg, Virginia, U.S.A.
Agent in Canada: Ridgetown College, University of Guelph, Ridgetown, Ontario
Application number: 01-2822
Application date: 2001/09/21
Date Withdrawn: 2003/05/21
Proposed denomination: **'Sisson'**

6. CHANGE OF DENOMINATION

BEAN
(*Phaseolus vulgaris* L.)

➤ **Applicant:** Hyland Seeds, Division of W.G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim, Ontario
Application number: 02-3221
Application date: 2002/08/22
Previously proposed denomination: **'T9803'**
Proposed denomination: **'Cirrus'**

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 02-3377
Application date: 2002/11/21
Previously proposed denomination: **'Cal Blu'**
Proposed denomination: **'Cal Bule'**
Tradename: Callie Blue

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Monsanto Canada Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 01-2671
Application date: 2001/04/17
Previously proposed denomination: **'PR6044'**
Proposed denomination: **'33-95'**

➤ **Applicant:** Advanta Canada Inc., Winnipeg, Manitoba
Application number: 02-3057
Application date: 2002/04/23
Previously proposed denomination: **'S9018'**
Proposed denomination: **'292CL'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 02-3065
Application date: 2002/04/26
Previously proposed denomination: **'NS4571'**
Proposed denomination: **'43A56'**

CONEFLOWER
(*Echinacea purpurea* (L.) Moench)

➤ **Applicant:** Norseco Inc., Laval, Quebec
Application number: 99-1775
Application date: 1999/08/31
Previously proposed denomination: **'Miss Nathalie'**
Proposed denomination: **'Normisnat'**
Tradename: Miss Nathalie

IMPATIENS
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 02-2969
Application date: 2002/01/14
Previously proposed denomination: **'Fisguincoma 1'**
Proposed denomination: **'Fisvision'**
Tradename: Vision Yellow

OATS
(*Avena sativa* L.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Application number: 02-3108
Application date: 2002/05/27
Previously proposed denomination: **'OT2009'**
Proposed denomination: **'Furlong'**

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Application number: 02-3013
Application date: 2002/03/11
Previously proposed denomination: **'Cebeco 1489'**
Proposed denomination: **'Topeka'**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:** A.S. Heijboer, Kloelinge, The Netherlands
Agent in Canada: Solanum International Inc., Edmonton, Alberta
Application number: 01-2874
Application date: 2001/11/16
Previously proposed denomination: **'Baby Spud'**
Proposed denomination: **'Baby Boomer'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Lethbridge, Alberta
Application number: 02-2988
Application date: 2002/02/08
Previously proposed denomination: **'V0168-3'**
Proposed denomination: **'Pacific Russet'**

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ottawa, Ontario
Application number: 01-2558
Application date: 2001/03/09
Previously proposed denomination: **'OT99-4'**
Proposed denomination: **'Rodeo'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 01-2559
Application date: 2001/03/09
Previously proposed denomination: **'OT99-5'**
Proposed denomination: **'Dundas'**

➤ **Applicant:** Hyland Seeds, Division of W.G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim, Ontario
Application number: 02-3222
Application date: 2002/08/22
Previously proposed denomination: **'T9910'**
Proposed denomination: **'Quincy'**

VERBENA
(*Verbena hybrida* Hort. ex Groenl. & Rumpler)

➤ **Applicant:** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 02-3276
Application date: 2002/09/30
Previously proposed denomination: **'Bodcombureye'**
Proposed denomination: **'Bodcomburgeye'**
Tradename: Napoleon Burgundy Eye

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
Agent in Canada: Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 02-3345
Application date: 2002/10/28
Previously proposed denomination: **'BW758'**
Proposed denomination: **'CDC Imagine'**

7. RIGHTS SURRENDERED

ANGELONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Certificate number: 0952
Date granted: 2001/05/23
Date rights surrendered: 2003/05/07
Approved denomination: **'Balangdeum'**
Tradename: AngelMist ™ Deep Plum

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Holder:** Bayer CropScience, Saskatoon, Saskatchewan
Certificate number: 0953
Date granted: 2001/05/24
Date rights surrendered: 2003/05/26
Approved denomination: **'PPS97-238'**

➤ **Holder:** Bayer CropScience, Saskatoon, Saskatchewan
Certificate number: 0954
Date granted: 2001/05/24
Date rights surrendered: 2003/05/26
Approved denomination: **'PPS97-251'**

CHRYSANTHEMUM
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0751
Date granted: 2000/05/18
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Yolafayette'**
Synonym: Lafayette

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0753
Date granted: 2000/05/18
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Yospringfield'**
Synonym: Springfield

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0959
Date granted: 2001/05/25
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Ivory Yoeugene'**
Tradename: Ivory Eugene

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0961
Date granted: 2001/05/25
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Yohartford'**
Tradename: Hartford

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0964
Date granted: 2001/05/25
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Yellow Yogilroy'**
Tradename: Yellow Gilroy

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0970
Date granted: 2001/05/25
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Dark Regal Yodavis'**
Tradename: Dark Regal Davis

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0973
Date granted: 2001/05/25
Date rights surrendered: 2003/05/15
Approved denomination: **'Yoseattle'**
Tradename: Seattle

IMPATIENS
(*Impatiens hawkeri* W. Bull.)

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: Hole's Greenhouse, St. Albert, Alberta
Certificate number: 0636
Date granted: 1999/06/07
Date rights surrendered: 2003/05/21
Approved denomination: **'BFP-844'**
Tradename: Celebrette Pink Jewel

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L. H. Bailey)

➤ **Holder:** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, California, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Certificate number: 0304
Date granted: 1997/05/05
Date rights surrendered: 2003/04/17
Approved denomination: **'Lollipop'**

➤ **Holder:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 0761
Date granted: 2000/05/25
Date rights surrendered: 2003/05/08
Approved denomination: **'Fissil'**
Tradename: Brazil 99

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Holder:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 0622
Date granted: 1999/05/19
Date rights surrendered: 2003/04/30
Approved denomination: **'Fislunova'**
Tradename: Luna 98

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Holder:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 0699
Date granted: 1999/11/22
Date rights surrendered: 2003/05/27
Approved denomination: **'Fisgala'**
Tradename: Galaxy

➤ **Holder:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 0938
Date granted: 2001/05/15
Date rights surrendered: 2003/05/08
Approved denomination: **'Fisson Gold'**
Tradename: Goldstar Pink (Decor)

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Holder:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Agent in Canada: First Line Seeds Limited, Guelph, Ontario
Certificate number: 0299
Date granted: 1997/04/02
Date rights surrendered: 2003/04/16
Approved denomination: **'OAC Exeter'**

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Agent in Canada: First Line Seeds Limited, Guelph, Ontario
Certificate number: 0916
Date granted: 2001/03/12
Date rights surrendered: 2003/03/10
Approved denomination: **'Electron'**

STRAWBERRY
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Holder:** C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti, S. Giuseppe di Comacchio, Ferrara, Italy
Agent in Canada: Fetherstonhaugh & Co., Ottawa, Ontario
Certificate number: 0612
Date granted: 1999/04/12
Date rights surrendered: 2003/04/16
Approved denomination: **'Onebor'**

8. RIGHTS REVOKED

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Holder:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Agent in Canada: Bonis & Company Limited, Lindsay, Ontario
Certificate number: 0861
Date granted: 2000/11/21
Date rights revoked: 2003/03/24
Denomination: **'OAC Hurricane'**

FLAX
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Holder:** United Grain Growers Ltd., Morden, Manitoba
Certificate number: 0205
Date granted: 1995/11/30
Date rights revoked: 2003/03/31
Denomination: **'989'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Holder:** Clarence Terpstra, Ridgeville, Ontario
Certificate number: 0859
Date granted: 2000/10/27
Date rights revoked: 2003/03/03
Denomination: **'Dawn'**

9. CHANGE OF APPLICATION DATE

ROSE
(*Rosa* L.)

➤ **Applicant:** Terra Nigra B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: Derkach Farms, RuthvenOntario
Application number: 02-3389
Previous application date: 2001/12/20 (Priority claimed)
New application date: 2002/12/16
Proposed denomination: **'Seliron'**

10. APPLICATIONS REJECTED

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima*)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1965
Application date: 1999/12/15
Date rejected: 2003/03/21
Proposed denomination: 'Eckadrian'

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medord, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa Ontario
Application number: 98-1195
Application date: 1998/01/19
Date rejected: 2003/05/13
Proposed denomination: 'JACosch'

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medord, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa Ontario
Application number: 98-1219
Application date: 1998/02/02
Date rejected: 2003/05/13
Proposed denomination: 'JACeve'

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medord, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa Ontario
Application number: 98-1220
Application date: 1998/02/02
Date rejected: 2003/05/13
Proposed denomination: **'JACess'**

11. ERRATA

Plant Varieties Journal, April 2003, No. 47

Page 4

The approved denomination for the canola variety, certificate number 1431 should be **PPS97-126 A-line**.

12. COST OF PROTECTION

Issuance of a PBR certificate	500.00
Annual Fee	300.00
Examination of an application	750.00
Protective Direction	50.00
Claim for Priority from a preceeding application outside of Canada	50.00
Change of an approved denomination	100.00
Objection to an application for PBR	200.00
Reinstatement of an abandoned application	100.00
Reinstatement of an abandoned application on petition	200.00
Application for a compulsory license	250.00
Replacement of a lost/destroyed certificate	50.00
Public inspection of the Register	5.00
Copies of documents in the Register (per page)	.50
Purchase of Canadian test results by a UPOV member country	350.00



Fig. 1 Varieties 'Hidala' (left) and 'Lochbuie Red Braeburn' (right) with reference variety 'Braeburn' (bottom) / Variétés 'Hidala' (à gauche) et 'Lochbuie Red Braeburn' (à droite) avec la variété de référence 'Braeburn' (en bas)



Fig. 2 Variety 'Sciglo' (bottom right) with reference varieties 'Splendour' (top left), 'Spartan' (bottom left) and 'Royal Gala' (top right) / Variété 'Sciglo' (à droite, en bas) avec les variétés de référence 'Splendour' (à gauche, en haut), 'Spartan' (à droite, en bas) et 'Royal Gala' (à droite, en haut)



Fig. 3 Variety 'Sciros' (bottom right) with reference varieties 'Splendour' (top left), 'Ambrosia' (bottom left) and 'Mutsu' (top right) / Variété 'Sciros' (à droite, en bas) avec les variétés de référence 'Splendour' (à gauche, en haut), 'Ambrosia' (à droite, en bas) et 'Mutsu' (à droite, en haut)



Fig. 4 Variety 'Huagan' (bottom) with reference varieties 'Spartan' (left) and 'Fuji #2' (right) / Variété 'Huagan' (en bas) avec les variétés de référence 'Spartan' (a gauche) et 'Fuji #2' (à droite)



Fig. 5 Variety '13S2101' (top left) with reference varieties '13S2009' (top right) and 'Sweetheart' (bottom right) / Variété '13S2101' (à gauch, en haut) avec les variétés de référence '13S2009' (à droite, en haut) et 'Sweetheart' (à droite, en bas)



Fig. 6 Variety 'I181644' (left) with reference variety '3AZA1' (right) / Variété 'I181644' (à gauche) avec la variété de référence '3AZA1' (à droite)

Fig. 7 Variety 'I325350' (left) with reference variety '3AZA1' (right) / Variété de référence 'I325350' (à gauche) avec la variété de référence '3AZA1' (à droite)



Fig. 8 Variety 'CDC Orrin' (bottom left) with reference varieties 'CDC Pacer' (top left), 'CDC Boyer' (top right) and AC Assiniboia' (bottom right) / Variété 'CDC Orrin' (à gauche, en bas) avec les variétés de référence 'CDC Pacer' (à gauche, en haut), 'CDC Boyer' (à droite, en haut) et 'AC Assiniboia' (à droite, en bas)



Fig. 9 Variety 'Furlong' (top) with reference varieties (from top to bottom) 'CDC Dancer', 'AC Assiniboia' and 'Ronald' / Variété 'Furlong' (en haut) avec les variétés de référence' CDC Dancer', 'AC Assiniboia', et 'Ronald' (de haut en bas)



Fig. 10 Variety 'Seidacre' (left) with reference varieties 'Akvarza' (centre) and 'Seikilrem' (right) / Variété 'Seidacre' (à gauche) avec les variétés de référence 'Akvarza' (au centre) et 'Seikilrem' (à droite)



Fig. 11 Variety 'Seikilrem' (left) with reference varieties 'Seidacre' (centre) and 'Zulu' (right) / Variété 'Seikilrem' (à gauche) avec les variétés de référence 'Seidacre' (au centre) et 'Zulu' (à droite)



Fig. 12 Variety 'Seikimora' (left) with reference varieties 'Seikilrem' (centre) and 'Akope' (right) / Variété 'Seikimora' (à gauche) avec les variétés de référence 'Seikilrem' (au centre) et 'Akope' (à droite)



Fig. 13 Variety 'Seitope' (left) with reference varieties 'Seikilrem' (centre) and 'Akope' (right) / Variété 'Seitope' (à gauche) avec les variétés de référence 'Seikilrem' (au centre) et 'Akope' (à droite)



Fig. 14 Variety 'Sevamil' (left) with reference varieties 'Beira' (centre) and 'Seikilrem' (right) / Variété 'Sevamil' (à gauche) avec les variétés de référence 'Beira' (au centre) et 'Seikilrem' (à droite)



Fig. 15 Variety 'Nessie' / Variété 'Nessie'

Fig. 16 Reference variety 'Majoret' / Variété de référence 'Majoret'



Fig. 17 Variety 'SW Capri' / Variété 'SW Capri'



Fig. 18 Reference variety 'Majoret' / Variété de référence 'Majoret'



Fig. 19 Reference variety 'Carneval' / Variété de référence 'Carneval'



Fig. 20 Variety 'SW Salute' / Variété 'SW Salute'



Fig. 21 Reference variety 'Highlight' / Variété de référence 'Highlight'



Fig. 22 Variety 'SW Belfield' / Variété 'SW Belfield'



Fig. 23 Reference variety 'Majoret' / Variété de référence 'Majoret'

Fig. 24 Reference variety 'Carneval' / Variété de référence 'Carneval'



Fig. 25 Variety 'SW Prize' / Variété 'SW Prize'



Fig. 26 Variety 'SW Circus' / Variety 'SW Circus'



Fig. 27 Variety 'POULra016' (left) with reference variety 'POULhappy' (right) / Variété 'POULra016' (à gauche) avec la variété de référence 'POULhappy' (à droite)



Fig. 28 Variety 'POULhi005' (left) with reference varieties 'POULypso' (top right) and 'POULrolyt' (bottom right) / Variété 'POULhi005' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULypso' (à droite, en haut) et 'POULrolyt' (à droite, en bas)



Fig. 29 Variety 'POULhi008' (left) with reference variety 'POULhilda' (right) / Variété 'POULhi008' (à gauche) avec la variété de référence 'POULhilda' (à droite)



Fig. 30 Variety 'POULra017' (left) with reference varieties 'POULra015' (centre) and 'POULra022' (right) / Variété 'POULra017' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULra015' (au centre) et 'POULra022' (à droite)



Fig. 31 Variety 'POULra018' (centre right) with reference varieties 'POULra021' (left), 'POULra014' (centre left) and 'POULra004' (right) / Variété 'POULra018' (au centre, à droite) avec les variétés de référence 'POULra021' (à gauche), 'POULra014' (au centre, à droite) et 'POULra004' (à droite)



Fig. 32 Variety 'POULra019' (left) with reference varieties 'POULhappy' (centre) and 'POULesta' (right) / Variété 'POULra019' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULhappy' (au centre) et 'POULesta' (à droite)



Fig. 33 Variety 'POULra021' (left) with reference varieties 'POULra014' (centre left), 'POULra018' (centre right) and 'POULra004' (right) / Variété 'POULra021' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULra014' (au centre, a gauche), 'POULra018' (au centre, à droite) et 'POULra021' (à droite)



Fig. 34 Variety 'POULra022' (left) with reference varieties 'POULra015' (centre) and 'POULra017' (right) / Variété 'POULra022' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULra015' (au centre) et 'POULra017' (à droite)



Fig. 35 Variety 'POULhi012' (left) with reference variety 'POULdel' (right) / Variété 'POULhi012' (à gauche) avec la variété de référence 'POULdel' (à droite)



Fig. 36 Variety 'POULac003' (left) with reference variety 'POULrent' (right) / Variété 'POULac003' (à gauche) avec la variété de référence 'POULrent' (à droite)



Fig. 37 Variety 'POULty003' (left) with reference varieties 'POULfuna' (centre) and 'POULtre' (right) / Variété 'POULty003' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULfuna' (au centre) et 'POULtre' (à droite)



Fig 38 Variety 'Dundas' (left) with reference varieties 'OAC Bayfield' (centre) and 'AC 2001' (right) / Variété 'Dundas' (à gauche) avec les variétés de référence 'OAC Bayfield' (au centre) et 'AC 2001' (à droite)

Bulletin des variétés végétales

BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Pour toute correspondance avec le BPOV, utiliser l'adresse suivante :

Bureau de la protection des obtentions végétales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario)
K1A 0Y9

Pour les demandes de renseignements généraux concernant la protection des obtentions végétales,communiquer avec l'un ou l'autre des employés du BPOV, par télécopieur au (613) 228-6629, par courrier électronique, ou par téléphone au (613) 225-CFIA (225-2342) aux postes indiqués.

Visitez notre site web à:
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/pbrpovf.shtml

Employés du Bureau de la protection des obtentions végétales		# de Poste
Directrice, POV	Valerie Sisson (vsisson@inspection.gc.ca)	4384
Agents, POV	Elizabeth Prentice-Hudson (eprentice@inspection .gc.ca)	4393
	Christine Irving (cirving@inspection.gc.ca)	4394
	Sandy Marshall (smarshall@inspection.gc.ca)	4392
	Michel Cormier (mcormier@inspection.gc.ca)	4391
	Michael Burvill (burvill@inspection.gc.ca)	4501
Coordinateur de projets	Bill Hanson (bhanson@inspection.gc.ca)	4388

13. Délivrance des certificats d'obtention 93
Astilbe 93
Blé 93
Canola 93
Fraisier 94
Lin 94
Maïs 94
Muflier 95
Némésie 95
Ostéospermum 95
Pérovskia 95
Phlox 96
Pied-d'Alouette 96
Pois 96
Rosier 96
Sidalcée 98
Soja 98
Sutéra 98

14. Demandes dont le dépôt est accepté 100
Alstroemère 100
Angélonia 100
Blé 100
Brome hybride 100
Calibrachoa 101
Canola 101
Chrysanthème 102
Chrysanthème frutescent 103
Coléus 105
Dahlia 105
Diascia 105
Échinacée 106
Féverole 106
Gaillarde 106
Grande Astrance 107
Hibiscus 107
Immortelle 107
Impatiente 107
Lantana 111
Lin 112
Maïs 113
Moutarde 113
Muflier 113
Némésie 114
Oeillet 114
Orge 115
Ostéospermum 115
Pélargonium 116
Pétunia 117
Photinia 117
Poinsettia 117
Pois 118
Pomme de terre 118
Pommier 119

Prunier 119
Rosier 119
Soja 121
Sutéra 122
Verveine 122

15. Demandes à l'étude 124
Avoine 124
Canola 127
Cerisier 130
Maïs 132
Ostéospermum 133
Pois 137
Pommier 142
Rosier 147
Soja 157

16. Demandes abandonnées 162

17. Demandes retirées 162

18. Changement de dénomination 167

19. Renonciation au certificat d'obtention 169

20. Révocation du certificat d'obtention 172

21. Changement à la date de la demande 172

22. Demandes rejetées 173

23. Errata 173

24. Coût de la protection 173

L'ÉCHÉANCE POUR LE NUMÉRO D'OCTOBRE 2003 EST LE 8 AOÛT

L'ÉCHÉANCE POUR LE NUMÉRO DE JANVIER 2004 EST LE 31 OCTOBRE 2003

13. DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D'OBTENTION

ASTILBE
(*Astilbe species* Buch.-Ham. ex D. Don)

➤ **Titulaire :** Wim van Veen,, Noorden (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1441
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1869
Date de la demande : 1999/11/25
Dénomination approuvée : **'Flamingo'**

➤ **Titulaire :** Wim van Veen,, Noorden (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1442
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1870
Date de la demande : 1999/11/25
Dénomination approuvée : **'Lollypop'**

➤ **Titulaire :** Wim van Veen,, Noorden (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1443
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1871
Date de la demande : 1999/11/25
Dénomination approuvée : **'Pink Lightning'**

➤ **Titulaire :** Wim van Veen,, Noorden (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1444
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1872
Date de la demande : 1999/11/25
Dénomination approuvée : **'Touch of Pink'**

➤ **Titulaire :** Wim van Veen,, Noorden (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1445
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1873
Date de la demande : 1999/11/25
Dénomination approuvée : **'White Wings'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Titulaire :** Saskatchewan Wheat Pool, Regina (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 1463
Date de délivrance : 2003/03/31
Numéro de la demande : 01-2711
Date de la demande : 2001/05/03
Dénomination approuvée : **'Journey'**

➤ **Titulaire :** NDSU Research Foundation, Fargo, North Dakota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1478
Date de délivrance : 2003/05/26
Numéro de la demande : 01-2588
Date de la demande : 2001/03/22
Dénomination approuvée : **'Alsen'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1464
Date de délivrance : 2003/03/31
Numéro de la demande : 97-1016
Date de la demande : 1997/04/07
Dénomination approuvée : **'NS2173'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2005/03/31

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1465
Date de délivrance : 2003/03/31
Numéro de la demande : 97-1018
Date de la demande : 1997/04/07
Dénomination approuvée : **'NS2082'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2005/03/31

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1466
Date de délivrance : 2003/03/31
Numéro de la demande : 00-2232
Date de la demande : 2000/05/03
Dénomination approuvée : **'NS3213'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2005/03/31

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1467
Date de délivrance : 2003/03/31
Numéro de la demande : 00-2236
Date de la demande : 2000/05/03
Dénomination approuvée : **'46A30'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2005/03/31

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1468
Date de délivrance : 2003/03/31
Numéro de la demande : 00-2237
Date de la demande : 2000/05/03
Dénomination approuvée : **'46A31'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2005/03/31

FRAISIER
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
Numéro du certificat : 1476
Date de délivrance : 2003/05/21
Numéro de la demande : 00-2505
Date de la demande : 2000/12/21
Dénomination approuvée : **'Rosalyne'**

LIN
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Titulaire :** United Grain Growers Ltd., Morden (Manitoba)
Numéro du certificat : 1460
Date de délivrance : 2003/03/25
Numéro de la demande : 00-2404
Date de la demande : 2000/10/13
Dénomination approuvée : **'2047'**

MAÏS
(*Zea mays* L.)

➤ **Titulaire :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)
Numéro du certificat : 1461
Date de délivrance : 2003/03/28
Numéro de la demande : 99-1746
Date de la demande : 1999/08/05
Dénomination approuvée : **'87DIA4'**

➤ **Titulaire :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)
Numéro du certificat : 1462
Date de délivrance : 2003/03/28
Numéro de la demande : 01-2527
Date de la demande : 2001/01/24
Dénomination approuvée : **'86ISI27'**

MUFLIER (*Antirrhinum* L.)

➤ **Titulaire :** A.T. Yates & Son, Cheshire, England (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1471
Date de délivrance : 2003/04/16
Numéro de la demande : 00-2145
Date de la demande : 2000/03/03
Dénomination approuvée : **'Yahit'**
Nom commercial : **Chandelier Yellow**

NÉMÉSIE (*Nemesia* species Venten)

➤ **Titulaire :** Penhow Specialist Nurseries, Gwent, South Wales (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1469
Date de délivrance : 2003/04/16
Numéro de la demande : 00-2139
Date de la demande : 2000/03/03
Dénomination approuvée : **'Penmys'**
Nom commercial : **Mystic Blue**
Nom commercial : **Blueberry Sachet**

➤ **Titulaire :** Penhow Specialist Nurseries, Gwent, South Wales (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1470
Date de délivrance : 2003/04/16
Numéro de la demande : 00-2140
Date de la demande : 2000/03/03
Dénomination approuvée : **'Pensug'**
Nom commercial : **Sugar Girl**
Nom commercial : **Vanilla Sachet**

OSTÉOSPERMUM (*Osteospermum* species L.)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1449
Date de délivrance : 2003/03/07
Numéro de la demande : 00-2120
Date de la demande : 2000/02/18
Dénomination approuvée : **'Aknam'**
Nom commercial : **Nasinga Cream**

PÉROVSKIA (*Perovskia* species Kar.)

➤ **Titulaire :** Herbert Oudshoorn, Rijpwetering (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1437
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1748
Date de la demande : 1999/08/06
Dénomination approuvée : **'Little Spire'**

PHLOX
(*Phlox paniculata* Lyon ex Pursh)

➤ **Titulaire :** Herbert Oudshoorn, Rijpwetering (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1438
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1749
Date de la demande : 1999/08/06
Dénomination approuvée : **'Lizzy'**

PIED-D'ALOUETTE
(*Delphinium x belladonna* Hort. ex Bergmans)

➤ **Titulaire :** Mark Van Kesteren, Noordwijkerhout (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1439
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1753
Date de la demande : 1999/08/06
Dénomination approuvée : **'West End Blue'**

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Titulaire :** Salling Plant Breeding Aps., Skive (Danemark)
Mandataire au Canada : Johnson Seeds Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1446
Date de délivrance : 2003/03/05
Numéro de la demande : 00-2347
Date de la demande : 2000/07/26
Dénomination approuvée : **'Venture'**

➤ **Titulaire :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Prairieland Grain, Hartney (Manitoba)
Numéro du certificat : 1459
Date de délivrance : 2003/03/18
Numéro de la demande : 00-2402
Date de la demande : 2000/10/12
Dénomination approuvée : **'Big Daddy'**
Synonyme : **Bigdaddy**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS., Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1447
Date de délivrance : 2003/03/06
Numéro de la demande : 95-668
Date de la demande : 1994/11/30
Dénomination approuvée : **'POULvue'**
Nom commercial : **Victor Borge**

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS., Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1448
Date de délivrance : 2003/03/06
Numéro de la demande : 96-723
Date de la demande : 1996/01/25
Dénomination approuvée : **'POULari'**
Nom commercial : **Karen Blixen**

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS., Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1450
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 98-1507
Date de la demande : 1998/10/15
Dénomination approuvée : **'POULhyr'**
Nom commercial : **Cherry Parade®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1451
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 98-1512
Date de la demande : 1998/10/15
Dénomination approuvée : **'POULhi003'**
Nom commercial : **Excellent Hit®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1452
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 98-1516
Date de la demande : 1998/10/15
Dénomination approuvée : **'POULymp'**
Nom commercial : **Olympic Palace®**
Synonyme : **Olympic Palace**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1453
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 00-2334
Date de la demande : 2000/07/06
Dénomination approuvée : **'POULhi001'**
Nom commercial : **Sunglow Hit®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1454
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 00-2335
Date de la demande : 2000/07/06
Dénomination approuvée : **'POULra001'**
Nom commercial : **Monica Parade®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1455
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 00-2336
Date de la demande : 2000/07/06
Dénomination approuvée : **'POULra002'**
Nom commercial : **Heidi Parade®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1456
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 00-2337
Date de la demande : 2000/07/06
Dénomination approuvée : **'POULra004'**
Nom commercial : **Claudia Parade®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1457
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 00-2338
Date de la demande : 2000/07/06
Dénomination approuvée : **'POULra005'**
Nom commercial : **Nicoline Parade®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1458
Date de délivrance : 2003/03/10
Numéro de la demande : 00-2341
Date de la demande : 2000/07/06
Dénomination approuvée : **'POULty002'**
Nom commercial : **Vital Party®**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/03/10

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser ApS, , Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1474
Date de délivrance : 2003/05/01
Numéro de la demande : 98-1297
Date de la demande : 1998/03/27
Dénomination approuvée : **'POULtika'**
Nom commercial : **Northern Lights**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des license 2005/05/01

➤ **Titulaire :** Reinhard Noack, Gutersloh (Allemagne)
Mandataire au Canada : McFadden, Fincham, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1475
Date de délivrance : 2003/05/15
Numéro de la demande : 00-2151
Date de la demande : 2000/03/07
Dénomination approuvée : **'Noare'**
Nom commercial : **Flower Carpet Red**
Nom commercial : **Red Velvet**

SIDALCÉE
(*Sidalcea* species A. Gray)

➤ **Titulaire :** Aad Geerlings, Lisserbroek (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1440
Date de délivrance : 2003/03/04
Numéro de la demande : 99-1879
Date de la demande : 1999/11/25
Dénomination approuvée : **'Little Princess'**

SOJA
(*Glycine max*)

➤ **Titulaire :** Hyland Seeds Division of W. G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim (Ontario)
Numéro du certificat : 1477
Date de délivrance : 2003/05/23
Numéro de la demande : 00-2216
Date de la demande : 2000/05/15
Dénomination approuvée : **'Crown'**

SUTÉRA
(*Sutera* Roth.)

➤ **Titulaire :** A.T. Yates & Son, Cheshire, England (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1472
Date de délivrance : 2003/04/16
Numéro de la demande : 00-2146
Date de la demande : 2000/03/03
Dénomination approuvée : **'Yagero'**
Nom commercial : **Penny Candy Rose**

➤ **Titulaire :** A.T. Yates & Son, Cheshire, England (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1473
Date de délivrance : 2003/04/16
Numéro de la demande : 00-2148
Date de la demande : 2000/03/03
Dénomination approuvée : **'Yagevi'**
Nom commercial : **Penny Candy Violet**

14. DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

ALSTRŒMÈRE
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Requérant :** Van Zanten Plants B.V., AG Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3692
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'Zalsamay'**
Nom commercial : Mayfair

➤ **Requérant :** Van Zanten Plants B.V., AG Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3693
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'Zalsasenan'**
Nom commercial : Senna

ANGÉLONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3598
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balangbeke'**
Nom commercial : Angelmist[MD] Basket Purple

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3599
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balangloud'**
Nom commercial : Angelmist[MD] White Cloud

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3563
Date de la demande : 2003/04/15
Dénomination proposée : **'BW 776'**

BLÉ
(*Triticum turgidum* var. *durum* (Desf.) Bowden)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3567
Date de la demande : 2003/04/17
Dénomination proposée : **'DT712'**

BROME HYBRIDE
(*Bromus riparius* Rehm. × *B. inermis* Leyss.))

➤ **Requéran' :** Agriculture et Agroalimentaire Canada Saskatoon, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3665
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'S9356I'**

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3495
Date de la demande : 2003/03/28
Dénomination proposée : **'Kakegawa S69'**
Nom commercial : Colorburst Melon

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3496
Date de la demande : 2003/03/28
Dénomination proposée : **'Kakegawa S71'**
Nom commercial : Colorburst Terracotta

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3497
Date de la demande : 2003/03/28
Dénomination proposée : **'Kakegawa S72'**
Nom commercial : Colorburst Chocolate

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3501
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEC03079'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3502
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEC03083'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3503
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEC03085'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3476
Date de la demande : 2003/03/13
Dénomination proposée : **'NS2663'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/03/13

➤ **Requérant :** The Governors of the University of Alberta, Edmonton (Alberta)
Numéro de la demande : 03-3555
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'A01-144NI'**

➤ **Requérant :** DSV Canada Inc., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3566
Date de la demande : 2003/04/16
Dénomination proposée : **'6045CL'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3590
Date de la demande : 2003/04/30
Dénomination proposée : **'SW Wizzard'**

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3654
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-137 B-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3655
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-139 A-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3656
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-139 B-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3657
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-140 A-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3658
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-140 B-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3659
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-144 A-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3660
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS01-144 B-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3661
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS02-182'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3662
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS02-362'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3663
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'PPS02-364'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/06

➤ **Requérant :** Bayer Crop Science Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3664
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'PPS01-137 A-line'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/08

➤ **Requérant :** Advanta Canada Inc., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3674
Date de la demande : 2003/05/14
Dénomination proposée : **'S0097'**

CHRYSANTHÈME (*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3547
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Apricot Yoelmira'**
Nom commercial : Apricot Elmira

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3548
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Coral Yograceland'**
Nom commercial : Coral Graceland

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3549
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Dark Yoelmira'**
Nom commercial : Dark Elmira

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3550
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Honey Yograceland'**
Nom commercial : Honey Graceland

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3551
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Red Yoauburn'**
Nom commercial : Red Auburn

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3552
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Yomanhattan'**
Nom commercial : Manhattan

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3553
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Yonorwich'**
Nom commercial : Norwich

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3554
Date de la demande : 2003/04/07
Dénomination proposée : **'Yostlouis'**
Nom commercial : St. Louis

CHRYSANTHÈME FRUTESCENT (*Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3484
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supaanem'**
Nom commercial : Twinkle White Flare

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3485
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supamon'**
Nom commercial : Twinkle Rose

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3486
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supalav'**
Nom commercial : Twinkle Lavender

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3487
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supait339'**
Nom commercial : Twinkle Sunburst White

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3488
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supacrest'**
Nom commercial : Galaxy Orchid

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3489
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supacre'**
Nom commercial : Twinkle Light Pink

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3490
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supasat'**
Nom commercial : Miss Pink

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3491
Date de la demande : 2003/03/26
Dénomination proposée : **'Supang'**

➤ **Requérant :** Francis William Hammond, Narre Warren East, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3595
Date de la demande : 2003/05/05
Dénomination proposée : **'M9/18D'**
Nom commercial : Gypsy Rose

➤ **Requérant :** Francis William Hammond, Narre Warren East, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3596
Date de la demande : 2003/05/05
Dénomination proposée : **'M9/05'**
Nom commercial : Lavender Lass

CHRYSANTHÈME FRUTESCENT (*Argyranthemum x hybrida*)

➤ **Requérant :** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3631
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'OHAR01-241'**
Nom commercial : Madiera[MD] Monte Cream

➤ **Requérant :** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3632
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'OHAR01-245'**
Nom commercial : Madiera[MD] Machio Double Pink

➤ **Requérant :** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3633
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'OHAR01-240'**
Nom commercial : Madiera[MD] Santa Maria Pink

➤ **Requérant :** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3634
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'OHAR01-232'**
Nom commercial : Madiera[MD] Porto Santo White

COLÉUS
(*Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd.)

➤ **Requérant :** Ralph Repp, Waynesville, Caroline du Nord (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3517
Date de la demande : 2003/04/01
Dénomination proposée : **'Sundancer6'**
Nom commercial : Rose Explosion

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3640
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE1'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3641
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE2'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3642
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE3'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3643
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE5'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3644
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE8'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Requérant :** Fa. Gebr. Verwer, Lisse (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3635
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Melody Lisa'**
Nom commercial : Garden[MD] Melody Lisa

DIASCIA
(*Diascia integerrima* Benth.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3605
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balwhiswhit'**
Nom commercial : Whisper[MD]White

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3606
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balwincor'**
Nom commercial : Wink[MD]Coral

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3607
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balwinstry'**
Nom commercial : Wink[MD]Strawberry

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3608
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balwinlapi'**
Nom commercial : Wink[MD]Lavender Pink

DIASCIA
(*Diascia x hybrida* Link et Otto)

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3492
Date de la demande : 2003/03/27
Dénomination proposée : **'Codilav'**
Nom commercial : Sun Chimes Lavender

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3493
Date de la demande : 2003/03/27
Dénomination proposée : **'Coditer'**
Nom commercial : Sun Chimes Terracotta

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3494
Date de la demande : 2003/03/27
Dénomination proposée : **'Codiusre'**
Nom commercial : Sun Chimes Red

ÉCHINACÉE
(*Echinacea purpurea* (L.) Moench)

➤ **Requérant :** Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro de la demande : 03-3557
Date de la demande : 2003/04/10
Dénomination proposée : **'Norwhinat'**
Nom commercial : White Natalie

FÉVEROLE
(*Vicia faba* L. (sensu lato))

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3528
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Ben'**

GAILLARDE
(*Gaillardia pulchella* Foug.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3609
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Baltorflam'**
Nom commercial : Torch[MD]Flame

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3610
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Baltoryell'**
Nom commercial : Torch[MD] Yellow

GRANDE ASTRANCE
(*Astrantia major* L.)

➤ **Requérant :** Kwekerij de Boezem & Rijnbeek and Son B.V., Reenwijk (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3591
Date de la demande : 2003/05/01
Dénomination proposée : **'Abbey Road'**

HIBISCUS
(*Hibiscus moscheutos* L.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3685
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balhiblu'**
Nom commercial : Luna Blush

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3686
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balhibred'**
Nom commercial : Luna Red

IMMORTELLE
(*Bracteantha bracteata* Anderb. et Haegi)

➤ **Requérant :** Oasis Horticulture Pty. Ltd., Sydney, New South Wales (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3639
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'OHB00-37.90'**
Nom commercial : Dreamtime[MD] Jumbo Yellow

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkeri* W. Bull.)

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3576
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisnics Redice'**
Nom commercial : Sonic Scarlet Ice

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3577
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisnics Zorred'**
Nom commercial : Sonic Zorro Red

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3578
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Hotpink'**
Nom commercial : Super Sonic Hot Pink 2004

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3579
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Tallred'**
Nom commercial : Super Sonic Red 2004

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3580
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Flame'**
Nom commercial : Super Sonic Flame

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3581
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisnics Redgold'**
Nom commercial : Sonic Red on Gold

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3582
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Lipink'**
Nom commercial : Super Sonic Light Pink

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3583
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisnics Burgsweet'**
Nom commercial : Sonic Sweet Burgundy

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3584
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Burgy'**
Nom commercial : Super Sonic Burgundy

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3585
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisnics Lil'**
Nom commercial : Sonic Lilac

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3586
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Chersweet'**
Nom commercial : Super Sonic Sweet Cherry

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3587
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Violeye'**
Nom commercial : Super Sonic Violet Ice

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3588
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Pinkeye'**
Nom commercial : Super Sonic Pink

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3589
Date de la demande : 2003/04/29
Dénomination proposée : **'Fisupnic Mapink'**
Nom commercial : Super Sonic Pastel Pink 2004

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3624
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balcelichey'**
Nom commercial : Celebration[MD] Cherry Red Improved

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3625
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balcelipurt'**
Nom commercial : Celebration[MD] Purple Star Improved

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3698
Date de la demande : 2003/05/30
Dénomination proposée : **'Balcebpiel'**
Nom commercial : Celebrette Pink Jewel

IMPATIENTE
(Impatiens hybrida)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3529
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE011037'**
Nom commercial : Paradise White Improved

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3530
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE011210'**
Nom commercial : Paradise Cabernet Red

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3531
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE01997'**
Nom commercial : Painted Paradise Red Improved

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3532
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE01956'**
Nom commercial : Pure Beauty Scarlet Improved

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3533
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE011024'**
Nom commercial : Paradise Salmon Pink

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3534
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE01019'**
Nom commercial : Painted Paradise Orange Improved

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3535
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE00031'**
Nom commercial : Pure Beauty White

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3536
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE00013'**
Nom commercial : Paradise Hot Rose Improved

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3537
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE00600'**
Nom commercial : **Pure Beauty Bright Orange**

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3538
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'KIE01001'**
Nom commercial : Painted Paradise Lavender

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3680
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balgeoapt'**
Nom commercial : Georgia Apricot

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3681
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balgeocher'**
Nom commercial : Georgia Cherry

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3682
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balgeolem'**
Nom commercial : Georgia Lemon

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3683
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balgeopink'**
Nom commercial : Georgia Pink

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3684
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Balgeopeac'**
Nom commercial : Georgia Peach

IMPATIENTE
(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

➤ **Requérant :** Tioga Genetics, Rogue River, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3498
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'TiLip II'**
Nom commercial : Tioga Light Pink

➤ **Requérant :** Tioga Genetics, Rogue River, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3499
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'TiCoPur'**
Nom commercial : Tioga Compact Purple

➤ **Requérant :** Tioga Genetics, Rogue River, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3500
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'TiWhit'**
Nom commercial : Tioga White

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3602
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balfiesink'**
Nom commercial : Fiesta[MD]Sparkler Hot Pink

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3603
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balolerose'**
Nom commercial : Fiesta[MD]Ole Rose

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3604
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balolespur'**
Nom commercial : Fiesta[MD]Ole Sparkler Purple

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3620
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balpixdobur'**
Nom commercial : Pixie[MD]Double Sparkler Burgundy

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3621
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balpixotse'**
Nom commercial : Pixie[MD]Hot Rose

LANTANA
(*Lantana camara* L.)

➤ **Requérant :** Robert J. Roberson, Grain Valley, Missouri (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3574
Date de la demande : 2003/04/30
Dénomination proposée : **'Robmornrog'**
Nom commercial : Morning Glow Rose Gold

DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

➤ **Requérant :** Robert J. Roberson, ,Grain Valley, Missouri (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3575
Date de la demande : 2003/04/30
Dénomination proposée : **'Robmornvan'**
Nom commercial : Morning Glow Vanilla

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3614
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balandflam'**
Nom commercial : Landmark[MD]Flame

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3615
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balandgold'**
Nom commercial : Landmark[MD]Gold

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3616
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balandfro'**
Nom commercial : Landmark[MD]Lemon Frost

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3617
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balandpawn'**
Nom commercial : Landmark[MD]Pink Dawn

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3618
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balandroglo'**
Nom commercial : Landmark[MD]Rose Glow

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3619
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balucwhit'**
Nom commercial : Lucky[MD]White

LIN
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Requérant :** United Grain Growers Ltd., Morden (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3518
Date de la demande : 2003/04/01
Dénomination proposée : **'2090'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Morden (Manitoba)
Mandataire au Canada : Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3556
Date de la demande : 2003/04/10
Dénomination proposée : **'Prairie Blue'**

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan (CDC), Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3673
Date de la demande : 2003/05/14
Dénomination proposée : **'CDC Gala'**

MAÏS
(*Zea mays* L.)

➤ **Requérant :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Monsanto Canada Inc., London (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3695
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'I161538'**

➤ **Requérant :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Monsanto Canada Inc., London (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3696
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'I294213'**

MOUTARDE
(*Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. in Czern.)

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3592
Date de la demande : 2003/05/01
Dénomination proposée : **'J00D-09439'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3593
Date de la demande : 2003/05/01
Dénomination proposée : **'J00D-11028'**

MUFLIER
(*Antirrhinum* hybride)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3539
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Sant 229A'**
Nom commercial : Crocodile Lilac

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3540
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Sant 214E'**
Nom commercial : Crocodile Deep Pink

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3541
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Santt 218A'**
Nom commercial : Crocodile White

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3542
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Sant 217A'**
Nom commercial : Crocodile Pink Bicolor

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3543
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Sant 219A'**
Nom commercial : Crocodile Primrose Vein

➤ **Requérant :** A.T. Yates & Son, Cheshire, Angleterre (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3562
Date de la demande : 2003/04/15
Dénomination proposée : **'Yacrey'**
Nom commercial : Crocodile Rose & Yellow

➤ **Requérant :** A.T. Yates & Son, Cheshire, Angleterre (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3565
Date de la demande : 2003/04/16
Dénomination proposée : **'Yacoy'**
Nom commercial : Crocodile Orange and Red

NÉMÉSIE (*Nemesia caerulea* hybride)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3521
Date de la demande : 2003/04/03
Dénomination proposée : **'Nemrowhi'**
Nom commercial : Antique Rose Sachet

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3623
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balarcomwit'**
Nom commercial : Aromatica[MD]Compact White

NÉMÉSIE (*Nemesia foetens* Venten.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3622
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balartublue'**
Nom commercial : Aromatica[MD]True Blue

NÉMÉSIE (*Nemesia hybrida*)

➤ **Requérant :** InnovaPlant GmbH & Co. KG, Gensingen (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3597
Date de la demande : 2003/05/05
Dénomination proposée : **'N006-9BLAU'**

ŒILLET (*Dianthus caryophyllus* L.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3504
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEN03030'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3505
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEN03031'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3506
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEN03057'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3507
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEN03060'**

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** Alberta Agriculture, Food & Rural Development, Lacombe (Alberta)
Mandataire au Canada : Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3570
Date de la demande : 2003/04/24
Dénomination proposée : **'Bentley'**

➤ **Requérant :** Alberta Agriculture, Food & Rural Development, Lacombe (Alberta)
Mandataire au Canada : Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3571
Date de la demande : 2003/04/24
Dénomination proposée : **'Manny'**

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan (CDC), Saskatoon (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3594
Date de la demande : 2003/05/05
Dénomination proposée : **'CDC Trey'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/05/05

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3508
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEO03101'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3509
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEO03103'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3510
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEO03105'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3511
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEO03106'**

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum* hybride)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3544
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Akavol'**
Nom commercial : Cape Daisy Volta Improved

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3545
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Aknai'**
Nom commercial : Cape Daisy Nairobi Improved

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3546
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Iringa'**
Nom commercial : Cape Daisy Iringa

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium crispum - Hybridae* (P.J. Bergius) L'Hér.)

➤ **Requérant :** Elsner pac Jungpflanzen, Dresden (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3480
Date de la demande : 2003/03/21
Dénomination proposée : **'Pacburg'**
Nom commercial : Angeleyes Burgundy

➤ **Requérant :** Elsner pac Jungpflanzen, Dresden (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3481
Date de la demande : 2003/03/21
Dénomination proposée : **'Paceyes'**
Nom commercial : Angeleyes Light

➤ **Requérant :** Elsner pac Jungpflanzen, Dresden (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3482
Date de la demande : 2003/03/21
Dénomination proposée : **'Pacbicolor'**
Nom commercial : Angeleyes Bicolor

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3613
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balfansal'**
Nom commercial : Fantasia[MD] Salmon

➤ **Requérant :** Silze GmbH & Co. KG, Weener (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3637
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Sil Claudio'**
Nom commercial : Fantasia[MD] Strawberry Sizzle

➤ **Requérant :** Silze GmbH & Co. KG, Weener (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3638
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balshopink'**
Nom commercial : Showcase[MD] Pink

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum x P. zonale*)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3611
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balcolreim'**
Nom commercial : Colorcade[MD] Red Improved

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium zonale* (L.) L'Hér.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3512
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLFP03106'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3513
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEP03107'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3514
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLEP03111'**

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3612
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Baldesbrila'**
Nom commercial : Designer[MD]Bright Lavender

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3630
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balshobrili'**
Nom commercial : Showcase[MD]Bright Lilac

PÉTUNIA
(*Petunia hybrida* Hort. ex E. Vilm.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3626
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balrufimvein'**
Nom commercial : Ruffle[MD]Plum Veined Improved

PHOTINIA
(*Photinia x fraserii* Dress.)

➤ **Requérant :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3647
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Cassini'**
Nom commercial : Pink Marble

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3678
Date de la demande : 2003/05/20
Dénomination proposée : **'Festival Pink'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3679
Date de la demande : 2003/05/20
Dénomination proposée : **'Gala Red'**

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3473
Date de la demande : 2003/03/07
Dénomination proposée : **'Miser'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3477
Date de la demande : 2003/03/14
Dénomination proposée : **'SW Midas'**

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3525
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Tudor'**

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3526
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Camry'**

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3527
Date de la demande : 2003/04/04
Dénomination proposée : **'Serena'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3573
Date de la demande : 2003/04/28
Dénomination proposée : **'SW Cabot'**

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Requérant :** HZPC Holland B.V., Joure (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande : 03-3474
Date de la demande : 2003/03/10
Dénomination proposée : **'Red Scarlett'**

➤ **Requérant :** HZPC Holland B.V., Joure (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande : 03-3475
Date de la demande : 2003/03/11
Dénomination proposée : **'Rodeo'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta)
Numéro de la demande : 03-3558
Date de la demande : 2003/04/11
Dénomination proposée : **'Alta Russet'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/04/11

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta)
Numéro de la demande : 03-3569
Date de la demande : 2003/04/22
Dénomination proposée : **'CV92028-1'**
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/04/22

➤ **Requérant :** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes (Québec)
Numéro de la demande : 03-3649
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'Abeille'**

➤ **Requérant :** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes (Québec)
Numéro de la demande : 03-3650
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'Altitude'**

➤ **Requérant :** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes (Québec)
Numéro de la demande : 03-3651
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'Bombance'**

➤ **Requérant :** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes (Québec)
Numéro de la demande : 03-3652
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'Peribonka'**

➤ **Requérant :** Centre de recherche Les Buissons inc., Pointe-aux-Outardes (Québec)
Numéro de la demande : 03-3653
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'Fjord'**

➤ **Requérant :** Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas (États-Unis)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande : 03-3697
Date de la demande : 2003/05/26
Dénomination proposée : **'TX1523-1Ru/Y'**

POMMIER (*Malus* species Mill.)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
Numéro de la demande : 03-3688
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'SJM15'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu ,(Québec)
Numéro de la demande : 03-3689
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'SJM167'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec)
Numéro de la demande : 03-3690
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'5218'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec)
Numéro de la demande : 03-3691
Date de la demande : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'5198'**

PRUNIER (*Prunus domestica* L.)

➤ **Requérant :** University of Guelph, Guelph (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3519
Date de la demande : 2003/04/02
Dénomination proposée : **'V 70034'**

➤ **Requérant :** University of Guelph, Guelph (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3520
Date de la demande : 2003/04/02
Dénomination proposée : **'V72511'**

ROSIER (*Rosa* hybride)

➤ **Requérant :** Reinhard Noack, Gutersloh (Allemagne)
Mandataire au Canada : Pan American Nursery Products Inc., Surrey (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3559
Date de la demande : 2003/04/14
Dénomination proposée : **'Noalesa'**
Nom commercial : Yellow Flower Carpet
Nom commercial : Noalin
Date de délivrance du certificat temporaire : 2003/03/26

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3666
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULac006'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3667
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULac015'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3668
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULac017'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3669
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULhi013'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3670
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULhi018'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3671
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULra023'**

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3672
Date de la demande : 2003/05/08
Dénomination proposée : **'POULra024'**

➤ **Requérant :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3675
Date de la demande : 2003/05/15
Dénomination proposée : **'Radcon'**
Nom commercial : Pink Knockout

➤ **Requérant :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3676
Date de la demande : 2003/05/15
Dénomination proposée : **'Radyod'**
Nom commercial : Blushing Knockout

➤ **Requérant :** Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 03-3677
Date de la demande : 2003/05/16
Dénomination proposée : **'POULac016'**

ROSIER (*Rosa* species L.)

➤ **Requérant :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3483
Date de la demande : 2003/03/24
Dénomination proposée : **'Radsun'**
Nom commercial : Carefree Beauty

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3522
Date de la demande : 2003/04/03
Dénomination proposée : **'Ruix001'**

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3523
Date de la demande : 2003/04/03
Dénomination proposée : **'Ruix002'**

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3524
Date de la demande : 2003/04/03
Dénomination proposée : **'Ruiw001'**

➤ **Requérant :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3645
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Meipreston'**
Nom commercial : Ruby Meidiland

➤ **Requérant :** CP Delaware, Inc., Wilmington, Delaware (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3646
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Meirameca'**
Nom commercial : Carefree Marvel

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3478
Date de la demande : 2003/03/18
Dénomination proposée : **'X3604-B-B-11-5'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada Ottawa, (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3479
Date de la demande : 2003/03/18
Dénomination proposée : **'X3555-B-B-15-5'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3564
Date de la demande : 2003/04/15
Dénomination proposée : **'M709710'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3568
Date de la demande : 2003/04/23
Dénomination proposée : **'S00-Z1'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3572
Date de la demande : 2003/04/24
Dénomination proposée : **'S12-C2'**

➤ **Requérant :** CÉROM, St-Bruno-de-Montarville (Québec)
Numéro de la demande : 03-3648
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Albinos'**

SUTÉRA
(*Jamesbrittenia* Kuntz)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3601
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balbreupla'**
Nom commercial : Breeze[MD] Upright Lavender

➤ **Requérant :** A.T. Yates & Son, Cheshire, Angleterre (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3560
Date de la demande : 2003/04/15
Dénomination proposée : **'Yasal'**
Nom commercial : Penny Candy Salmon

➤ **Requérant :** A.T. Yates & Son, Cheshire, Angleterre (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3561
Date de la demande : 2003/04/15
Dénomination proposée : **'Yasi'**
Nom commercial : African Sunset Improved

SUTÉRA
(*Sutera cordata* Roth.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3600
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balablue'**
Nom commercial : Abunda[MD] Blue

➤ **Requérant :** Fa. Wilhelm Schmülling, Billerbeck (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3636
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Blisch'**
Nom commercial : Abunda[MD] Giant White

SUTÉRA
(*Sutera diffusa* Roth.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3515
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLESU03186'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3516
Date de la demande : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'KLESU03187'**

VERVEINE
(*Verbena hybrida* Hort. ex Groenl. & Rumpler)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3627
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balazgagic'**
Nom commercial : Aztec[MD] Grape Magic

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3628
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : 'Balazcherd'
Nom commercial : Aztec[MD] Cherry Red

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Co., West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3629
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Balazpeach'**
Nom commercial : Aztec[MD]Peach

15. DEMANDES À L'ÉTUDE

Toute personne désirant s'opposer aux demandes suivantes doit le faire par écrit en s'adressant au directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales dans les six mois suivant la date de publication du présent bulletin; la demande doit également être accompagnée du paiement des frais appropriés.

À moins d'indication contraire, les couleurs sont déterminées au moyen du code des couleurs de la Royal Horticultural Society (RHS).

Dans la section *Demandes à l'étude*, la description ne présente désormais que les caractères de la variété candidate, mais le sommaire permet toujours une comparaison avec les variétés de référence.

Toutes les photos sont fournies par le requérant. Les photographies peuvent être omises lorsque les caractéristiques distinctives n'y sont pas évidentes.

AVOINE
(*Avena sativa*)

Dénomination proposée : **'CDC Orrin'** (voir la figure 11)
Dénomination antérieurement proposée : **'OT382'**
Numéro de la demande : 02-2973
Date de la demande : 2002/01/14
Requérant : Brian Rossnagel, University of Saskatchewan, Crop Development Centre, Saskatoon (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Sélectionneur : Brian Rossnagel, University of Saskatchewan, Crop Development Centre, Saskatoon (Saskatchewan)

Variétés de référence : 'CDC Boyer', 'CDC Pacer' et 'AC Assiniboia'

Sommaire : *Le limbe des feuilles inférieures est moins pubescent chez 'CDC Orrin' que chez les variétés de référence. La pubescence marginale de la feuille située sous la dernière feuille est nulle ou très faible chez 'CDC Orrin', tandis qu'elle est faible 'CDC Boyer', moyenne à forte chez 'CDC Pacer' et très forte chez 'AC Assiniboia'. La tige est moyennement à fortement pubescente juste au-dessus et au-dessous du nœud supérieur chez la variété candidate, tandis qu'elle est glabre ou très faiblement pubescente chez 'CDC Pacer' et fortement à très fortement pubescente chez 'AC Assiniboia'. 'CDC Orrin' produit une plante plus haute que 'AC Assiniboia' et 'CDC Pacer', mais plus courte que 'CDC Boyer'. La panicule est plus compacte chez 'CDC Orrin' que chez 'CDC Pacer'. Les poils ou épines du nœud inférieur de la panicule sont moins nombreux et plus courts chez 'CDC Orrin' que chez 'AC Assiniboia'. La présence d'une arête sur la glumelle inférieure est plus fréquente chez la variété candidate que chez les variétés de référence. Les grains sont crème chez 'CDC Orrin' et 'CDC Boyer, alors qu'ils sont jaunes chez 'CDC Pacer' et brun pâle chez 'AC Assiniboia'.*

Description : 'CDC Orrin' est une avoine de printemps à grains vêtus. Chez la plantule, le coléoptile est vert, et l'hypocotyle est court à moyen. La jeune plante a un port demi-dressé. La gaine des feuilles inférieures est moyennement pubescente, tandis que leur limbe est très faiblement pubescent. Au stade du gonflement, les feuilles sont vert moyen, fortement glauques et glabres sur les bords. Les feuilles possèdent une ligule. La dernière feuille a un port intermédiaire; sa gaine est fortement à très fortement glauque. La tige est moyennement pubescente juste au-dessus et au-dessous du nœud supérieur. À maturité, la tige est blanc jaunâtre à jaune, d'épaisseur moyenne.

La panicule est équilatérale, compacte, moyenne à grande et de longueur et largeur intermédiaires. Les ramifications sont demi-dressées et de longueur moyenne. Le verticille inférieur des ramifications est inséré sur le premier nœud. Le rachis est droit, sans nœud secondaire, et il forme un angle de 30 à 45 degrés avec la ramification latérale dominante. Le nœud inférieur de la panicule porte un nombre petit à moyen de poils ou épines de longueur moyenne. La baguette est glabre, et la deuxième fleur est moyenne à longue et de largeur moyenne. À maturité, la baguette présente des sillons de profondeur moyenne. La séparation de l'épillet se fait par fracture. L'épillet est retombant. Le nombre moyen de fleurs par épillet est de 3 ou 4. La séparation de la fleur se fait par hétérofracture.

Les glumes sont jaunes, longues, moyennes à larges. La glumelle inférieure est de longueur moyenne, avec une pointe longue, et elle est blanche à jaune à maturité. Les faces latérale et dorsale de la glumelle inférieure sont glabres et faiblement à moyennement glauques au stade vert. La glumelle inférieure porte fréquemment une arête, qui est tordue à courbée. Le chevauchement de la glumelle supérieure par la glumelle inférieure est modéré. La glumelle supérieure est moyenne (de

la moitié de la longueur de la glumelle inférieure) à longue (de la même longueur que la glumelle inférieure).

Le grain est crème, moyennement rempli, sans pilosité basale. Sous rayons ultraviolets, une partie des grains sont fluorescents. Le caryopse est modérément pubescent. Les poils de la brosse sont courts à moyens. Chaque épillet produit deux grains. Le scutellum est pointu, de taille moyenne.

'CDC Orrin' est modérément sensible à sensible aux races CR13, CR181, CR185, CR192, CR223 et CR225 de la rouille couronnée (*Puccinia coronata*). Elle est résistante aux races A13, A60 et A617 du charbon nu (*Ustilago avenae*) et sensible aux races NA8, NA16, NA25, NA27, NA28, NA55 et NA67 de la rouille noire (*Puccinia graminis* f.sp. *avenae*). Elle est résistante au charbon vêtu (*Ustilago kolleri*) et modérément sensible au virus de la jaunisse nanisante (BYDV). 'CDC Orrin' présente une résistance passable à bonne à la verse et une bonne résistance à l'égrenage. Elle est sensible à la photopériode.

Origine génétique : La variété 'CDC Orrin' a été mise au point par sélection généalogique dans le cadre du programme de sélection de l'avoine du Crop Development Centre. Elle est issue du croisement OT349 × J775-1, réalisé en 1993 au Crop Development Centre. Les générations F_1 à F_4 ont été cultivées en mélange et, pour ce qui est des générations F_1 et F_2, en serre hivernale, en Nouvelle-Zélande. 'CDC Orrin' est issue d'une panicule unique prélevée sur un sujet F_4 cultivé au champ, à Saskatoon, en 1995. Par la suite, les sujets F_5 d'un même poquet ont été sélectionnés à Saskatoon, en 1996. La lignée qui est devenue la variété 'CDC Orrin' a été obtenue par mise en mélange des graines de ces sujets F_5. Elle a été inscrite aux essais de rendement CDC sous la désignation 'OT382' en 1997-1998, puis aux essais coopératifs de l'avoine de l'Ouest en 1999-2000. La sélection était fondée sur la performance agronomique et les réactions aux maladies.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'CDC Orrin' ont été réalisés à Saskatoon (Saskatchewan) en 2001 et 2002 suivant un plan en blocs aléatoires complets, à raison de 2 répétitions par variété. Chaque parcelle était formée de 2 rangs de 3,7 m espacés de 15 cm.

Tableau 31 : Tableau de comparaison pour 'CDC Orrin'

	'CDC Orrin'	'CDC Boyer'*	'CDC Pacer'*	'AC Assiniboia'*
Hauteur de la plante (cm)				
moyenne	88,38	96,70	82,98	81,40
écart-type	7,00	6,69	5,71	10,42
Poids de 1000 grains (g)				
	39,01	41,19	39,42	37,70

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Furlong'** (voir la figure 12)
Dénomination antérieurement proposée : **OT2009**
Numéro de la demande : 02-3108
Date de la demande : 2002/05/27
Requérant : AAC-Winnipeg, Winnipeg (Manitoba)
Sélectionneuse : Jennifer Mitchell Fetch, AAC/CRC Winnipeg, Winnipeg (Manitoba)

Variétés de référence : 'CDC Dancer', 'AC Assiniboia' et 'Ronald'

Sommaire : *La dernière feuille est plus courte chez la variété candidate que chez les variétés de référence. La tige juste au-dessus et au-dessous du nœud supérieur présente une pubescence plus dense chez 'Furlong' que chez 'CDC Dancer' et 'Ronald'. 'Furlong' produit une plante plus haute que 'Ronald'. La glumelle inférieure est plus longue chez la variété candidate que chez 'CDC Dancer' et 'Ronald'. Le poids de 1 000 grains est plus élevé chez 'Furlong' que chez les variétés de référence. Le grain est légèrement plus long chez 'Furlong' que chez les variétés de référence. 'Furlong' est plus résistante que 'CDC Dancer' aux races CR13, CR181, CR185, CR192, CR223 et CR225 de la rouille couronnée* (Puccinia coronata) *ainsi qu'au virus de la jaunisse nanisante de l'orge (BYDV). 'Furlong' est plus sensible que 'Ronald' au BYDV.*

Description : 'Furlong' est une avoine de printemps à grains vêtus. Chez la plantule, le coléoptile est vert, et l'hypocotyle est court. La jeune plante a un port dressé, et la capacité de tallage est moyenne. La gaine des feuilles inférieures est moyennement pubescente, tandis que leur limbe est très faiblement pubescent. Au stade du gonflement, les feuilles sont vert moyen, moyennement glauques et glabres sur les bords. Les feuilles possèdent une ligule. La dernière feuille a un port intermédiaire; sa gaine est faiblement glauque. La tige est fortement pubescente juste au-dessus et au-dessous du nœud supérieur. À maturité, la tige est blanc jaunâtre, d'épaisseur moyenne.

La panicule est équilatérale, lâche, de taille moyenne et de longueur et largeur intermédiaires. Les ramifications sont demi-dressées à horizontales, de longueur moyenne. Le verticille inférieur des ramifications est inséré sur le premier

nœud. Le rachis est droit, sans nœud secondaire, et il forme un angle de plus de 45 degrés avec la ramification latérale dominante. Le nœud inférieur de la panicule porte un petit nombre de poils ou épines courts. La baguette est faiblement pubescente, et la deuxième fleur est de longueur et largeur moyennes. À maturité, la baguette présente des sillons de profondeur moyenne. La séparation de l'épillet se fait par fracture. L'épillet est demi-retombant. Le nombre moyen de fleurs par épillet est d'au plus 2. La séparation de la fleur se fait par hétérofracture.

Les glumes sont blanches à jaunes, de longueur et largeur moyennes. La glumelle inférieure est de longueur moyenne, avec une pointe de longueur moyenne, et elle est blanche à jaune à maturité. Les faces latérale et dorsale de la glumelle inférieure sont glabres, et elles ne sont pas glauques au stade vert. La glumelle inférieure porte fréquemment une arête, qui est courbée. Le chevauchement de la glumelle supérieure par la glumelle inférieure est modéré. La glumelle supérieure est moyenne (de la moitié de la longueur de la glumelle inférieure).

Le grain est brun pâle à brun foncé, rempli, sans pilosité basale. Sous rayons ultraviolets, une partie des grains sont fluorescents. Le caryopse est pubescent. Les poils de la brosse sont de longueur moyenne. Chaque épillet produit deux grains. Le scutellum est pointu, petit à moyen.

'Furlong' est résistante aux races CR13, CR181, CR185, CR192, CR223 et CR225 de la rouille couronnée (*Puccinia coronata*) ainsi qu'aux races A13, A60 et A617 du charbon nu (*Ustilago avenae*). Elle est modérément sensible aux races NA8, NA16, NA25, NA27, NA28 et NA55 de la rouille noire (*Puccinia graminis* f.sp. *avenae*), mais sensible à la race NA67. Elle est résistante au charbon vêtu (*Ustilago kolleri*) et modérément résistante au virus de la jaunisse nanisante de l'orge (BYDV). 'Furlong' présente une bonne résistance à la verse. Elle est sensible à la photopériode.

Origine génétique : La variété 'Furlong' a été mise au point par sélection généalogique modifiée. Elle est issue du croisement W93069 × AC Assiniboia, où W93069 = W86226(Pg 16) × Robert (où W86226 = Dumont*4 × 83GH130) et AC Assiniboia = Pc68 × 7*Robert, réalisé à l'automne 1994. Les sujets F_1 ont été cultivés en phytotron à l'hiver 1995. Les graines F_2 ont été mises en mélange et semées dans une pépinière à charbon et rouille de Glenlea (Manitoba) en 1995. Les graines ont été récoltées, mises en mélange et triées quant à leur grosseur. Les graines les plus uniformes ont été envoyées dans une pépinière d'hiver de Nouvelle-Zélande en 1995-1996. Dans la pépinière d'hiver, des panicules F_3 ont été sélectionnées parmi des sujets cultivés en rangs espacés. Il a été possible d'effectuer une sélection fondée sur la résistance à la rouille couronnée, conférée par la présence des gènes Pc38, Pc39 et Pc68, ainsi que sur la tolérance au virus de la jaunisse nanisante de l'orge (BYDV). En 1996, 338 épis-lignes F_4 ont été triés dans la pépinière à charbon et rouille de Glenlea. Des rangs ont été sélectionnés en fonction de la résistance aux maladies et de la qualité agronomique. Des rangs F_5 ont été cultivés dans une pépinière d'hiver de Nouvelle-Zélande en 1996-1997. En parallèle, des sujets F_5 ont été triés en présence de races témoins connues, dans une serre de Winnipeg, de manière à vérifier les résultats obtenus en Nouvelle-Zélande quant à la rouille. Des sous-échantillons d'avoine entière provenant de ces lignées ont été évalués pour leurs pourcentages de balle, de protéines et d'huile au moyen de la technologie du spectre dans le proche infrarouge (NIR). Des panicules provenant de sujets intéressants et résistants aux maladies ont été sélectionnées en Nouvelle-Zélande, et des rangs de ces panicules ont été semés en 1997, dans une pépinière F_6 à charbon et rouille de Glenlea. Les sujets F_7 ont été triés en fonction de leur résistance à la rouille couronnée et à la rouille noire dans la pépinière d'hiver en 1997-1998 et en fonction de leur tolérance au BYDV dans la pépinière d'hiver de Nouvelle-Zélande en 1997-1998. OT2009 a été mise à l'essai pendant une année (1999) dans le cadre des essais régionaux de la rouille et pendant deux ans (2000-2001) dans le cadre des essais coopératifs de l'avoine de l'Ouest. Cent dix parcelles de panicules isolées, constituées de rangs de 91,5 cm, ont été cultivées à Glenlea en 2000. Les graines des rangs uniformes ont été sélectionnées comme semence du sélectionneur.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Furlong' ont été réalisés suivant un plan en blocs aléatoires complets, à raison de 4 répétitions. Chaque parcelle mesurait 3,25 mètres carrés.

Tableau 32 : Tableau de comparaison pour 'Furlong'

	'Furlong'	'CDC Dancer'*	'CDC Assiniboia'*	'Ronald'*
Longueur de la dernière feuille (mm)				
moyenne	148,35	176,10	192,25	165,40
écart-type	22,769	28,904	35,792	23,676
Hauteur de la plante (cm)				
moyenne	90,65	86,50	88,10	81,90
écart-type	3,528	5,754	3,892	3,386
Poids de 1000 grains (g)				
	44,7	34,8	39,2	33,5

* variétés de référence

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

Dénomination proposée : **'NS4303'** (voir la figure 5)
Numéro de la demande : 02-3005
Date de la demande : 2002/03/04
Requérant : Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown (Ontario)
Sélectionneur : Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown (Ontario)

Note : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : '45A51', '45A54', '46A65', 'Legacy' et 'NS4304' (voir le tableau 33 à la page 129)

Sommaire : *Les cotylédons de 'NS4303' sont plus larges que ceux de 'NS4304' et de '46A65'. Les cotylédons de 'NS4303' sont plus longs que ceux de 'NS4304', '45A51', '45A54', '46A65' et 'Legacy'. Les feuilles de 'NS4303' sont plus courtes que celles de '45A54'. Les pétioles de 'NS4303' sont plus longs que ceux de 'NS4304'. Les pétales de 'NS4303' sont plus courts que ceux de '46A65' et plus étroits que ceux de 'NS4304', '45A54', '46A65' et 'Legacy'. La silique de 'NS4303' est plus courte que celles de '45A54' et de 'Legacy' mais plus longue que celle de 'NS4304'. La silique de 'NS4303' est plus large que celle de 'NS4304'. Chez 'NS4303', le bec de la silique est plus court que chez '45A51', '46A65' et 'Legacy' mais plus long que chez 'NS4304'. Le pédicelle de 'NS4303' est plus court que celui de '46A65'. 'NS4303' produit une plante plus haute que '45A51', '45A54' et 'Legacy'. 'NS4303' est sensible au glyphosate, tandis que '45A51' et '45A54' sont résistantes à ce composé.*

Description : 'NS4303' est un canola de printemps. Les cotylédons sont longs et larges. Le limbe des feuilles est vert moyen à vert foncé et présente un nombre petit à intermédiaire de lobes, arrondis à aigus, séparés par des sinus peu profonds à moyens. Les feuilles sont de longueur et largeur moyennes et ont un long pétiole. Les pétales sont jaunes, étroits et de longueur moyenne. Les anthères produisent du pollen. La silique est dressée à semi-dressée, courte à moyenne et de largeur moyenne, avec un bec de longueur moyenne et un pédicelle court. La plante est de hauteur moyenne et parvient à la maturité à la mi-saison. La couleur des graines varie entre le brun et le noir. La teneur des graines en acide érucique est très faible, et la teneur en glucosinolates est moyenne. La teneur en chlorophylle est moyenne. 'NS4303' est sensible au glyphosate et aux imidazolinones.

Origine génétique : La variété 'NS4303' a été mise au point en 1998, par sélection généalogique, au Centre de recherches de Georgetown de la Pioneer Hi-Bred Production Ltd. Les plantes F_1 ont été cultivées en serre, et leurs graines ont été récoltées en vrac. Les plantes F_2 ont également été cultivées en serre, et les graines de chacune ont été récoltées séparément comme semence pour les lignées F_3. Les lignées F_3 ont été sélectionnées en 1999, dans la pépinière de Georgetown, pour leur précocité de maturation, leurs fortes teneurs en huile et en protéines, leur faible teneur en glucosinolates, leur vigueur générale et l'uniformité des caractères. Les graines qui restaient des lignées F_3 ont été semées simultanément en serre, et les plantes ont été sélectionnées à l'aide de marqueurs moléculaires. Chaque plante F_3 issue d'autofécondation a été récoltée séparément. L'autopollinisation a été assurée au moyen d'un grand sac. Ensuite, les lignées F_4 ont été cultivées en isolement au Chili, où la vigueur générale et l'uniformité des plantes ont été observées. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange des graines F_5 provenant d'environ 30 rangs.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'NS4303' ont été réalisés durant les étés 2000 et 2002 à la Station de recherches de Georgetown de la Pioneer Hi-Bred Production Ltd (Ontario). Chaque parcelle comprenait deux rangs de 2 m espacés de 0,5 m, avec trois répétitions en blocs aléatoires complets.

Dénomination proposée : **'NS4304'** (voir la figure 6)
Numéro de la demande : 02-3006
Date de la demande : 2002/03/04
Requérant : Pioneer Hi-Bred Production Ltd. Georgetown (Ontario)
Sélectionneur : Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown (Ontario)

Note : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : '46A65', 'Legacy', '46A76', 'Q2' et 'NS4303' (voir le tableau 33 à la page 129)

Sommaire : *Les cotylédons de 'NS4304' sont plus étroits et*

plus courts que ceux de 'NS4303'. Les pétioles de 'NS4304' sont plus courts que ceux de '46A76'. Les pétales sont plus courts chez 'NS4304' que chez '46A65'. Les pétales de 'NS4304' sont plus larges que ceux de 'NS4303'. La silique et le bec de 'NS4304' sont plus courts que ceux de 'NS4303', '46A65', '46A76', 'Legacy' et 'Q2'. La silique de 'NS4304' est plus étroite que celles de 'NS4303', '46A65', 'Legacy' et 'Q2'. Le pédicelle de 'NS4304' est plus court que ceux de '46A65' et 'Legacy'. 'NS4304 est sensible aux imidazolinones, tandis que '46A76' est résistante à ces composés.

Description : 'NS4304' est un canola de printemps. Les cotylédons sont de longueur et largeur moyennes. Le limbe des feuilles est vert moyen à vert foncé et présente un nombre très petit de lobes, arrondis à aigus, séparés par des sinus peu profonds à moyens. Les feuilles sont de longueur et largeur moyennes et ont un pétiole très court. Les pétales sont jaunes, de longueur moyenne et étroits à moyens. Les anthères produisent du pollen. La silique est dressée à semi-dressée, très courte et étroite, avec un bec court et un pédicelle court à moyen. La plante est courte et parvient à maturité à la mi-saison. La couleur des graines varie entre le brun et le noir. La teneur des graines en acide érucique est très faible, et la teneur en glucosinolates est moyenne. La teneur en chlorophylle est moyenne. 'NS4303' est sensible au glyphosate et aux imidazolinones.

Origine génétique : La variété 'NS4304' a été mise au point en 1998, par sélection généalogique, au Centre de recherches de Georgetown de la Pioneer Hi-Bred Production Ltd. Les plantes F_1 ont été cultivées en serre, leurs graines ont été récoltées en vrac. Les plantes F_2 ont également été cultivées en serre, et les graines de chacune ont été récoltées séparément comme semence pour les lignées F_3. Les lignées F_3 ont été sélectionnées en 1999, dans la pépinière de Georgetown, pour leur précocité de maturation, leurs fortes teneurs en huile et en protéines, leur faible teneur en glucosinolates, leur vigueur générale et l'uniformité des caractères. Les graines qui restaient des lignées F_3 ont été semées simultanément en serre, et les plantes ont été sélectionnées à l'aide de marqueurs moléculaires. Chaque plante F_3 issue d'autofécondation a été récoltée séparément. Ensuite, les lignées F_4 ont été cultivées en isolement au Chili où la vigueur générale et l'uniformité des plantes ont été observées. L'autopollinisation a été assurée au moyen d'un grand sac. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange des graines F_5 provenant d'environ 30 rangs.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'NS4304' ont été réalisés durant les étés 2000 et 2002 à la Station de recherches de Georgetown de la Pioneer Hi-Bred Production Ltd (Ontario). Chaque parcelle comprenait deux rangs de 2 m espacés de 0,5 m, avec trois répétitions en blocs aléatoires complets.

Tableau 33 : Tableau de comparaison pour 'NS4303' et 'NS4304'

	'NS4303'a	**'NS4304'**b	**'45A51'***a	**'45A54'***a	**'46A65'***ab	**'Legacy'***ab	**'46A76'***b	**'Q2'***b
Largeur des cotylédons (mm)								
moyenne	21,66	19,59	20,13	20,86	18,30	19,20	17,55	20,20
signification	-	p<0,001a	ns	ns	p<0,001a	ns	ns	ns
Longueur des cotylédons (mm)								
moyenne	10,30	8,83	9,96	9,83	8,99	8,71	8,55	9,88
signification	-	p<0,001a	ns	p<0,001	p<0,001a	p<0,001a	ns	ns
Longueur de la feuille (cm)								
moyenne	22,94	22,18	24,32	26,05	23,27	20,16	23,77	24,72
signification	-	ns	ns	p<0,001	ns	ns	ns	ns
Longueur du pétiole (cm)								
moyenne	10,46	4,61	9,22	13,70	7,66	6,72	13,99	6,46
signification	-	p<0,001a	ns	ns	ns	ns	p<0,001	ns
Longueur des pétales (mm)								
moyenne	12,43	13,00	11,83	12,20	13,93	12,73	13,35	13,60
signification	-	ns	ns	ns	p<0,001a	ns	ns	ns
Largeur des pétales (mm)								
moyenne	5,08	6,17	5,22	5,56	6,38	5,97	5,85	6,23
signification	-	p<0,001a	ns	p<0,001	p<0,001a	p<0,001a	ns	ns
Longueur de la silique (mm)								
moyenne	52,99	48,45	56,59	56,49	54,03	60,54	56,83	65,64
signification	-	p<0,001a	ns	p<0,001	p<0,001b	p<0,001ab	p<0,001	p<0,001
Largeur de la silique (mm)								
moyenne	4,91	4,28	5,13	5,10	4,89	5,20	4,82	4,88
signification	-	p<0,001a	ns	ns	p<0,001b	p<0,001b	ns	p<0,001
Longueur du bec (mm)								
moyenne	8,51	7,35	10,52	8,88	10,51	10,08	8,46	9,09
signification	-	p<0,001a	p<0,001	ns	p<0,001ab	p<0,001ab	p<0,001	p<0,001
Longueur du pédicelle (mm)								
moyenne	19,60	18,70	18,75	21,79	23,32	21,97	17,59	18,62
signification	-	ns	ns	ns	p<0,001ab	p<0,001b	ns	ns
Hauteur de la plante (cm)								
moyenne	103,73	97,25	94,57	95,00	103,43	95,60	104,42	97,77
signification	-	ns	p<0,001	p<0,001	ns	p<0,001a	ns	ns

* variétés de référence
p - valeur de probabilité
ns - non significatif

Les moyennes ont été calculées à partir de moyennes établies sur deux ans par observation de caractères des siliques chez 60 plantes, par mesure de la hauteur chez 30 plantes et par 50 mesures de cotylédons. Les différences sont significatives au seuil de probabilité de 2% selon le critère de la plus petite différence significative.

Dénomination proposée : **'43A56'** (voir la figure 7)
Dénomination antérieurement proposée : **NS4571**
Numéro de la demande : 02-3065
Date de la demande : 2002/04/26
Requérant : Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown (Ontario)
Sélectionneur : Pioneer Hi-Bred Production Ltd., Georgetown (Ontario)

Note : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : '45A01', 45A51', '45A71' et 'Excel'

Sommaire : *Les pétales de '43A56' sont plus étroits que ceux de 'Excel'. La silique de '43A56' est plus étroite que celle de '45A71'. Le bec de '43A56' est plus long que celui de '45A01' mais plus court que ceux de '45A51' et '45A71'. '43A56' est résistante au glyphosate, tandis que '45A01', '45A71' et 'Excel' sont sensibles à ce composé. '43A56' est sensible aux imidazolinones, tandis que '45A71' est résistante à ces composés.*

Description : '43A56' est un canola de printemps à pollinisation libre Roundup Ready. Les cotylédons sont longs et de largeur moyenne. Le limbe des feuilles est vert moyen à vert foncé et présente un petit nombre de lobes, aigus et séparés par des sinus peu profonds à moyens. Les feuilles sont de longueur et largeur moyennes et ont un pétiole de longueur moyenne. Les pétales sont jaunes, de longueur moyenne et étroits. Les anthères produisent du pollen. La silique est semi-dressée à horizontale, courte à moyenne et étroite, avec un bec et un pédicelle courts à moyens. La plante est courte et parvient à maturité très tôt au cours de la saison. La couleur des graines varie du brun au noir. La teneur des graines en acide érucique est très faible et la teneur en glucosinolates est faible. La teneur en chlorophylle est moyenne. '43A56' est résistante au glyphosate et sensible aux imidazolinones.

Origine génétique : La variété '43A56' a été mise au point en 1998, par sélection généalogique, au Centre de recherches d'Edmonton de la Pioneer Hi-Bred International Inc. Les sujets individuels et leurs descendants ont été sélectionnés pour leur précocité de maturation, leur résistance à la verse, leurs fortes teneurs en huile et en protéines, leur vigueur générale et l'uniformité des caractères. En 2000, '43A56' a été soumise à des essais de rendement préliminaires, avant son inscription en 2001 aux essais à grande échelle de la Pioneer Hi-Bred. En 2002, '43A56' a été inscrite aux essais coopératifs publics de l'Ouest canadien.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de '43A56' ont été réalisés durant les étés 2001 et 2002 à la Station de recherches de Georgetown de la Pioneer Hi-Bred Production Ltd (Ontario). Chaque parcelle comprenait deux rangs de 2 m espacés de 0,5 m, avec trois répétitions en blocs aléatoires complets.

Table 34 : Comparison table for '43A56'

	'43A56'	'45A01'*	'45A51'*	'45A71'*	'Excel'*
Largeur des pétales (mm)					
moyenne	5,23	5,62	5,45	5,47	5,93
signification	-	ns	ns	ns	p<0,001
Largeur de la silique (mm)					
moyenne	4,39	4,72	4,74	4,90	4,42
signification	-	ns	ns	p<0,001	ns
Longueur du bec (mm)					
moyenne	7,63	6,43	9,39	8,63	7,92
signification	-	p<0,001	p<0,001	p<0,001	ns

* variétés de référence
p - valeur de probabilité
ns - non significatif

Les moyennes ont été calculées à partir de moyennes établies sur deux ans par observation de caractères des siliques chez 60 plantes, par mesure de la hauteur chez 30 plantes et par 50 mesures de cotylédons. Les différences sont significatives au seuil de probabilité de 2% selon le critère de la plus petite différence significative.

CERISIER (*Prunus avium* L.)

Dénomination proposée : **'13S2101'** (voir la figure 8)
Numéro de la demande : 02-3216
Date de la demande : 2002/08/16
Requérant : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Summerland (Colombie-Britannique)

Mandataire au Canada : okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland (Colombie-Britannique)

Variétés de référence : 'Sweetheart' et '13S2009' (nom commercial : Staccato)

Sommaire : *'13S2101' est un cerisier à cerises douces qui produit un arbre étalé, tandis que 'Sweetheart' donne un arbre plus dressé. La variété candidate ne produit pas une récolte fruitière aussi abondante que les variétés de référence. Cependant, chez '13S2101', le poids moyen du fruit est plus élevé que chez '13S2009'. Chez '13S2101', le fruit est cordiforme allongé; chez '13S2009', il est cordiforme comprimé; chez 'Sweetheart', il est sphérique. Chez la variété candidate, la peau du fruit mûr est rouge, tandis qu'elle est rouge à violet-rouge foncé chez les variétés de référence. La chair du fruit est d'un rouge moins foncé chez '13S2101' que chez les variétés de référence. Le fruit de '13S2101' parvient à maturité très tard. Dans la vallée de l'Okanagan, il est récolté 2 à 4 jours après celui de '13S2009', et environ 12 à 16 jours après celui de 'Sweetheart'.*

Description : '13S2101' est un cerisier à cerises douces qui produit un arbre de type normal, à port étalé. Le rameau d'un an est dressé à horizontal, d'épaisseur moyenne, glabre ou très faiblement pubescent, à pigmentation anthocyanique très faible ou nulle. Ses entre-nœuds sont modérément courts et portent un nombre moyen à élevé de lenticelles. Le bourgeon à bois est conique, gros, légèrement décollé du rameau, et son support est modérément grand. Le rameau de l'année est glabre ou très faiblement pubescent, faiblement anthocyané.

Les feuilles sont elliptiques, perpendiculaires au rameau à légèrement inclinées vers la base du rameau. Leur base est en forme de U, et leur sommet, cuspidé à acuminé, forme un angle aigu. En coupe transversale, les feuilles sont concaves. La face supérieure du limbe est vert foncé, modérément luisante, dépourvue de pigmentation anthocyanique; sa face inférieure est faiblement pubescente. Le bord du limbe est denté. Les indentations sont moyennes à profondes. Avant la chute des feuilles, le limbe est vert-jaune. Le pétiole est anthocyané et porte généralement plus de deux nectaires réniformes, orange et jaune.

La densité de floraison est faible à moyenne. Les fleurs sont simples et disposées en bouquets. Le bouton floral est blanc. Le pédicelle est modérément mince, glabre. Les pétales sont petits à moyens, elliptiques larges, disjoints. Les anthères produisent du pollen. Le pistil est normal, et l'ovaire est glabre.

Le fruit est moyen à gros, allongé à cordiforme, à profil arrondi. Le diamètre maximal se situe au milieu du fruit. La peau du fruit, rouge vin, présente un nombre modéré de petits points pâles. La suture est peu distincte. La chair est ferme, rouge, sucrée. Le jus est rouge, modérément abondant. Le sommet du fruit est plat à légèrement en saillie. La peau est assez peu sujette à l'éclatement dû à la pluie. Le pédoncule est long, modérément épais.

Le noyau est semi-adhérent, gros. Vu de côté, il est symétrique, arrondi à allongé. Vu de face, il est ové, tandis que vu de la base il est rond. La carène est modérément développée.

La production est modérément précoce. Les bourgeons à bois éclatent avant le début de la pleine floraison. La variété est autocompatible. La floraison est tardive, et le fruit parvient à maturité très tard, durant la dernière semaine d'août à Summerland (Colombie-Britannique). Le taux de nouaison est faible à moyen. La chute des feuilles est tardive.

Origine génétique : '13S2101' est issue de la pollinisation libre de la variété 'Sweetheart'. L'hybridation a eu lieu en 1982 au Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Summerland, en Colombie-Britannique. Le cultivar a été sélectionné en 1991 et a reçu la désignation 13S-21-01. En 1991, le matériel a été greffé sur cinq pieds de *Prunus avium*, puis planté dans une parcelle d'essai du Centre de recherches. L'évaluation a débuté dès la première fructification. La variété a été sélectionnée pour l'époque de maturation, la grosseur et la forme des fruits, leur résistance à l'éclatement, la fermeté et la couleur de la chair, la couleur et le lustre de la peau, la fertilité, le rendement et la précocité de production.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de '13S2101' ont été effectués en 2002 par l'okanagan Plant Improvement Co. Ltd. (PICO) au verger de Clive Sutherland, à Peachland (Colombie-Britannique). Les essais ont porté sur 22 sujets de la variété candidate et 10 sujets de chaque variété de référence, tous élevés sur porte-greffe Mazzard et plantés en 1998. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 15 mesures.

Tableau 35 : Tableau de comparaison pour '13S2101'

	'13S2101'	'Sweetheart'*	'13S2009'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	162,1	173,5	158,6
écart-type	6,24	11,00	8,72
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	71,3	75,0	73,7
écart-type	6,05	6,62	5,04

Longueur du pétiole (mm)			
moyenne	33,9	40,6	37,9
écart-type	3,72	2,56	4,05
Longueur du pédoncule du fruit (mm)			
moyenne	61,4	46,2	56,9
écart-type	6,01	4,95	6,54
Poids du fruit (g)			
moyenne	10,3	10,6	9,5
nombre de mesures	55	50	50
Teneur en matière solides solubles (%)			
moyenne	20,60	20,80	20,40

* variétés de référence

MAÏS
(*Zea mays* L.)

Dénomination proposée : **'I181664'** (voir la figure 9)
Numéro de la demande : 01-2809
Date de la demande : 2001/08/21
Requérant : DEKALB Genetics Corporation, DeKalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)

Variété de référence : '3AZA1'

Sommaire : *L'épi principal est inséré plus haut chez 'I181664' que chez '3AZA1'. Le bourrelet basal, le corps et le sommet des glumes ne sont pas anthocyanés chez 'I181664', alors qu'ils sont faiblement anthocyanés chez '3AZA1'. Les ramifications latérales de la panicule sont dressées à demi-dressées chez 'I181664', alors qu'elles sont demi-dressées à horizontales chez '3AZA1'.*

Description : 'I181664' est une variété autofécondée de maïs. À l'apparition de l'inflorescence, les feuilles sont demi-dressées (angle de 30 à 40 degrés par rapport à la tige). Après la floraison mâle, le limbe des feuilles est moyen à large, et la gaine est dépourvue de pigmentation anthocyanique. Le nombre total de feuilles par tige est faible (11 à 13). Les nœuds et les entre-nœuds sont dépourvus de pigmentation anthocyanique.

L'apparition de la panicule et la floraison mâle sont hâtives à intermédiaires. Le bourrelet basal, le corps et le sommet des glumes ainsi que les anthères ne présentent aucune pigmentation anthocyanique. À la fin de la floraison mâle, l'axe central de la panicule est moyen à long lorsque mesuré au-dessus de la ramification latérale la plus basse et long lorsque mesuré au-dessus de la ramification latérale la plus haute. Les ramifications de l'axe central sont clairsemées à moyennes, peu nombreuses (3 à 10) ainsi que dressées à demi-dressées, et elles forment avec l'axe central un angle intermédiaire (30 à 60 degrés).

Les soies ne présentent aucune pigmentation anthocyanique un ou deux jours ainsi que deux ou trois jours après leur apparition. Le pédoncule de l'épi est long à très long. Un pourcentage très faible des plantes ont une spathe ailée. L'épi est cylindrique-conique, et son diamètre au tiers médian est moyen, grains inclus, ou petit à moyen, grain exclus. Le nombre de rangs de grains est intermédiaire (13 ou 14). Les glumes de la rafle sont anthocyanées. Les grains sont cunéiformes, en partie dentés et en partie cornés, à face dorsale orange-jaune et à sommet jaune.

Origine génétique : 'I181664' est issue d'un croisement '3AVB3' × '3AZA1' réalisé durant l'été 1994. Les graines ont été semées en lignes-épis de 1994 à 1998. La lignée pure ainsi obtenue a été codée 'I181664' durant l'été 1997, puis multipliée par autofécondation. Les critères de sélection étaient le rendement des produits d'hybridation, la précocité de maturation et le poids spécifique du grain.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'I181664' ont été réalisés à London (Ontario), en 2001 et 2002. Les essais comportaient 2 répétitions de 2 rangs chacune. Les rangs mesuraient 4,5 m de longueur et renfermaient chacun environ 22 sujets.

Tableau 36 : Tableau de comparaison pour 'I181664'

	'I181664'	'3AZA1'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	184,5	180,9
écart-type	9,30	11,27
Hauteur du point d'insertion de l'épi principal (cm)		
moyenne	59,8	44,35
écart-type	7,14	8,06
Nombre de jours entre la levée et l'apparition des soies chez 50 % des plantes		
moyenne	76,5	78,5

* variété de référence

Dénomination proposée : **'I325350'** (voir la figure 10)
Numéro de la demande : 01-2810
Date de la demande : 2001/08/21
Requérant : DEKALB Genetics Corporation, DeKalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., Chatham (Ontario)

Variété de référence : '3AZA1'

Sommaire : *Le corps et le sommet des glumes ne sont pas anthocyanés chez 'I325350', alors qu'ils sont faiblement anthocyanés chez '3AZA1'. Les ramifications de la panicule sont demi-dressées chez 'I325350', alors qu'elles sont demi-dressées à horizontales chez '3AZA1'. Les soies de 'I325350' sont vertes avec un peu de rose et de havane, alors que celles de '3AZA1' sont vertes. L'épi de 'I325350' est plus long que celui de '3AZA1'.*

Description : 'I325350' est une variété autofécondée de maïs. À l'apparition de l'inflorescence, les feuilles sont demi-dressées (angle de 30 à 40 degrés par rapport à la tige). Après la floraison mâle, le limbe des feuilles est de largeur moyenne, et la gaine est dépourvue de pigmentation anthocyanique. Le nombre total de feuilles par tige est faible (11 à 13). Les nœuds et les entre-nœuds sont dépourvus de pigmentation anthocyanique.

L'apparition de la panicule et la floraison mâle surviennent à une époque intermédiaire. Le bourrelet basal, le corps et le sommet des glumes ainsi que les anthères ne présentent aucune pigmentation anthocyanique. À la fin de la floraison mâle, l'axe central de la panicule est moyen à long, qu'il soit mesuré au-dessus de la ramification latérale la plus basse ou au-dessus de la ramification latérale la plus haute. Les ramifications de l'axe central sont clairsemées à moyennes, peu nombreuses (3 à 10) ainsi que demi-dressées, et elles forment avec l'axe central un angle intermédiaire (30 à 60 degrés).

Un ou deux jours après leur apparition, les soies ne présentent aucune pigmentation anthocyanique. Deux ou trois jours après leur apparition, elles sont vertes avec un peu de rose et de havane. Le pédoncule de l'épi est très long. Un pourcentage moyen à élevé des plantes ont une spathe ailée. L'épi est cylindrique-conique, et son diamètre au tiers médian est petit à moyen, grains inclus ou exclus. Le nombre de rangs de grains est peu élevé (10 à 12). Les glumes de la rafle sont anthocyanées. Les grains sont cunéiformes, répartis à parts égales entre les types denté et corné; leur face dorsale est orange-jaune, et leur sommet est jaune.

Origine génétique : 'I325350' est issue d'un croisement entre les lignées pures '3AVB3' et '3AZA1', réalisé durant l'été 1994. La sélection finale et la mise en mélange ont été effectuées durant l'été 1994, puis les graines ont été multipliées par autofécondation de 1994 à 2000. Les critères de sélection étaient l'aptitude à la combinaison, la qualité de la tige, la santé de la plante, la quantité de tige intacte au-dessus de l'épi au moment de la récolte et la qualité du grain.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'I325350' ont été réalisés à London (Ontario), en 2001 et 2002. Les essais comportaient 2 répétitions de 2 rangs chacune. Les rangs mesuraient 4,5 m de longueur et renfermaient chacun environ 22 sujets.

Tableau 37 : Tableau de comparaison pour 'I325350'

	'I325350'	'3AZA1'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	184,95	180,9
écart-type	13,09	11,27
Hauteur du point d'insertion de l'épi principal (cm)		
moyenne	51,15	44,35
écart-type	7,00	8,06
Nombre de jours entre la levée et l'apparition des soies chez 50 % des plantes		
moyenne	78	79
Longueur de l'épi (mm)		
moyenne	155	142
écart-type	13,39	12,14

* variété de référence

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

Dénomination proposée : **'Seidacre'** (voir la figure 13)
Synonyme : **'Milk Symphony'**
Numéro de la demande : 01-2886
Date de la demande : 2001/12/04
Requérant : Masayuki Sekiguchi, préfecture de Gunma (Japon)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries, Abbotsford (Colombie-Britannique)

Variétés de référence : 'Seikilrem' et 'Akvarza'

Sommaire : *'Seidacre' donne une plante plus haute que les variétés de référence et des pousses plus longues que*

'Akvarza'. Les feuilles ne sont pas lobées ou le sont très faiblement chez 'Seidacre', tandis qu'elles sont faiblement lobées chez 'Akvarza'. Les feuilles sont vert moyen chez la variété candidate, alors qu'elles sont panachées chez 'Akvarza'. Le pédoncule est plus long chez 'Seidacre' que chez 'Akvarza'. Le diamètre de l'inflorescence est plus petit chez 'Seidacre' que chez les variétés de référence. La variété candidate diffère en outre des variétés de référence par la couleur des fleurs.

Description : Les pousses sont demi-dressées à horizontales. La tige n'est pas anthocyanée. Les feuilles ne sont pas lobées ou le sont très faiblement. Elles sont vert moyen, sans panachure.

La floraison de 'Seidacre' est hâtive à intermédiaire (semaine 12). Le capitule présente deux rangs complets de rayons et un rang incomplet. Les rayons sont elliptiques à obovés. Leur face supérieure est jaune pâle avec une bande violette à la base, tandis que leur face inférieure est gris jaunâtre avec du vert. Le disque est brun violacé.

Origine génétique : 'Seidacre' est issue d'un sujet en fleurs découvert par le sélectionneur parmi la descendance d'un croisement entre deux sélections non identifiées d'*Osteospermum ecklonis*, réalisé en avril 1986, dans la préfecture de Gunma (Japon). En 1991, on a commencé à la multiplier en conditions contrôlées, par bouturage d'extrémités végétatives, dans la préfecture de Gunma (Japon).

Épreuves et essais : Les essais de 'Seidacre' ont été effectués dans une serre de polyéthylène de St. Thomas (Ontario) à l'hiver et au printemps 2003. Les essais ont porté sur 15 sujets par variété. Des boutures racinées ont été plantées dans des pots de 11,5 cm le 18 février 2003. Les caractères quantitatifs sont fondés sur dix mesures, et les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 2001.

Tableau 38 : Tableau de comparaison pour 'Seidacre'

	'Seidacre'	'Seikilrem'*	'Akvarza'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	40,13	33,65	22,65
écart-type	2,167	3,786	4,595
Longueur de la tige (cm)			
moyenne	22,07	21,45	13,60
écart-type	4,137	3,730	3,414
Diamètre du capitule (cm)			
moyenne	6,16	7,32	7,16
écart-type	0,476	0,476	0,617
Longueur du pédoncule (cm)			
moyenne	9,95	9,95	5,90
écart-type	2,354	2,114	3,161
Couleur de la face supérieure des rayons (RHS)			
marge	13D	13B	155D
partie centrale	13D (11D vers la base)	13C (avec rayures 13B)	155D
base	N88A à 93A (N78C au centre)	N88A à 93A (N78C au centre)	155D

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Seikilrem'** (voir la figure 14)
Synonyme : **'Mother Symphony'**
Numéro de la demande : 01-2887
Date de la demande : 20001/12/04
Requérant : Masayuki Sekiguchi, préfecture de Gunma (Japon)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries, Abbotsford (Colombie-Britannique)

Variétés de référence : 'Seidacre' et 'Zulu'

Sommaire : *'Seikilrem' donne une plante plus courte que 'Seidacre' et des pousses plus longues que 'Zulu'. La tige n'est pas anthocyanée chez 'Seikilrem', tandis qu'elle est anthocyanée chez 'Zulu'. Chez 'Seikilrem', le capitule est plus grand que chez 'Seidacre' mais plus petit que chez 'Zulu'. Les rayons sont plus étroits chez 'Seikilrem' que chez 'Seidacre'. Le pédoncule est plus long chez 'Seikilrem' que chez 'Zulu'. Le disque est brun-violet chez 'Seikilrem', alors qu'il est jaune chez 'Zulu'. La variété candidate diffère en outre des variétés de référence par la couleur des rayons.*

Description : Les pousses sont demi-dressées à demi-retombantes. La tige n'est pas anthocyanée. Les feuilles sont très faiblement lobées. Elles sont vert moyen, sans panachure.

La floraison de 'Seikilrem' est intermédiaire à tardive (semaine 14). Le capitule présente deux rangs complets de rayons et un rang incomplet. Les rayons sont elliptiques. Leur face supérieure est orange jaunâtre avec une bande violette à la base, tandis que leur face inférieure est brun jaunâtre. Le disque est brun violacé.

Origine génétique : 'Seikilrem' est issue d'une mutation naturelle apparue chez un sujet entier de la variété 'Seidacre'. Le sélectionneur a découvert ce sujet en fleurs en avril 1993 parmi une population de la variété parente. En 1993, on a commencé à multiplier la variété en conditions contrôlées, par bouturage d'extrémités végétatives, dans la préfecture de

Gunma (Japon).

Épreuves et essais : Les essais de 'Seikilrem' ont été effectués dans une serre de polyéthylène de St. Thomas (Ontario) à l'hiver et au printemps 2003. Les essais ont porté sur 15 sujets par variété. Des boutures racinées ont été plantées dans des pots de 11,5 cm le 18 février 2003. Les caractères quantitatifs sont fondés sur dix mesures, et les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 2001.

Tableau 39 : Tableau de comparaison pour 'Seikilrem'

	'Seikilrem'	'Seidacre'*	'Zulu'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	33,65	40,13	35,83
écart-type	3,786	2,167	4,434
Longueur de la tige (cm)			
moyenne	21,45	22,07	12,35
écart-type	3,730	4,137	2,212
Diamètre du capitule (cm)			
moyenne	7,32	6,16	8,31
écart-type	0,476	0,476	0,840
Longueur du pédoncule (cm)			
moyenne	9,95	9,95	6,40
écart-type	2,114	2,354	2,234
Couleur de la face supérieure des rayons (RHS)			
marge	13B	13D	12A
partie centrale	13C (avec rayures 13B	13D (11D vers la base)	10A-B (avec rayures 12A)
base	N88A à 93A (N78C au centre)	N88A à 93A (N78C au centre)	10A-B (avec rayures 12A)

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Seikimora'** (voir la figure 15)
Synonyme : **'Sister Symphony'**
Numéro de la demande : 01-2888
Date de la demande : 20001/12/04
Requérant : Masayuki Sekiguchi, préfecture de Gunma (Japon)
Mandataire au Canada : Nordic Nurseries, Abbotsford (Colombie-Britannique)

Variétés de référence : 'Seikilrem' et 'Akope'

Sommaire : *'Seikimora' donne une plante plus haute que les variétés de référence. Les pousses sont plus longues chez 'Seikimora' que chez 'Akope' mais plus courtes que chez 'Seikilrem'. Les feuilles sont moins lobées chez 'Seikimora' que chez 'Akope'. Le capitule est plus petit chez 'Seikimora' que chez 'Akope'. Le pédoncule est plus long chez 'Seikimora' que chez 'Akope'. Les fleurs sont orange chez 'Seikimora', alors qu'elles sont jaunes chez 'Seikilrem' et rose rougeâtre chez 'Akope'.*

Description : Les pousses sont demi-dressées à demi-retombantes. La tige n'est pas anthocyanée. Les feuilles sont très faiblement lobées. Elles sont vert moyen, sans panachure.

La floraison de 'Seikimora' est hâtive (semaine 12). Le capitule présente deux rangs complets de rayons et un rang incomplet. Les rayons sont elliptiques. Leur face supérieure est orange avec une bande violette à la base, tandis que leur face inférieure est brun jaunâtre. Le disque est brun violacé.

Origine génétique : 'Seikimora' est issue d'une mutation naturelle apparue chez un sujet entier de la variété 'Seikilrem'. Le sélectionneur a découvert ce sujet en fleurs en avril 1996 parmi une population de la variété parente. En 1996, on a commencé à multiplier la variété en conditions contrôlées, par bouturage d'extrémités végétatives, dans la préfecture de Gunma (Japon).

Épreuves et essais : Les essais de 'Seikimora' ont été effectués dans une serre de polyéthylène de St. Thomas (Ontario) à l'hiver et au printemps 2003. Les essais ont porté sur 15 sujets par variété. Des boutures racinées ont été plantées dans des pots de 11,5 cm le 18 février 2003. Les caractères quantitatifs sont fondés sur dix mesures, et les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 2001.

Tableau 40 : Tableau de comparaison pour 'Seikimora'

	'Seikimora'	'Seikilrem'*	'Akope'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	38,55	33,65	28,75
écart-type	4,487	3,786	2,880
Longueur de la tige (cm)			
moyenne	17,95	21,45	11,65
écart-type	1,606	3,730	3,309
Diamètre du capitule (cm)			
moyenne	7,63	7,32	8,83
écart-type	0,562	0,476	0,533
Longueur du pédoncule (cm)			
moyenne	10,85	9,95	6,75
écart-type	1,510	2,114	1,885

Couleur de la face supérieure des rayons (RHS)			
marge	25A	13B	50D
partie centrale	5B (avec rayures 25A)	13C (avec rayures 13B)	50D - 51D (avec fond 13D)
base	N88A à 93A (N78C au centre)	N88A à 93A (N78C au centre)	13D

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Seitope'** (voir la figure 16)
Synonyme : **'Peach Symphony'**
Numéro de la demande : 02-3295
Date de la demande : 2002/10/03
Requérant : Jørn Hanssen, Sønderso (Danemark)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)

Variétés de référence : 'Seikilrem' et 'Akope'

Sommaire : *'Seitope' donne une plante plus haute et des pousses plus longues que les variétés de référence. Le diamètre du capitule est plus petit chez 'Seitope' que chez les variétés de référence. Le pédoncule est plus long chez 'Seitope' que chez les variétés de référence. Les fleurs sont jaunes chez 'Seitope', alors qu'elles sont rose rougeâtre chez 'Akope'.*

Description : Les pousses sont demi-dressées à demi-retombantes. La tige n'est pas anthocyanée. Les feuilles sont très faiblement lobées. Elles sont vert moyen, sans panachure.

L'époque de floraison de 'Seitope' est intermédiaire (semaine 13). Le capitule présente deux rangs complets de rayons et un rang incomplet. Les rayons sont elliptiques. Leur face supérieure est jaune avec une bande violette à la base, tandis que leur face inférieure est brun jaunâtre. Le disque est brun violacé.

Origine génétique : 'Seitope' est issue d'une mutation naturelle apparue chez un sujet entier de la variété 'Seikilrem'. Le sélectionneur a découvert ce sujet en fleurs en mai 1999 parmi une population de la variété parente. En juin 1999, on a commencé à multiplier la variété par bouturage d'extrémités végétatives, au Danemark.

Épreuves et essais : Les essais de 'Seitope' ont été effectués dans une serre de polyéthylène de St. Thomas (Ontario) à l'hiver et au printemps 2003. Les essais ont porté sur 15 sujets par variété. Des boutures racinées ont été plantées dans des pots de 11,5 cm le 18 février 2003. Les caractères quantitatifs sont fondés sur dix mesures, et les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 2001.

Tableau 41 : Tableau de comparaison pour 'Seitope'

	'Seitope'	**'Seikilrem'***	**'Akope'***
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	38,65	33,65	28,75
écart-type	5,323	3,786	2,880
Longueur de la tige (cm)			
moyenne	32,55	21,45	11,65
écart-type	5,002	3,730	3,309
Diamètre du capitule (cm)			
moyenne	6,18	7,32	8,83
écart-type	0,274	0,476	0,533
Longueur du pédoncule (cm)			
moyenne	11,90	9,95	6,75
écart-type	3,673	2,114	1,885
Couleur de la face supérieure des rayons (RHS)			
marge	63B (avec fond de couleur 12D)	13B	50D
partie centrale	12D (avec rayures 64D)	13C (avec rayures 13B)	50D/51D (avec fond 13D)
base	83A (77A au centre)	N88A à 93A (N78C au centre)	13D

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Sevamil'** (voir la figure 17)
Synonyme : **'Vanilla Symphony'**
Numéro de la demande : 02-3357
Date de la demande : 2002/11/21
Requérant : Jørn Hanssen, Sønderso (Danemark)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)

Variétés de référence : 'Seikilrem' et 'Beira'

Sommaire : *'Sevamil' donne une plante plus haute, des pousses plus courtes et des pédoncules plus longs que les variétés de référence. Les fleurs sont blanches chez 'Sevamil', alors qu'elles sont jaunes chez 'Seikilrem'. 'Sevamil' fleurit avant les variétés de référence.*

Description : Les pousses sont demi-dressées à horizontales. La tige n'est pas anthocyanée. Les feuilles sont très faiblement lobées. Elles sont vert moyen, sans panachure.

La floraison de 'Sevamil' est très hâtive (semaine 11). Le

capitule présente deux rangs complets de rayons. Les rayons sont elliptiques. Leur face supérieure est blanche avec une bande violette à la base, tandis que leur face inférieure est brun jaunâtre. Le disque est brun violacé.

Origine génétique : 'Sevamil' est issue d'une mutation naturelle apparue chez un sujet entier de la variété 'Seikilrem'. Le sélectionneur a découvert ce sujet en fleurs en juin 2000. La variété a été sélectionnée pour ses fleurs uniques de couleur ivoire. En août 2000, on a commencé à la multiplier par bouturage d'extrémités végétatives, au Danemark.

Épreuves et essais : Les essais de 'Sevamil' ont été effectués dans une serre de polyéthylène de St. Thomas (Ontario) à l'hiver et au printemps 2003. Les essais ont porté sur 15 sujets par variété. Des boutures racinées ont été plantées dans des pots de 11,5 cm le 18 février 2003. Les caractères quantitatifs sont fondés sur dix mesures, et les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 2001.

Tableau 42 : Tableau de comparaison pour 'Sevamil'

	'Sevamil'	'Seikilrem'*	'Beira'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	45,90	33,65	30,35
écart-type	1,449	3,786	3,019
Longueur de la tige (cm)			
moyenne	28,88	21,45	10,75
écart-type	2,854	3,730	1,799
Longueur du pédoncule (cm)			
moyenne	11,66	9,95	3,95
écart-type	2,199	2,114	1,257
Couleur de la face supérieure des rayons (RHS)			
marge	155D	13B	155D (mais plus blanche)
partie centrale	155D	13C (avec rayures 13B)	155D (mais plus blanche)
base	N88A-B (N78C au centre)	N88A à 93A (N78C au centre)	83C (N78C au centre)

* variétés de référence

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

Dénomination proposée : **'Nessie'** (voir la figure 18)
Numéro de la demande : 01-2678
Date de la demande : 2001/04/19
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Majoret', 'SW Capri' et 'SW Salute' (voir le tableau 43 à la page 139)

Sommaire : *La tige de 'Nessie' est plus courte que celle de 'SW Capri'. La gousse de 'Nessie' est plus courte que celles de 'Majoret' et 'SW Capri'. La courbure de la gousse est très faible à faible chez 'Nessie', tandis qu'elle est moyenne chez 'Majoret' et 'SW Capri'. La partie distale de la gousse est tronquée chez 'Nessie', tandis qu'elle est pointue chez 'Majoret'. Les cotylédons de 'Nessie' sont verts, tandis que ceux de 'SW Capri' et 'SW Salute' sont jaunes. Les graines de 'Nessie' sont moyennes à grosses, tandis que celles de 'SW Salute' sont petites à moyennes. Le poids de 1000 graines est plus élevé chez 'Nessie' que chez 'SW Capri' et 'SW Salute'. 'Nessie' et 'Majoret' sont sensibles au blanc* (Erysiphe polygoni), *tandis que 'SW Salute' y est résistante.*

Description : 'Nessie' est une variété de pois des champs semi-aphylle. La plante est verte à la floraison, et les tiges sont de longueur moyenne. Les stipules sont normales et maculées.

La floraison est hâtive à intermédiaire et donne une ou deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, avec une courbure concave faible à très faible. La partie distale des gousses est tronquée, et celles-ci contiennent en moyenne sept ovules. Les graines immatures sont vert pâle. À l'état sec, les graines sont moyennes à grosses, avec des cotylédons verts, et le hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses. 'Nessie' est sensible au blanc (*Erysiphe polygoni*).

Origine génétique : 'Nessie' a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement Majoret × Solara effectué en 1992 chez Svalöf Weibull AB, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_4. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la précocité, la rigidité de la tige, la couleur jaune et la qualité des vrilles. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange de graines de la génération F_5. La variété est maintenue par la Svalöf Weibull Ltd. à Saskatoon (Saskatchewan) et par la Svalöf Weibull AB à Svalöv, en

Suède.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés au cours des étés 2001 et 2002 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 1,75 m sur 3,25, renfermant 40 sujets par mètre carré

Dénomination proposée : **'SW Capri'** (voir la figure 20)
Numéro de la demande : 01-2679
Date de la demande : 2001/04/19
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Majoret', 'Carneval', 'Nessie' et 'SW Salute' (voir le tableau 43 à la page 139)

Sommaire : *La tige de 'SW Capri' est plus longue que celle de 'Nessie'. La floraison de 'SW Capri' est plus tardive que celle de 'SW Salute'. La gousse de 'SW Capri' est plus longue que celles de 'Nessie' et 'SW Salute'. La courbure de la gousse est moyenne chez 'SW Capri', tandis qu'elle est faible chez 'SW Salute', faible à très faible chez 'Nessie' et nulle ou très faible chez 'Carneval'. La partie distale de la gousse est tronquée chez 'SW Capri', tandis qu'elle est pointue chez 'Majoret'. 'SW Capri' a des cotylédons jaunes, tandis que 'Majoret' et 'Nessie' ont des cotylédons verts. Le poids de 1000 graines est plus faible chez 'SW Capri' que chez 'Majoret' et 'Nessie'. 'SW Capri' est sensible au blanc* (Erysiphe polygoni), *tandis que 'SW Salute' y est résistante.*

Description : 'SW Capri' est une variété de pois des champs semi-aphylle. La plante est verte à la floraison, et les tiges sont moyennes à longues. Les stipules sont normales et maculées.

La floraison est de précocité intermédiaire et donne une ou deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, avec une courbure concave moyenne. La partie distale des gousses est tronquée, et celles-ci contiennent en moyenne sept ovules. Les graines immatures sont vert pâle. À l'état sec, les graines sont de grosseur moyenne, avec des cotylédons jaunes, et le hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses. 'SW Capri' est sensible au blanc (*Erysiphe polygoni*).

Origine génétique : 'SW Capri' a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement Carneval × Sv 92536 effectué en 1992 chez Svalöf Weibull AB, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_4. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la précocité, la rigidité de la tige, la couleur jaune et la qualité des vrilles. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange de graines de la génération F_6. La variété est maintenue par la Svalöf Weibull Ltd. à Saskatoon (Saskatchewan) et par la Svalöf Weibull AB à Svalöv, en Suède.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés au cours des étés 2001 et 2002 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 1,75 m sur 3,25, renfermant 40 sujets par mètre carré.

Dénomination proposée : **'SW Salute'** (voir la figure 23)
Numéro de la demande : 01-2680
Date de la demande : 2001/04/19
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Majoret', 'Carneval', 'Highlight', 'Nessie' et 'SW Capri' (voir le tableau 43 à la page 139)

Sommaire : *La tige de 'SW Salute' est plus longue que celle de 'Highlight', mais plus courte que celle de 'Carneval'. 'SW Salute' a plus de nœuds sur la tige que 'Highlight'. Les stipules du deuxième nœud fertile sont plus courtes chez 'SW Salute' que chez 'Carneval'. La floraison est plus hâtive chez 'SW Salute' que chez 'Majoret', 'Carneval' et 'SW Capri'. La gousse de 'SW Salute' est plus courte que celles de 'Majoret', 'Carneval' et 'SW Capri'. La courbure de la gousse est faible chez 'SW Salute', tandis qu'elle est nulle ou très faible chez 'Carneval', et moyenne chez 'Majoret' et 'SW Capri'. La partie distale de la gousse est tronquée chez 'SW Salute', tandis qu'elle est pointue chez 'Majoret'. Les cotylédons de 'SW Salute' sont jaunes, tandis que ceux de 'Majoret' et 'Nessie' sont verts. Les graines de 'SW Salute' sont plus petites que celles de 'Majoret' et 'Nessie'. Le poids de 1000 graines est plus faible chez 'SW Salute' que chez 'Majoret' et 'Nessie'. 'SW Salute' est résistante au blanc* (Erysiphe polygoni), *tandis que 'Carneval' y est modérément sensible, et 'Majoret', 'Nessie' et 'SW Capri' y sont sensibles.*

Description : 'SW Salute' est une variété de pois des champs semi-aphylle. La plante est verte à la floraison, et les tiges sont de longueur moyenne. Les stipules sont normales et maculées.

La floraison est hâtive et donne deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, avec une faible courbure concave. La partie distale des gousses est tronquée, et celles-ci contiennent en moyenne sept ovules. Les graines immatures sont vert pâle. À l'état sec, les graines sont petites à moyennes, avec des cotylédons jaunes, et le hile n'est pas noir. Les grains

d'amidon sont lisses. 'SW Salute' est résistante au blanc (*Erysiphe polygoni*).

Origine génétique : 'SW Salute' a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement Highlight × Patriot effectué en 1990 chez Svalöf Weibull AB, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_4. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la précocité, la rigidité de la tige, la couleur jaune et la qualité des vrilles. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange de graines de la génération F_6. La variété est maintenue par la Svalöf Weibull Ltd. à Saskatoon (Saskatchewan) et par la Svalöf Weibull AB à Svalöv, en Suède.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés au cours des étés 2001 et 2002 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 1,75 m sur 3,25, renfermant 40 sujets par mètre carré.

Tableau 43 : Tableau de comparaison pouer 'Nessie', 'SW Capri' et 'SW Salute'

	'Nessie'a	**'SW Capri'**b	**'SW Salute'**c	**'Majoret'***abc	**'Carneval'***bc	**'Highlight'***c
Longueur de la tige (cm)						
moyenne	39,91	42,83	40,71	40,31	44,64	37,22
écart-type	6,68	8,72	9,36	7,80	9,69	7,77
Nombre de nœuds jusqu'au premier nœud fertile (y compris ce dernier)						
moyenne	15,4	16,6	16,2	16,3	16,6	14,8
écart-type	2,38	2,70	2,52	3,22	2,52	2,83
Longueur des stipules du deuxième nœud fertile (mm)						
moyenne	42,4	42,3	40,2	39,4	47,3	43,1
écart-type	11,01	12,64	14,95	10,38	10,79	9,66
Longueur de la gousse produite au deuxième nœud fertile (mm)						
moyenne	61,9	70,3	63,8	72,7	68,9	65,6
écart-type	8,04	6,04	5,98	6,71	6,59	5,52
Largeur de la gousse produite au deuxième nœud fertile (mm)						
moyenne	12,5	13,0	12,9	13,9	13,7	12,5
écart-type	1,48	1,09	1,29	0,86	1,15	1,55
Nombre d'ovules présents dans la gousse produite au deuxième nœud fertile						
moyenne	6,9	7,1	6,8	7,7	7,1	7,2
écart-type	1,03	0,88	1,09	1,14	0,90	0,95
Poids de 1000 graines (g)						
	266	205	210	255	220	205

* reference variety

Dénomination proposée : **'SW Belfield'** (voir la figure 25)
Numéro de la demande : 02-3022
Date de la demande : 2002/03/26
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Majoret' et 'Carneval' (voir le tableau 44 à la page 142)

Sommaire : *'SW Belfield' est une variété de pois des champs avec des stipules plus larges que celles de 'Majoret'. La gousse de 'SW Belfield' est plus courte que celles des variétés de référence. La partie distale de la gousse est tronquée chez 'SW Belfield', tandis qu'elle est pointue chez 'Majoret'. La courbure de la gousse est faible chez 'SW Belfield', tandis qu'elle est modérée chez 'Majoret' et absente ou très faible chez 'Carneval'. Les cotylédons de 'SW Belfield' sont jaunes, tandis que ceux de 'Majoret' sont verts. Les graines de 'SW Belfield' sont plus lourdes que celles de 'Carneval' et plus légères que celles de 'Majoret'. 'SW Belfield' est sensible au blanc* (Erysiphe polygoni), *tandis que 'Carneval' y est modérément sensible.*

Description : 'SW Belfield' est une variété de pois des champs semi-aphylle. La plante est verte à la floraison, et les tiges sont de longueur moyenne. Les stipules sont normales et maculées.

La floraison est hâtive à intermédiaire et donne une ou deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, avec une faible courbure concave. La partie distale des gousses est tronquée, et celles-ci contiennent en moyenne sept ovules. Les graines immatures sont vert pâle. À l'état sec, les graines sont de grosseur moyenne, avec des cotylédons verts, et le hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses. 'SW Belfield' est sensible au blanc (*Erysiphe polygoni*).

Origine génétique : 'SW Belfield' (désignation expérimentale SW 975514) a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement effectué en 1994 chez Svalöf Weibull AB, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_4. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la rigidité de la tige, la couleur de la graine et la précocité de maturation. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange des graines de la génération F_5. La variété est maintenue par la Svalöf Weibull Ltd. à Saskatoon (Saskatchewan) et par la Svalöf Weibull AB à Svalöv, en Suède.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés au cours des étés 2001 et 2002 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 1,75 m sur 3,25, renfermant 40 sujets par mètre carré.

Dénomination proposée : **'SW Prize'** (voir la figure 28)
Numéro de la demande : 02-3023
Date de la demande : 2002/03/26
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Majoret' et 'Carneval' (voir le tableau 44 à la page 142)

Sommaire : *'SW Prize' est une variété de pois des champs avec moins de nœuds par tige que les variétés de référence. Les stipules de 'SW Prize' sont plus grandes que celles de 'Majoret'. La floraison de 'SW Prize' est plus hâtive que celles des variétés de référence. La gousse de 'SW Prize' est plus courte que celles des variétés de référence. La partie distale de la gousse est tronquée chez 'SW Prize', tandis qu'elle est pointue chez 'Majoret'. La courbure de la gousse est faible chez 'SW Prize', tandis qu'elle est modérée chez 'Majoret' et est absente ou très faible chez 'Carneval'. Les cotylédons de 'SW Prize' sont jaunes, tandis que ceux de 'Majoret' sont verts. Les graines de 'SW Prize' sont plus grosses que celles de 'Carneval' et plus lourdes que celles des deux variétés de référence. 'SW Prize' est sensible au blanc* (Erysiphe polygoni), *tandis que 'Carneval' y est modérément sensible.*

Description : 'SW Prize' est une variété de pois des champs semi-aphylle. La plante est verte à la floraison, et les tiges sont de longueur moyenne. Les stipules sont normales et maculées.

La floraison est hâtive et donne une ou deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, avec une faible courbure concave. La partie distale des gousses est tronquée, et celles-ci contiennent en moyenne sept ovules. Les graines immatures sont vert pâle. À l'état sec, les graines sont moyennes à grosses, avec des cotylédons jaunes, et le hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses. 'SW Belfield' est sensible au blanc (*Erysiphe polygoni*).

Origine génétique : 'SW Prize' (désignation expérimentale SW 965210) a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement effectué en 1994 chez Svalöf Weibull AB, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_4. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la rigidité de la tige, la

conservation de la couleur verte et la précocité de maturation. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange des graines de la génération F_5. La variété est maintenue par la Svalöf Weibull Ltd. à Saskatoon (Saskatchewan) et par la Svalöf Weibull AB à Svalöv, en Suède.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés au cours des étés 2001 et 2002 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 1,75 m sur 3,25, renfermant 40 sujets par mètre carré.

Dénomination proposée : **'SW Circus'** (voir la figure 29)
Numéro de la demande : 02-3024
Date de la demande : 2002/03/26
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Ltd., Lindsay (Ontario)

Variétés de référence : 'Majoret' et 'Carneval' (voir le tableau 44 à la page 142)

Sommaire : *'SW Circus' est une variété de pois des champs avec des stipules plus petites que celles de 'Carneval' et des gousses plus petites que celles de 'Majoret'. La partie distale des gousses est tronquée chez 'SW Circus', tandis qu'elle est pointue chez 'Majoret'. La courbure des gousses est absente ou très faible chez 'SW Circus', tandis qu'elle est modérée chez 'Majoret'. Les cotylédons de 'SW Circus' sont jaunes, tandis que ceux de 'Majoret' sont verts. Les graines de 'SW Circus' sont plus lourdes que celles de 'Carneval' et plus légères que celles de 'Majoret'. 'SW Circus' est sensible au blanc* (Erysiphe polygoni), *tandis que 'Carneval' y est modérément sensible.*

Description : 'SW Circus' est une variété de pois des champs semi-aphylle. La plante est verte à la floraison, et les tiges sont de longueur moyenne. Les stipules sont normales et maculées. La floraison est hâtive à intermédiaire et donne une ou deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, sans courbure ou avec une très faible courbure concave. La partie distale des gousses est tronquée, et celles-ci contiennent en moyenne sept ovules. Les graines immatures sont vert pâle. À l'état sec, les graines sont de grosseur moyenne, avec des cotylédons jaunes, et le hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses. 'SW Circus' est sensible au blanc (*Erysiphe polygoni*).

Origine génétique : 'SW Circus' (désignation expérimentale SW 975504) a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement effectué en 1994 chez Svalöf Weibull AB, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_4. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la rigidité de la tige, la couleur jaune de la graine et la précocité de maturation. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange des graines de la génération F_5. La variété est maintenue par la Svalöf Weibull Ltd. à Saskatoon (Saskatchewan) et par la Svalöf Weibull AB à Svalöv, en Suède.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés au cours des étés 2001 et 2002 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient deux répétitions, en parcelles de 1,75 m sur 3,25, renfermant 40 sujets par mètre carré.

Tableau 44 : Tableau de comparaison pour 'SW Belfield', 'SW Prize' et 'SW Circus'

	'SW Belfield'	'SW Prize'	'SW Circus'	'Majoret'*	'Carneval'*
Nombre de nœuds jusqu'au premier nœud fertile (y compris ce dernier)					
moyenne	16,1	13,8	16,2	16,3	16,6
écart-type	2,57	1,87	2,53	3,22	2,52
Longueur des stipules du deuxième nœud fertile (mm)					
moyenne	45,7	47,6	39,6	39,4	47,3
écart-type	9,31	11,57	13,85	10,38	10,79
Largeur des stipules du deuxième nœud fertile (mm)					
moyenne	32,1	33,1	25,8	27,1	31,6
écart-type	8,04	10,58	5,34	5,93	9,23
Longueur de la gousse produite au deuxième nœud fertile (mm)					
moyenne	65,2	63,2	66,6	72,7	68,9
écart-type	5,37	5,92	7,33	6,71	6,59
Largeur de la gousse produite au deuxième nœud fertile (mm)					
moyenne	13,6	13,1	13,5	13,9	13,7
écart-type	1,48	1,28	1,20	0,86	1,15
Nombre d'ovules présents dans la gousse produite au deuxième nœud fertile					
moyenne	7,0	7,2	6,7	7,7	7,1
écart-type	0,58	0,97	1,21	1,14	0,90
Poids de 1000 graines (g)	240	260	250	255	220

* variété de référence

POMMIER (*Malus* Mill.)

Dénomination proposée : **'Hidala'** (voir la figure 1)
Nom commercial : Hillwell
Numéro de la demande : 95-556
Date de la demande : 1995/05/31
Requérants : John et Sue Hill, Hillwell Orchard, Hastings (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'Lochbuie Red Braeburn' et 'Braeburn'

Sommaire : *'Hidala' est une variété de pommier qui produit un gros fruit. Le diamètre du fruit est plus grand chez 'Hidala' que chez les variétés de référence. Le fruit de 'Hidala' est sphérique-conique, tandis que le fruit de 'Braeburn' est ellipsoïde-conique. Chez la variété candidate, le lavis rouge de la peau du fruit est plus important que chez 'Lochbuie Red Braeburn', et plus intense que chez 'Braeburn'. Chez 'Hidala', les sépales sont beaucoup plus longs que chez les deux variétés de référence. Le fruit se colore plus rapidement et se récolte légèrement plus tôt chez 'Hidala' que chez les variétés de référence. Chez la variété candidate, le taux de nouaison est beaucoup plus élevé que chez 'Lochbuie Red Braeburn', mais plus bas que chez 'Braeburn'.*

Description : 'Hidala' est un cultivar à pommes de dessert, qui donne un arbre à port dressé produisant surtout sur dards (lambourdes). Les rameaux d'un an sont fortement pubescents dans leur moitié supérieure; leur écorce est brun violacé, peu luisante, et porte un assez petit nombre de lenticelles, moyennes à grandes. Les yeux sont arrondis et appliqués; leur support est petit à moyen. En coupe transversale, les feuilles de l'extrémité du rameau sont concaves à plates; leur face supérieure est fortement pubescente, et leur face inférieure est vert-violet avec du violet sur les nervures et le pétiole. Les feuilles ne sont pas lobées. Quand elles sont entièrement développées, elles sont de taille moyenne et sont inclinées vers le sommet du rameau. Le bord des feuilles est crénelé; leur sommet est cuspidé; leur face supérieure est vert moyen à vert foncé et modérément luisante, et leur face inférieure est

fortement pubescente. Les stipules sont modérément grandes. La floraison est intermédiaire à tardive. Le bouton floral est violet rosâtre; son pédicelle est vert. Les fleurs sont simples. Les pétales sont chevauchants; leur face supérieure est violet rosâtre pâle et vire au blanc au fur et à mesure que la fleur avance en âge; leur face inférieure est violacée à blanche.

Le fruit est très gros, asymétrique, sphérique-conique, légèrement côtelé, faiblement à moyennement couronné au pôle distal. L'œil est ouvert, modérément grand. La cuvette de l'œil est modérément profonde, large. Les sépales sont longs et disjoints. Le pédoncule est long, d'épaisseur moyenne, et la cavité pédonculaire est large, modérément profonde. La surface du fruit est lisse, et la peau est modérément pruinée, peu cireuse, d'épaisseur moyenne. Le fruit, à pleine maturité, est jaune-vert, sans liège, avec un lavis plutôt important (couvrant environ 60 % de la surface), rouge brunâtre, formant une plage uniforme marquée d'une quantité modérée de stries. Les lenticelles sont de taille moyenne et sont moyennement distinctes. La chair de 'Hidala' est jaunâtre, juteuse, très ferme et modérément grossière. En coupe transversale, la limite du cœur est modérément distincte, et les loges carpellaires sont fermées. Le fruit parvient à maturité tard dans la saison, et le taux de nouaison est bon. À maturité, les pépins sont bruns et ont une forme normale. Le brunissement de la chair, dans l'heure suivant la coupe, est modérément fort. La teneur en sucres du jus est élevée.

Origine génétique : 'Hidala' est issue de la mutation d'un sujet 'Braeburn'. Découverte par les sélectionneurs en février 1981 dans le verger de Hastings, en Nouvelle-Zélande, la mutation touchait une seule branche, qui a été multipliée par écussonnage sur porte-greffe MM106 au verger des sélectionneurs.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Hidala' ont été effectués en 2002 par l'okanagan Plant Improvement Co. Ltd. (PICO) au Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Summerland (Colombie-Britannique). Ils ont porté sur 6 pommiers élevés sur porte greffe M7 et mis en terre en 1999. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 45: Tableau de comparaison pour 'Hidala' et 'Lochbuie Red Braeburn'

	'Hidala'	'Lochbuie Red Braeburn'	'Braeburn'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	90,5	95,4	91,1
écart-type	5,93	4,55	4,86
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	53,6	58,7	57,8
écart-type	2,41	3,89	3,43
Longueur du pétiole (mm)			
moyenne	23,6	24,8	24,5
écart-type	1,71	1,99	2,46
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	56,27	52,55	56,27
écart-type	8,20	6,89	8,20
Diamètre du fruit (mm)			
moyenne	87,22	80,29	80,05
Teneur du jus en sucres totaux (%)	13,2	14,6	13,2

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Sciglo'** (voir la figure 2)
Nom commercial : Southern Snap
Numéro de la demande : 96-928
Date de la demande : 1996/08/13
Requérants : The Horticulture & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'Spartan', 'Royal Gala' et 'Splendour'

Sommaire : *'Sciglo' est une variété de pommier dont le port est plus étalé que celui des variétés de référence. Chez la variété candidate, les fleurs s'épanouissent plus tard dans la saison que chez 'Spartan' et 'Royal Gala'. Chez 'Sciglo', le fruit a un diamètre beaucoup plus petit que chez 'Royal Gala' et 'Splendour'. Le couronnement au pôle distal est moins important chez 'Sciglo' que chez les variétés de référence. La cuvette de l'œil est plus profonde chez 'Sciglo' que chez 'Spartan' et 'Royal Gala'. Chez 'Sciglo', la peau du fruit présente un lavis rouge vif avec des stries d'un rouge plus foncé, tandis que chez 'Spartan' elle présente un lavis rouge violacé foncé ou rouge gris, et chez 'Royal Gala', un lavis rouge plus pâle. Chez 'Sciglo', le fruit parvient à maturité plus tôt dans la saison que chez les variétés de référence, jusqu'à une semaine avant 'Royal Gala' dans la vallée de l'Okanagan.*

Description : 'Sciglo' est un cultivar à pommes de dessert, qui donne un arbre étalé, aux branches abondantes, produisant surtout sur dards (lambourdes). Les rameaux d'un an sont

moyennement pubescents dans leur moitié supérieure; leur écorce est brun violacé, très luisante, et porte un nombre moyen de petites lenticelles. Les branches sont légèrement minces, et les entre-nœuds sont courts. Les yeux sont pointus et appliqués; leur support est petit. En coupe transversale, les feuilles de l'extrémité du rameau sont concaves; leur face supérieure est glabre, et leur face inférieure est vert-violet avec du violet au sommet et sur les bords. Les feuilles ne sont pas lobées. Quand elles sont entièrement développées, elles sont de taille moyenne. Les feuilles sont inclinées vers le sommet du rameau et légèrement décollées du rameau. Le bord des feuilles est crénelé; leur sommet est cuspidé; leur face supérieure est vert moyen et luisante, et leur face inférieure est fortement pubescente. Les nervures présentent une faible pigmentation anthocyanique. Le pétiole est court, et les stipules sont modérément grandes. Le débourrement printanier est hâtif, mais la pleine floraison est très tardive. Le bouton floral est rose moyen; son pédicelle est vert. Les fleurs sont simples et de diamètre moyen. Les pétales sont chevauchants; leur face supérieure est rose moyen et vire au blanc au fur et à mesure que la fleur avance en âge; leur face inférieure est rose violacé passant au blanc.

Le fruit est modérément gros, symétrique, sphérique, modérément côtelé, faiblement couronné au pôle distal. L'œil est semi-ouvert, modérément grand. La cuvette de l'œil est profonde et étroite. Les sépales sont modérément courts, tangents à leur base. Le pédoncule est de longueur et épaisseur moyennes, et la cavité pédonculaire est de largeur moyenne, assez peu profonde. La surface du fruit est lisse, et la peau est modérément pruinée, peu cireuse, d'épaisseur moyenne. Le fruit, à pleine maturité, est jaune avec un lavis très important (couvrant environ 85 % de la surface), rouge vif, formant une plage uniforme marquée de stries fines d'un rouge plus foncé. Le fruit de 'Sciglo' présente une quantité faible à moyenne de liège. Les lenticelles sont grandes, modérément distinctes. La chair du fruit est jaune crème, juteuse, ferme et grossière. En coupe transversale, la limite du cœur est fortement distincte, et les loges carpellaires sont ouvertes. Le fruit parvient à maturité à la mi-saison, entre le 13 et le 18 septembre à Summerland (Colombie-Britannique), et le taux de nouaison est bon. À maturité, les pépins sont brun foncé et ont une forme conique. Le brunissement de la chair, dans l'heure suivant la coupe, est modérément fort. La teneur en sucres du jus est très élevée.

Origine génétique : 'Sciglo' est issue d'une sélection réalisée en 1984 par la HortResearch à Havelock North (Nouvelle-Zélande) parmi une population de semis obtenus à partir d'un croisement entre 'Gala' et 'Splendour'. Cette sélection avait pour critères un fruit de couleur rouge vif, d'excellente qualité à la dégustation et résistant à l'entreposage de longue durée. La variété sélectionnée a été multipliée par voie végétative.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Sciglo' ont été effectués en 2002 par l'Okanagan Plant Improvement Co. Ltd. (PICO) au Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Summerland (Colombie-Britannique). Ils ont porté sur 6 pommiers élevés sur porte-greffe M26 et mis en terre en 1999. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 46 : Tableau de comparaison pour 'Sciglo'

	'Sciglo'	'Spartan'*	'Royal Gala'*	'Splendour'*
Longueur du pétiole (mm)				
moyenne	21,6	24,1	24,0	29,7
écart-type	2,80	1,60	2,91	1,25
Diamètre de la fleur (mm)				
moyenne	50,6	56,5	51,0	49,5
écart-type	3,05	7,54	5,65	3,54
Diamètre du fruit (mm)				
moyenne	76,9	79,1	81,2	90,9
Longueur du pédoncule du fruit (mm)				
moyenne	21,8	18,7	25,5	26,7
Teneur du jus en sucres totaux (%)				
	18,4	12,2	14,9	13,4

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Sciros'** (voir la figure 3)
Nom commercial : Pacific Rose
Numéro de la demande : 96-929
Date de la demande : 1996/08/13
Requérants : The Horticulture & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'Mutsu', 'Ambrosia' et 'Splendour'

Sommaire : *'Sciros' est un pommier vigoureux; sa floraison commence beaucoup plus tard dans la saison que la floraison de 'Ambrosia' et de 'Splendour'. Le fruit de 'Sciros' est sphérique, tandis que celui de 'Ambrosia' et de 'Splendour' est sphérique-conique. Chez 'Sciros', la peau du fruit est beaucoup plus pruinée et moins cireuse que chez 'Ambrosia'; de plus, elle est jaune crème avec un lavis rouge rosâtre plutôt important, tandis que chez 'Ambrosia', elle est jaune vif avec un lavis rouge d'importance moyenne. Chez 'Mutsu', la peau du fruit est jaune verdâtre avec un lavis très faible ou nul.*

Chez 'Splendour', le lavis est d'un rouge beaucoup plus foncé que chez la variété candidate. Le fruit de 'Sciros' parvient à maturité très tard dans la saison, environ deux semaines après le fruit de 'Ambrosia' dans la vallée de l'Okanagan.

Description : 'Sciros' est un cultivar à pommes de dessert, qui donne un arbre vigoureux, dressé à étalé, aux branches abondantes, produisant surtout sur dards (lambourdes). Les rameaux d'un an sont assez fortement pubescents dans leur moitié supérieure; leur écorce est brun violacé, modérément luisante, et porte un nombre moyen de petites lenticelles. Les branches sont légèrement minces, et les entre-nœuds sont courts. Les yeux sont pointus et appliqués; leur support est de taille moyenne. En coupe transversale, les feuilles de l'extrémité du rameau sont concaves à plates; leur face supérieure est faiblement pubescente, et leur face inférieure est vert-violet avec du violet sur les nervures et le pétiole. Les feuilles ne sont pas lobées. Quand elles sont entièrement développées, elles sont modérément grandes. Les feuilles sont inclinées vers le sommet du rameau et légèrement décollées du rameau. Le bord des feuilles est crénelé; leur sommet est acuminé; leur face supérieure est vert moyen à vert foncé et luisante, et leur face inférieure est modérément pubescente. Les nervures présentent une faible pigmentation anthocyanique. Le pétiole est de longueur moyenne, et les stipules sont modérément petites. Le débourrement printanier est intermédiaire à tardif, mais la pleine floraison est très tardive. Le bouton floral est blanc et violet; son pédicelle est vert. Les fleurs sont simples et de diamètre moyen. Les pétales sont chevauchants; leur face supérieure est rose pâle à rose moyen et vire au blanc au fur et à mesure que la fleur avance en âge; leur face inférieure est rose violacé passant au blanc.

Le fruit est très gros, symétrique, sphérique, modérément côtelé, assez fortement couronné au pôle distal. L'œil est ouvert, grand. La cuvette de l'œil est modérément profonde, large. Les sépales sont longs, disjoints. Le pédoncule est de longueur et d'épaisseur moyennes, et la cavité pédonculaire est de largeur et profondeur moyennes. La surface du fruit est lisse. Sa peau est pruinée, d'épaisseur moyenne; elle n'est pas cireuse. Le fruit, à pleine maturité, est jaune crème avec un lavis plutôt important (couvrant environ 65 % de la surface), rouge-rose vif, formant une plage uniforme. Le fruit de 'Sciros' présente une quantité faible de liège situé autour de la cuvette de l'œil et sur les joues. Les lenticelles sont grandes, très distinctes. La chair du fruit est jaune crème, juteuse, ferme et modérément fine. En coupe transversale, la limite du cœur est modérément distincte, et les loges carpellaires sont ouvertes. Le fruit parvient à maturité très tard dans la saison, à la fin octobre à Summerland (Colombie-Britannique), et le taux de nouaison est bon. À maturité, les pépins sont bruns et ont une forme conique. Le brunissement de la chair, dans l'heure suivant la coupe, est fort. La teneur en sucres du jus est élevée.

Origine génétique : 'Sciros' est issue d'une sélection réalisée en 1984 par la HortResearch à Havelock North (Nouvelle-Zélande) parmi une population de semis obtenus à partir d'un croisement entre 'Gala' et 'Splendour'. Cette sélection avait pour critères un fruit de couleur rouge vif, d'excellente qualité à la dégustation et résistant à l'entreposage de longue durée. La variété sélectionnée a été multipliée par voie végétative.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Sciros' ont été effectués en 2002 par l'Okanagan Plant Improvement Co. Ltd. (PICO) au Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Summerland (Colombie-Britannique). Ils ont porté sur 6 pommiers élevés sur porte-greffe M26 et mis en terre en 1999. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 47 : Tableau de comparaison pour 'Sciros'

	'Sciros'	'Ambrosia'*	'Splendour'*	'Mutsu'*
Longueur du pétiole (mm)				
moyenne	26,6	26,3	29,7	20,4
écart-type	2,59	2,00	1,25	1,43
Diamètre de la fleur (mm)				
moyenne	56,9	57,4	49,5	55,0
écart-type	5,09	3,69	3,54	4,11
Diamètre du fruit (mm)				
moyenne	92,4	82,8	90,9	94,8
Longueur du pédoncule du fruit (mm)				
moyenne	23,6	23,9	26,7	32,0
Teneur du jus en sucres totaux (%)				
	13,6	14,0	13,4	13,8

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Huaguan'** (voir la figure 4)
Numéro de la demande : 96-972
Date de la demande : 1996/11/27
Requérants : Professeur Wang Yu-Lin, Auckland (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'Spartan' et 'Fuji#2'

Sommaire : *'Huaguan' est une variété de pommier qui produit un arbre moins vigoureux et des fruits plus petits que 'Spartan' et 'Fuji#2'. Chez 'Huaguan', la cuvette de l'œil est plus étroite et moins profonde que chez 'Fuji#2', et la cavité*

pédonculaire est beaucoup plus étroite. La peau du fruit est moins pruinée chez 'Huaguan' que chez les variétés de référence. Chez 'Huaguan', le fond de la peau est jaune-vert, tandis que chez 'Spartan' et 'Fuji#2' il est vert. Le lavis est moins important chez 'Huaguan' que chez les variétés de référence. La variété candidate présente plus de liège que 'Spartan' et 'Fuji#2'. La chair de 'Huaguan' est jaunâtre, tandis que celle de 'Spartan' est blanche. La limite du coeur est moins distincte chez la variété candidate que chez 'Fuji#2'. 'Huaguan' parvient à maturité très tard dans la saison, jusqu'à un mois après 'Spartan' dans la vallée de l'Okanagan.

Description : 'Huaguan' est un cultivar à pommes de dessert, qui donne un arbre faiblement à modérément vigoureux, dressé à étalé, aux branches peu abondantes, produisant surtout sur dards (lambourdes). Les rameaux d'un an sont fortement pubescents dans leur moitié supérieure; leur écorce est brun foncé, modérément luisante, et porte un nombre élevé de petites lenticelles. Les branches sont légèrement minces, et les entre-nœuds sont courts. Les yeux sont pointus et appliqués; leur support est petit. En coupe transversale, les feuilles de l'extrémité du rameau sont concaves; leur face supérieure est glabre, et leur face inférieure est verte, sans autre couleur. Les feuilles ne sont pas lobées. Quand elles sont entièrement développées, elles sont modérément petites et sont inclinées vers le sommet du rameau. Le bord des feuilles est denté en scie; leur sommet est cuspidé; leur face supérieure est vert moyen à vert foncé et peu luisante, et leur face inférieure est modérément pubescente. Les nervures présentent une faible pigmentation anthocyanique. Le pétiole est modérément long, et les stipules sont de taille moyenne. Le débourrement printanier est de précocité intermédiaire, et la floraison commence modérément tard dans la saison. Le bouton floral est violet-rouge; son pédicelle est vert. Les fleurs sont simples et de diamètre moyen. Les pétales sont chevauchants; leur face supérieure est rose violacé pâle à rose violacé moyen et vire au blanc au fur et à mesure que la fleur avance en âge; leur face inférieure est violet-rouge passant au blanc.

Le fruit est de grosseur moyenne, symétrique, sphérique-conique à sphérique-conique court, faiblement couronné au pôle distal. Il n'est pas côtelé. L'œil est fermé, petit. La cuvette de l'œil est modérément profonde, étroite. Les sépales sont modérément courts, chevauchants. Le pédoncule est de longueur et épaisseur moyennes, et la cavité pédonculaire est étroite, assez peu profonde. La surface du fruit est lisse. Sa peau est modérément pruinée et modérément épaisse; elle n'est pas cireuse. Le fruit, à pleine maturité, est jaune-vert avec un lavis d'importance moyenne (couvrant environ 65 % de la surface), rouge, formant une plage uniforme marquée de mouchetures. Le fruit présente une quantité faible de liège situé autour de la cuvette de l'œil, autour de la cavité pédonculaire et sur les joues. Les lenticelles sont de taille moyenne, peu distinctes. La chair du fruit est jaunâtre, juteuse, ferme et modérément fine. En coupe transversale, la limite du cœur est modérément distincte, et les loges carpellaires sont fermées. Le fruit parvient à maturité très tard dans la saison, de la mi-octobre à la fin octobre à Summerland (Colombie-Britannique), et le taux de nouaison est intermédiaire. À maturité, les pépins sont brun foncé et ont une forme conique. Le brunissement de la chair, dans l'heure suivant la coupe, est faible. La teneur en sucres du jus est très élevée.

Origine génétique : 'Huaguan' est issue d'un croisement entre 'Golden Delicious' (parent femelle) et 'Fuji' (parent mâle) effectué par le sélectionneur pendant le printemps 1976 au Zenghou Fruit Research Institute. L'automne suivant, les graines ont été récoltées puis mises en terre pour donner naissance à une population destinée à la sélection de nouveaux cultivars. Un semis a été sélectionné parmi cette population pour ses fruits attrayants, gros, à la chair croquante, au goût agréable et résistants à l'entreposage de longue durée : on lui a donné le nom de 'Huaguan'.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Huaguan' ont été effectués en 2002 par l'okanagan Plant Improvement Co. Ltd. (PICO) au Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Summerland (Colombie-Britannique). Ils ont porté sur 5 pommiers élevés sur porte-greffe M26 et mis en terre au printemps 2000. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

Tableau 48 : Tableau de comparaison pour 'Huaguan'

	'Huaguan'	'Spartan'*	'Fuji#2'*
Longueur des entre-nœuds sur les rameaux d'un an (mm)			
moyenne	17,5	28,1	40,1
écart-type	4,53	8,97	7,10
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	75,4	81,8	92,6
écart-type	7,37	3,12	8,28
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	49,6	64,2	69,4
écart-type	3,78	3,16	13,53
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	47,5	56,5	46,6
écart-type	5,58	7,54	10,23
Diamètre du fruit (mm)			
moyenne	67,5	79,1	82,4
Teneur du jus en sucres totaux (%)	17,4	12,2	14,4

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Lochbuie Red Braeburn'** (voir la figure 1)
Numéro de la demande : 97-1084
Date de la demande : 1997/05/30
Requérants : William Turner, Lochbuie Orchard, Christchurch (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'Hidala' et 'Braebrun' (voir le tableau 45 à la page 143)

Sommaire : *'Lochbuie Red Braeburn' est une variété de pommier qui produit un fruit sphérique conique, comme 'Hidala', alors que 'Braeburn' donne un fruit ellipsoïde conique. Lorsque cultivée dans la vallée de l'Okanagan, la variété candidate produit un fruit présentant un lavis beaucoup moins important que celui du fruit de 'Hidala' ou 'Braeburn'. Chez 'Lochbuie Red Braeburn', le lavis est moins intense que chez 'Hidala', dont le fruit présente un lavis rouge foncé à rouge brunâtre, et que chez 'Braeburn', au fruit arborant un lavis rouge-rose à rouge vif. Le fruit de 'Lochbuie Red Braeburn' ne se colore pas aussi rapidement que celui de 'Hidala'. Chez la variété candidate, le fruit parvient à maturité plus tard que chez 'Hidala'.*

Description : 'Lochbuie Red Braeburn' est un cultivar à pommes de dessert, qui donne un arbre modérément vigoureux, à port dressé, produisant surtout sur dards (lambourdes). Les rameaux d'un an sont fortement pubescents dans leur moitié supérieure; leur écorce est brun violacé, peu luisante, et porte un nombre moyen de lenticelles modérément grandes. Les yeux sont arrondis et appliqués; leur support est petit à moyen. En coupe transversale, les feuilles de l'extrémité du rameau sont concaves à plates; leur face supérieure est fortement pubescente, et leur face inférieure est vert-violet avec du violet sur les nervures et le pétiole. Les feuilles ne sont pas lobées. Quand elles sont entièrement développées, elles sont de taille moyenne et sont inclinées vers le sommet du rameau. Le bord des feuilles est crénelé; leur sommet est cuspidé; leur face supérieure est vert moyen à vert foncé et modérément luisante, et leur face inférieure est très fortement pubescente. Les stipules sont modérément grandes. La floraison est intermédiaire à tardive. Le bouton floral est rose foncé et blanc; son pédicelle est vert. Les fleurs sont simples. Les pétales sont tangents; leur face supérieure est blanche; leur face inférieure est violacée à blanche.

Le fruit est gros, asymétrique, sphérique-conique, légèrement côtelé, faiblement à moyennement couronné au pôle distal. L'œil est ouvert, modérément grand. La cuvette de l'œil est profonde et large. Les sépales sont de longueur moyenne et disjoints. Le pédoncule est modérément court, d'épaisseur moyenne, et la cavité pédonculaire est assez peu profonde, large. La surface du fruit est lisse. Sa peau est modérément pruinée, peu cireuse, d'épaisseur moyenne. Le fruit, à pleine maturité, est jaune-vert, sans liège, avec un lavis peu important à moyen (couvrant environ 48 % de la surface), rouge-orange à rouge brunâtre, formant une plage uniforme délavée, avec des stries peu marquées et très minces. Les lenticelles sont de taille moyenne et moyennement distinctes. La chair du fruit est jaunâtre, juteuse, très ferme et modérément grossière. En coupe transversale, la limite du coeur est modérément distincte, et les loges carpellaires sont fermées. Les fruits parviennent à maturité très tard dans la saison, et le taux de nouaison est médiocre à intermédiaire. À maturité, les pépins sont bruns et ont une forme normale. Le brunissement de la chair, dans l'heure suivant la coupe, est modérément fort. La teneur en sucres du jus est très élevée.

Origine génétique : 'Lochbuie Red Braeburn' est issue d'une mutation découverte en 1985 sur un pommier greffé avec la variété 'Braeburn' dans le verger de l'exploitant, près de Christchurch (Nouvelle-Zélande). Deux branches de la greffe 'Braeburn' donnaient des pommes nettement plus rouges que les fruits normalement produits par la variété 'Braeburn'. Des greffons prélevés sur ces branches ont été utilisés pour élever 27 nouveaux sujets sur porte-greffe MM106. Tous les arbres ont produit des fruits très colorés. On a eu recours à ces sujets pour se procurer du bois de greffe aux fins de l'amélioration ultérieure de la variété.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Lochbuie Red Braeburn' ont été effectués en 2002 par l'Okanagan Plant Improvement Co. Ltd. (PICO) au Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Summerland (Colombie-Britannique). Ils ont porté sur 5 pommiers élevés sur porte-greffe M7 et mis en terre en 1999. Les caractères quantitatifs sont fondés sur au moins 10 mesures.

ROSIER
(*Rosa hybrida*)

Dénomination proposée : **'POULra016'** (voir la figure 30)
Nom commercial : Sterling Parade
Numéro de la demande : 01-2790
Date de la demande : 2001/07/19
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULhappy'

Sommaire : *Chez 'POULra016', le jeune rameau est faiblement anthocyané, tandis que chez 'POULhappy' il n'est pas anthocyané. La foliole terminale et l'ensemble de la feuille sont plus grands chez 'POULra016' que chez 'POULhappy'. La variété candidate fleurit plus tard et produit moins de fleurs par rameau florifère que la variété de référence. Chez 'POULra016', la fleur est de couleur légèrement plus foncée que chez 'POULhappy'.*

Description : 'POULra016' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige porte des aiguillons courts et des aiguillons longs, clairsemés, de forme linéaire, blancs avec du rouge brunâtre vers la base. Les feuilles sont vert pâle à vert moyen; le lustre de leur face supérieure est nul ou très faible. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est mince et souple, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison commence à la mi-saison et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre peu élevé de poils ou d'aiguillons. Le bouton floral est pointu. Les sépales sont faiblement à moyennement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est arrondie à irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie, et sa base, aplatie à convexe aplatie. Le centre de la fleur est normal; la corolle est double, rouge foncé. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont petites à moyennes. Le bord des pétales présente une courbure moyenne à forte et une faible ondulation. Le filet des étamines extérieures est blanc avec du rose bleuâtre. Les styles sont vert pâle avec du rose bleuâtre, longs et glabres sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés plus haut que les anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir et dépourvu d'aiguillons. La fleur est inodore.

Origine génétique : 'POULra016' est issue d'un croisement réalisé en 1998 entre un semis non identifié et 'POULsabel' (Isabel Hit), à Fredensborg (Danemark).

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu en janvier 2002 à Waterdown (Ontario) et ont porté sur 6 plantes par variété, cultivées en pots de 15 cm. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 49 : Tableau de comparaison pour 'POULra016'

	'POULra016'	'POULhappy'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	98,67	70,60
écart-type	12,11	3,32
Largeur de la feuille (mm)		
moyenne	59,5	40,5
écart-type	3,94	2,92
Longueur de la foliole terminale (mm)		
moyenne	40,83	30,70
écart-type	6,15	2,31
Largeur de la foliole terminale (mm)		
moyenne	22,67	15,90
écart-type	3,56	1,37
Couleur générale de la fleur (RHS)	45A	46B
Couleur de la face externe des pétales (RHS)		
marge	46A	46B
centre	46A	46B
base	157D	155A
Couleur de la face interne des pétales (RHS)		
marge	45A	46B
centre	45A	46B
base	157D	155A

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULhi005'** (voir la figure 31)
Nom commercial : Valentina Hit
Numéro de la demande : 01-2794
Date de la demande : 2001/07/25
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'POULypso' et 'POULrolyt'

Sommaire : *Chez 'POULhi005', le jeune rameau est plus*

fortement anthocyané que chez les variétés de référence. La feuille est plus longue et plus large chez la variété candidate que chez les variétés de référence. Chez 'POULhi005', le diamètre de la fleur est plus grand que chez 'POULrolyt'. La corolle de la variété candidate est double, tandis que celle de 'POULrolyt' est très doublée. Chez 'POULhi005', la fleur est d'un rouge plus pâle que chez 'POULypso' et est d'un rouge moins orangé que chez 'POULrolyt'.

Description : 'POULhi005' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente une pigmentation anthocyanique moyenne à forte, bronze. La tige porte des aiguillons courts et des aiguillons longs, clairsemés, de forme linéaire, presque blancs. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé; le lustre de leur face supérieure est moyen à fort. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est coriace, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse à arrondie.

La floraison commence à la mi-saison et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre peu élevé de glandes stipitées. Le bouton floral est ovoïde. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie, et sa base, concave à aplatie. Le centre de la fleur est normal; la corolle est double, rouge moyen à rouge foncé. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont petites à moyennes. Le bord des pétales présente une courbure faible à moyenne et une ondulation très faible à faible. Le filet des étamines extérieures est jaune. Les styles sont vert-jaune, longs, glabres ou très faiblement pubescents sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés plus haut que les anthères. Le réceptacle est moyen à grand, piriforme; il porte un petit nombre de glandes stipitées et d'aiguillons rudimentaires. La fleur a un parfum faible à moyen de thé.

Origine génétique : 'POULhi005' est issue d'un croisement réalisé en 1998 entre un semis non identifié et 'POULsabel' (Isabel Hit), à Fredensborg (Danemark).

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu en janvier 2002 à Waterdown (Ontario) et ont porté sur 6 plantes par variété, cultivées en pots de 15 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 50 : Tableau de comparaison pour 'POULhi005'

	'POULhi005'	'POULypso'*	'POULrolyt'*
Longueur de la feuille (mm)			
moyenne	99,17	75,00	85,33
écart-type	13,57	4,20	9,20
Largeur de la feuille (mm)			
moyenne	76,67	50,33	54,50
écart-type	10,80	5,32	4,64
Longueur de la foliole terminale (mm)			
moyenne	49,83	30,33	35,67
écart-type	6,71	4,80	5,13
Largeur de la foliole terminale (mm)			
moyenne	29,33	18,00	20,50
écart-type	4,50	1,26	1,22
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	46B	46A	34A
face supérieure	46B	46A	34A
face inférieure	57A/46A	46A	42B
Couleur générale de la fleur (RHS)	46B	46A	44B
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	44A	46A	44D
centre	46B	46A	44C
base	157A	157D	157A
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	53C	46A/44A	43B
centre	53B	46A/44A	43A
base	157A	157D	157A
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	45,50	45,00	36,33
écart-type	4,09	4,47	3,83

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULhi008'** (voir la figure 32)
Nom commercial : Tiffany Hit
Numéro de la demande : 01-2796
Date de la demande : 2001/07/25
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption sera autorisée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.
Variété de référence : 'POULhilda'

Sommaire : *La feuille de 'POULhi008' est plus courte que celle de 'POULhilda'. Chez la variété candidate, la fleur est*

d'un rose rougeâtre plus foncé que chez 'POULhilda', et les taches basales des faces interne et externe des pétales sont plus grandes. Chez 'POULhi008', le bord des pétales présente une courbure plus forte que chez la variété de référence.

Description : 'POULhi008' est un rosier miniature à port buissonnant. Le jeune rameau présente une faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige est dépourvue d'aiguillons. Les feuilles sont vert foncé; le lustre de leur face supérieure est moyen à fort. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est coriace à rugueuse, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse à arrondie.

La floraison commence à la mi-saison et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre moyen de glandes stipitées. Le bouton floral est ovoïde. Les sépales sont non appendiculés à faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie, et sa base, aplatie. Le centre de la fleur est plié à normal; la corolle est très doublée, rose rougeâtre pâle. Les taches basales de la face externe des pétales sont petites à moyennes, et celles de la face interne des pétales sont moyennes. Le bord des pétales présente une courbure moyenne à forte et une ondulation faible. Le filet des étamines extérieures est jaune. Les styles sont longs, glabres sur leur moitié supérieure, blancs à vert-jaune, avec une coloration rougeâtre au pôle distal. Les stigmates sont placés légèrement plus haut que les anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir et dépourvu d'aiguillons. La fleur a un parfum fruité faible à moyen.

Origine génétique : 'POULhi008' est issue d'un croisement réalisé en 1998 entre 'Patricia Kordana' et 'POULsabel' (Isabel Hit), à Fredensborg (Danemark).

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu en janvier 2002 à Waterdown (Ontario) et ont porté sur 6 plantes par variété, cultivées en pots de 15 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 51 : Tableau de comparaison pour 'POULhi008'

	'POULhi008'	'POULhilda'*
Longueur de la feuille (mm)		
moyenne	78,0	95,0
écart-type	4,60	8,37
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)		
à l'ouverture	51A/B	36D
face supérieure	52C	39C/D (marge) 157D (centre)
face inférieure	52C	39C/D (marge) 157D (centre)
Couleur générale de la fleur (RHS)	52D	38C-39C
Couleur de la face externe des pétales (RHS)		
marge	52D	36C
centre	52C	36D
base	3C	157A
Couleur de la face interne des pétales (RHS)		
marge	49B	36C
centre	49B	36D
base	4C	157A
Diamètre de la fleur (mm)		
moyenne	54,33	48,00
écart-type	3,88	2,45

* variété de référence

Dénomination proposée : **'POULra017'** (voir la figure 33)
Nom commercial : Blanca Parade®
Numéro de la demande : 02-3195
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULra015' (Denise Parade®) et 'POULra022' (Camilla Parade®)

Sommaire : *'POULra017' est un rosier pour culture en pots. Chez 'POULra017', la fleur comporte plus de pétales que chez 'POULra015', mais moins que chez 'POULra022'. De plus, chez la variété candidate, le diamètre de la fleur est plus petit que chez 'POULra022'. La corolle de 'POULra017' est blanc crème jaunâtre, tandis que celle de 'POULra015' est orange-jaune pâle, et celle de 'POULra022', presque blanche.*

Description : 'POULra017' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente, uniquement sur le bord des folioles et le dessous des feuilles, une très faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige est dépourvue d'aiguillons. Les feuilles sont vert pâle; le lustre de leur face supérieure est faible à moyen. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est mince et souple,

son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre moyen d'aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est aplatie à convexe aplatie, et sa base, convexe aplatie à convexe. Le centre de la fleur est normal; la corolle est très doublée, blanc jaunâtre. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont très petites. Le bord des pétales présente une courbure et une ondulation faibles. Le filet des étamines extérieures est vert jaunâtre. Les styles sont blanc verdâtre, courts et faiblement pubescents sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir et dépourvu d'aiguillons. La fleur est inodore.

Origine génétique : 'POULra017' est issue d'une mutation découverte chez un sujet 'POULra002' au début de 1997 dans les serres du sélectionneur, à Fredensborg (Danemark). Le sujet mutant a été sélectionné au printemps 1998 et multiplié à des fins d'évaluation.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 52 : Tableau de comparaison pour 'POULra017'

	'POULra017'	'POULra015'*	'POULra022'*
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	33,0	30,5	50,5
écart-type	2,68	5,50	2,66
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	158A/157C	27C	155D
face supérieure	158A	27D	155D
face inférieure	158B	27C	155D
Couleur générale de la fleur (RHS)	158A/159A	27D/18D/15D	155D/159C
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	158B	27D	155D
centre	158B	15D	155D
base	2C-D	151C	1D
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	158B	27D	155D
centre	158B	15D-18D	155D
base	2B	151C	1D

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULra018'** (voir la figure 34)
Nom commercial : Chic Parade®
Numéro de la demande : 02-3196
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULra014' (Julie Parade®), 'POULra004' (Claudia Parade®) et 'POULra021' (Lady Parade®) (voir le tableau 54 à la page 154)

Sommaire : *'POULra018' est un rosier pour culture en pots. La corolle de 'POULra018' est d'un rose saumon plus foncé que celle de 'POULra014' et que celle de 'POULra004'. Chez la variété candidate, la corolle est moins rose (plus saumon) que chez 'POULra021'.*

Description : 'POULra018' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau est très faiblement anthocyané ou ne l'est pas du tout. La tige est dépourvue d'aiguillons. Les feuilles sont vert pâle; leur face supérieure est mate (non lustrée). Les feuilles comptent cinq ou sept folioles. La foliole terminale est mince et souple, son bord est finement denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre peu élevé à moyen d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est aplatie à convexe aplatie, et sa base, convexe aplatie à convexe. Le centre de la fleur est normal; la corolle est double à très doublée, rose pâle. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont très petites. Le bord des pétales présente une courbure moyenne à forte et une faible ondulation. Le bord des pétales situés le plus à l'extérieur est doublement recourbé. Le filet des étamines extérieures est vert jaunâtre. Les styles sont blanc verdâtre, longs, faiblement à moyennement pubescents sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés plus haut que les anthères. Le réceptacle est petit à moyen, en forme d'entonnoir et dépourvu

d'aiguillons. Le parfum de la fleur est modérément faible.

Origine génétique : 'POULra018' est issue de la mutation d'un sujet de la variété 'POULra002', créée par la Poulsen Roser ApS. La mutation a été découverte au début de 1997 dans les serres du sélectionneur, à Fredensborg (Danemark). Le sujet mutant a été sélectionné au printemps 1998 et multiplié à des fins d'évaluation.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Dénomination proposée : **'POULra019'** (voir la figure 35)
Nom commercial : Leonie Parade®
Numéro de la demande : 02-3197
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULhappy' (Charming Parade®) et 'POULesta' (Fiesta Parade®)

Sommaire : *'POULra019' est un rosier pour culture en pots. Chez 'POULra019', le rameau florifère porte un plus petit nombre de fleurs que chez 'POULhappy'. La corolle de la variété candidate est violet-rouge à rouge, tandis que celle de 'POULhappy' est plus rouge, et celle de 'POULesta', rose foncé.*

Description : 'POULra019' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente une très faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige est dépourvue d'aiguillons. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé; leur face supérieure est modérément lustrée. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est modérément coriace, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre peu élevé à moyen de poils et de glandes stipitées. Le bouton floral est ovoïde. Les sépales sont faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est arrondie à irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure et sa base sont convexes aplaties. Le centre de la fleur est normal; la corolle est très doublée, rouge moyen. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont petites. Le bord des pétales présente une courbure et une ondulation modérées. Le bord de certains des pétales situés le plus à l'extérieur est doublement recourbé. Le filet des étamines extérieures est blanc verdâtre. Les styles sont blanc verdâtre, de longueur moyenne, faiblement pubescents sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés au niveau des anthères ou légèrement plus haut qu'elles. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir et dépourvu d'aiguillons. Le parfum de la fleur est très faible à faible.

Origine génétique : 'POULra019' est issue d'une mutation découverte chez un sujet 'POULra002' au début de 1998 dans les serres du sélectionneur, à Fredensborg (Danemark). Le sujet mutant a été sélectionné au printemps 1998 et multiplié à des fins d'évaluation.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 53 : Tableau de comparaison pour 'POULra019'

	'POULra019'	'POULhappy'*	'POULesta'*
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	60B	46B	57A-58A
face supérieure	46A-60A	46B	57A-58A
face inférieure	61B	46B	50B
Couleur générale de la fleur (RHS)	46A-60B	46B	57A-58A
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	53A/63A	46B	58B
centre	53A/63A	46B	58B
base	155D/6D	155A	4A
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	53B-C	46B	57A/58A
centre	53B-C	46B	57A/58A
base	155D/6D	155A	4A

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULra021'** (voir la figure 36)
Nom commercial : Lady Parade®
Numéro de la demande : 02-3198
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)

Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULra014' (Julie Parade®), 'POULra018' (Chic Parade®) et 'POULra004' (Claudia Parade®)

Sommaire : *'POULra021' est un rosier pour culture en pots. La corolle de la variété candidate est plus rose que celle des variétés de référence. La tige de 'POULra021' est dépourvue d'aiguillons, tandis que celle de 'POULra014' et celle de 'POULra004' portent des aiguillons brun rouge, de forme linéaire. Chez 'POULra021', le jeune rameau est beaucoup moins anthocyané que chez 'POULra014' et 'POULra004'.*

Description : 'POULra021' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente une très faible pigmentation anthocyanique brun rougeâtre. La tige est dépourvue d'aiguillons. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé; leur face supérieure est peu lustrée (semi-mate). Les feuilles comptent cinq ou sept folioles. La foliole terminale est mince et souple, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

styles sont courts, très faiblement pubescents sur leur moitié supérieure. La base des styles est blanc verdâtre, et leur partie supérieure est violet-gris. Les stigmates sont placés au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir et dépourvu d'aiguillons. Le parfum de la fleur est faible.

Origine génétique : 'POULra021' est issue d'un croisement contrôlé entre 'Patricia Kordana' et 'POULsabel' réalisé durant l'été 1998, à Fredensborg (Danemark). Au printemps 2000, les semis ont été sélectionnés et multipliés à des fins d'évaluation.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 54 : Tableau de comparaison pour 'POULra018' et 'POUL021'

	'POULra018'	'POULra021'	'POULra014'*	'POULra004'*
Longueur de la feuille (mm)				
moyenne	69,5	65,5	87,2	72,2
écart-type	4,42	4,09	11,14	5,78
Largeur de la feuille (mm)				
moyenne	41,7	47,8	52,8	48,7
écart-type	2,88	4,49	4,75	2,50
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)				
à l'ouverture	29C-D	48C/194A-195B	37B/168A/168C	169C-D/138B-C
face supérieure	26D	49B	37C	36A/49C
face inférieure	26D	48C	37B-C/29C	36A/19B-C
Couleur générale de la fleur (RHS)	36B	49B-C	49B	49B-C/27B-C
Couleur de la face externe des pétales (RHS)				
marge	36B-C	49A-B	65A-B	27C
centre	36A	49A-B	65A-B	27B
base	7C	157C	157C/49D	15D
Couleur de la face interne des pétales (RHS)				
marge	36B-C	49B-C	36B	27A
centre	36A	49B-C	36A	27B/19C
base	7D	157C	157A	15C

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULra022'** (voir la figure 37)
Nom commercial : Camilla Parade®
Numéro de la demande : 02-3199
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULra015' (Denise Parade®) et 'POULra017' (Blanca Parade®)

Sommaire : *'POULra022' est un rosier pour culture en pots. Chez la variété candidate, la corolle est blanche, tandis que chez les variétés de référence elle est blanc jaunâtre. Chez 'POULra022', les fleurs sont plus grandes et comportent beaucoup plus de pétales que chez les variétés de référence.*

Description : 'POULra022' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente, uniquement sur le bord des folioles et des sépales ainsi que le dessous des feuilles, une pigmentation anthocyanique faible à modérée, brun rougeâtre. La tige porte des aiguillons courts, presque blancs, de forme linéaire, modérément clairsemés. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé; leur face supérieure est modérément lustrée. Les feuilles comptent trois ou cinq folioles. La foliole terminale est modérément épaisse, coriace, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre moyen à élevé d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde. Les sépales sont très faiblement à faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est arrondie à irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie, et sa base, concave. Le centre de la fleur est plié à normal; la corolle est très doublée, blanche. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont très petites. Le bord des pétales présente une courbure modérée à forte et une ondulation modérée. Le filet des étamines extérieures est blanc verdâtre. Les styles sont blanc verdâtre, modérément longs, glabres sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés plus haut que les anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir large et dépourvu d'aiguillons. Le parfum de la fleur est faible.

Origine génétique : 'POULra022' est issue d'un croisement contrôlé entre 'Patricia Kordana' et 'POULache' réalisé durant l'été 1999, à Fredensborg (Danemark). Au printemps 2000, les semis ont été sélectionnés et multipliés à des fins d'évaluation. 'POULra022' est issue d'un semis sélectionné parmi cette population.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 55 : Tableau de comparaison pour 'POULra022'

	'POULra022'	'POULra017'*	'POULra015'*
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	50,5	33,0	30,5
écart-type	2,66	2,68	5,50
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	155D	158A/157C	27C
face supérieure	155D	158A	27D
face inférieure	155D	158B	27C
Couleur générale de la fleur (RHS)	155D/159C	158A/159A	27D/18D/ 15D
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	155D	158B	27D
centre	155D	158B	15D
base	1D	2C-D	151C
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	155D	158B	27D
centre	155D	158B	15D-18D
base	1D	2B	151C

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULhi012'** (voir la figure 38)
Nom commercial : Jolanda Hit®
Numéro de la demande : 02-3200
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULdel' (Pure Hit®) et 'POULac003' (Dream Palace®)

Sommaire : *La corolle de 'POULhi012' est plus blanche que celle de 'POULdel', qui présente une teinte jaune pâle. Les feuilles de la variété candidate sont plus grandes que celles de 'POULdel'. Chez 'POULhi012', les styles sont blanc cassé à roses, tandis qu'ils sont rouges chez 'POULdel'. Chez la variété candidate, la corolle n'est pas de la même couleur que chez 'POULac003'.*

Description : 'POULhi012' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente, uniquement sur le dessous des nouvelles folioles, une pigmentation anthocyanique très faible à faible, brun rougeâtre. La tige porte des aiguillons courts, clairsemés, de forme linéaire, presque blancs. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé; leur face supérieure est modérément lustrée. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est mince et souple, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre peu élevé d'aiguillons. Le bouton floral est ovoïde à globulaire. Les sépales sont très faiblement à faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est arrondie à irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie, et sa base, concave. Le centre de la fleur est normal; la corolle est très doublée, blanche. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont petites. Le bord des pétales présente une courbure modérée à forte et une faible ondulation. Le filet des étamines extérieures est jaune. Les styles sont courts, blanc verdâtre, glabres sur leur moitié supérieure. Les stigmates sont placés au niveau des anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir large et dépourvu d'aiguillons. Le parfum de la fleur est très faible.

Origine génétique : 'POULhi012' est issue d'un croisement contrôlé entre 'Patricia Kordana' et 'POULache' réalisé durant l'été 1999, à Fredensborg (Danemark). Au printemps 2000, les semis ont été sélectionnés et multipliés à des fins d'évaluation. 'POULhi012' est un issue d'un semis sélectionné parmi cette population.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 56: Tableau de comparaison pour 'POULhi0122'

	'POULhi012'	'POULdel'*	'POULac003'*
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	157C	2D	1C et 3C
face supérieure	157C	2D	8B
face inférieure	157C	2D	10B

Couleur générale de la fleur (RHS)			
	155A	2D	8C avec 19C-D
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	155A	4D	8C-D
centre	155D	4D	8B-C
base	10D	4D	S/O
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	155A	2D	8C-D
centre	155A - 10D	2D	8B-C
base	10D	4D	8B

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULac003'** (voir la figure 39)
Nom commercial : Dream Palace®
Numéro de la demande : 02-3201
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variétés de référence : 'POULrent' (Laurent Hit®) et 'POULhi012' (Jolanda Hit®)

Sommaire : *'POULac003 est un rosier pour culture en pots. La corolle de la variété candidate est d'un jaune plus pâle que celle de 'POULrent', mais d'un jaune plus foncé que celle de 'POULhi012', qui est presque blanche. La fleur de 'POULac003' comporte beaucoup plus de pétales que celle de 'POULrent'. Les styles de 'POULac003' sont roses, tandis que ceux de 'POULrent' sont rouges.*

Description : 'POULac003' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente, uniquement sur le dessous des nouvelles folioles, une pigmentation anthocyanique très faible, brun rougeâtre. La tige porte des aiguillons courts, clairsemés, de forme linéaire, presque blancs. Les feuilles sont vert moyen à vert foncé; l ur face supérieure est modérément lustrée. Les feuilles comptent trois à sept folioles. La foliole terminale est mince et souple, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre élevé d'aiguillons et de glandes stipitées. Le bouton floral est ovoïde à pointu. Les sépales sont très faiblement à faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie à convexe, et sa base, concave. Le centre de la fleur est plié à normal; la corolle est très doublée, jaune pâle à jaune moyen. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont très petites. Le bord des pétales présente une courbure modérée à forte et une ondulation modérée. Le bord des pétales situés le plus à l'extérieur est doublement recourbé. Le filet des étamines extérieures est vert-jaune. Les styles sont longs, glabres sur leur moitié supérieure. La base des styles est rose; leur partie supérieure est blanc verdâtre. Les stigmates sont placés beaucoup plus haut que les anthères. Le réceptacle est de grosseur moyenne, en forme d'entonnoir large et dépourvu d'aiguillons. Le parfum de la fleur est faible à modéré.

Origine génétique : 'POULac003' est issue d'un croisement contrôlé entre deux semis non identifiés réalisé durant le printemps 1995, à Fredensborg (Danemark). Les graines, mises en terre en décembre 1995, ont germé pendant l'hiver et au début du printemps suivant. Au printemps 1996, les semis ont été sélectionnés et multipliés à des fins d'évaluation. 'POULac003' est issue d'un semis sélectionné parmi cette population.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 57 : Tableau de comparaison pour 'POULac003'

	'POULac003'	'POULrent'*	'POULhi012'*
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	1C & 3C	6D	157C
face supérieure	8B	6D	157C
face inférieure	10B	6D	157C
Couleur générale de la fleur (RHS)			
	8C avec 19C-D	6D	155A
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	8C-D	3D	155A
centre	8B-C	5C	155D
base	S/O	6B	10D
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	8C-D	3D	155A
centre	8B-C	5C	155A - 10D
base	8B	6B	10D

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'POULty003'** (voir la figure 40)
Nom commercial : Cerise Party®
Numéro de la demande : 02-3202
Date de la demande : 2002/07/30
Requérant : Poulsen Roser ApS, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman, Barbacki, Moreau, Montréal (Québec)

Variété de référence : 'POULtre' (Joy Party®) et 'POULfuna' (Fun Parade®)

Sommaire : *'POULty003 est un rosier pour culture en pots. La corolle de la variété candidate n'est pas de la même couleur que celle de 'POULtre'. La corolle de 'POULty003' n'est pas de la même couleur ni du même type que celle de 'POULfuna'. Chez 'POULty003', les fleurs et les feuilles sont plus grandes que chez 'POULfuna', et les fleurs comportent beaucoup moins de pétales.*

Description : 'POULty003' est un rosier miniature à port dressé-buissonnant. Le jeune rameau présente, uniquement sur le bord des feuilles les plus jeunes, une pigmentation anthocyanique très faible, brun rougeâtre. La tige est dépourvue d'aiguillons. Les feuilles sont vert pâle; leur face supérieure est faiblement à moyennement lustrée. Les feuilles comptent trois ou cinq folioles. La foliole terminale est coriace, son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison est hâtive et se poursuit presque continuellement pendant plus de dix semaines. Le rameau florifère produit un petit nombre de fleurs. Le pédicelle porte un nombre moyen d'aiguillons. Le bouton floral est pointu à ovoïde. Les sépales sont assez faiblement appendiculés. Vue de dessus, la fleur est irrégulièrement arrondie; vue de côté, sa partie supérieure et sa base sont convexes aplaties. Le centre de la fleur est normal; la corolle est demi-double, rose foncé. Les pétales sont grands. Les taches basales de leur face externe sont petites; celles de leur face interne sont moyennes. Le bord des pétales présente une courbure faible à moyenne et une faible ondulation. Le filet des étamines extérieures est vert pâle. Les styles sont longs, faiblement pubescents sur leur moitié supérieure. La base des styles est blanc verdâtre; leur partie supérieure est rouge. Les stigmates sont placés plus haut que les anthères. Le réceptacle est petit, en forme d'entonnoir large et dépourvu d'aiguillons. Le parfum de la fleur est très faible.

Origine génétique : 'POULty003' est issue d'un croisement entre 'POULpeacy' et 'POULnys' réalisé durant l'été 1998, à Fredensborg (Danemark). Au printemps 1999, les semis ont été sélectionnés et multipliés à des fins d'évaluation. 'POULty003' est issue d'un semis sélectionné parmi cette population.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont eu lieu pendant l'été 2002 à Burlington (Ontario) et ont porté sur 8 plantes par variété, cultivées en pots de 10 cm. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 6 mesures. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 1995.

Tableau 58 : Tableau de comparaison pour 'POULty003'

	'POULty003'	'POULtre'*	'POULfuna'*
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	43.0	29.2	28.7
écart-type	4.47	1.64	1.21
Couleur du bouton floral (au quart ouvert) (RHS)			
à l'ouverture	58A/59D	65C	53D
face supérieure	57C	65B	53D
face inférieure	58B	65C	53D
Couleur générale de la fleur (RHS)			
	58B	65C	66A
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	58C	65B	66C
centre	58B	65C	66C
base	1D	1D	11D
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	58B/C	65B	66A
centre	58B	65C	66A
base	157A	1D	3C

* variétés de référence

SOJA
(*Glycine max* L. Merrill)

Dénomination proposée : **'Rodeo'**
Dénomination antérieurement proposée : **'OT99-4'**
Numéro de la demande : 01-2558
Date de la demande : 2001/03/09
Requérant : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'OAC Clinton' et 'PS44'

Sommaire : *'Rodeo' donne une plante plus courte et des graines plus légères que 'PS44'. Les graines de 'Rodeo' sont plus riches en protéines et en huile que celles des deux variétés de référence.*

Description : 'Rodeo' est une variété de soja oléagineux. L'hypocotyle est violet. Le génotype confère à la plante une croissance terminale indéterminée. La pubescence de la plante est brune. Les fleurs sont violettes. La gousse mûre est brune. Les graines sont allongées aplaties. Leur tégument est jaune et mat. Le hile est jaune délavé, et les cotylédons de la graine mûre sont jaunes. La plante a une bonne résistance à la verse.

Origine génétique : 'Rodeo' a été mise au point à partir d'un croisement Maple Arrow/PI 361088B//3 * Maple Glen/3/AC Harmony. Le dernier croisement a été effectué en 1991 au Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Ottawa (Ontario). Une sélection généalogique a été effectuée jusqu'à la génération F_5. À la génération F_5, les graines des rangs sélectionnés ont été mises en mélange en vue d'une évaluation des générations suivantes. 'Rodeo' a été mise à l'essai sous la désignation expérimentale X3519-4-5-2, à Ottawa, en 1996 et 1997, et sous la désignation OT99-4, dans six localités d'Ontario et du Québec, en 1998. La variété a été soumise a des essais d'enregistrement privés en Ontario et au Québec, en 1999, et à des essais d'enregistrement publics, en 2000.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Rodeo' ont été menés à la Ferme expérimentale centrale d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Ottawa (Ontario), en 2001 et 2002. Les essais comportaient quatre rangs par répétition et quatre répétitions par variété.

Tableau 59 : Tableau de comparaison pour 'Rodeo'

	'Rodeo'	'OAC Clinton'*	'PS 44'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	67	67	71
écart-type	2,2	2,2	2,2
Unités thermiques de croissance	2550	2550	2700
Poids de 100 graines (g)	15,1	15,4	17,2
Teneur en protéines (%)	41,1	39,6	40,1
Teneur en huile (%)	24,6	23,3	23,6

* variétés de référence

Dénomination proposée : **'Dundas'** (voir la figure 41)
Dénomination antérieurement proposée : **'OT99-5'**
Numéro de la demande : 01-2559
Date de la demande : 2001/03/09
Requérant : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)

Variétés de référence : 'OAC Bayfield' et 'AC 2001'

Sommaire : *L'hypocotyle de 'Dundas' est vert, tandis que ceux des variétés de référence sont violets. 'Dundas' donne une plante plus courte que 'AC 2001'. Ses fleurs sont blanches, tandis que celles des variétés de référence sont violettes. Le hile est d'un brun plus pâle chez 'OT99-5' que chez les variétés de référence. Les graines de 'OT99-5' sont plus riches en protéines que celles de 'AC 2001'.*

Description : 'Dundas' est une variété de soja oléagineux. L'hypocotyle est vert. Le génotype confère à la plante une croissance terminale indéterminée. La pubescence de la plante est brune. Les fleurs sont blanches. La gousse mûre est brune. Les graines sont sphériques aplaties. Leur tégument est jaune et mat. Le hile est brun pâle, et les cotylédons des graines mûres sont jaunes. La plante a une bonne résistance à la verse.

Origine génétique : 'Dundas' a été mise au point à partir d'un croisement Maple Arrow/PI 361088B//3 * Maple Glen/3/AC Harmony. Le dernier croisement a été effectué en 1991 au Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Ottawa (Ontario). Une sélection généalogique a été effectuée jusqu'à la génération F_5. À la génération F_5, les graines des rangs sélectionnés ont été mises en mélange en vue d'une évaluation des générations suivantes. 'Dundas' a été mise à l'essai sous la désignation expérimentale X3519-63-5-4, à Ottawa, en 1996 et 1997, et sous la désignation OT99-5, dans six localités d'Ontario et du Québec, en 1998. La variété a été soumise a des essais d'enregistrement privés en Ontario et au Québec, en 1999, et à des essais d'enregistrement publics, en 2000.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Dundas' ont été menés à la Ferme expérimentale centrale d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Ottawa (Ontario), en 2001 et 2002. Les essais comportaient quatre rangs par répétition et quatre répétitions par variété.

Tableau 60 : Tableau de comparaison pour 'Dundas'

	'Dundas'	'OAC Bayfield'*	'AC 2001'*
Hauteur de la plante (cm)			
moyenne	67	70	83
écart-type	2,04	2,04	2,04

Unités thermiques de croissance	2750	2650	2750
Poids de 100 graines (g)	17,1	17,3	16,3
Teneur en protéines (%)	40,3	40,1	37,9
Teneur en huile (%)	23,5	23,6	24,8

° variétés de référence

Dénomination proposée : **'Ustie'**
Numéro de la demande : 02-3261
Date de la demande : 2002/09/05
Requérant : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan), et Lyle Morrison & Partners, comté de Norfolk (Angleterre)
Mandataire au Canada : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan)
Sélectionneur : Ukraine Institute of Agriculture, Kiev (Ukraine)

Variété de référence : 'Gentleman'

Sommaire : *La floraison de 'Ustie' est plus hâtive que celle de 'Gentleman'. La croissance de la plante est déterminée chez 'Ustie', tandis que chez 'Gentleman' la croissance est semi-déterminée. Chez 'Ustie', la plante est plus dressée que chez la variété de référence. Les gousses de 'Ustie' sont brunes, tandis que celles de 'Gentleman' sont havane. Les graines de 'Ustie' sont sphériques aplaties, tandis que celles de 'Gentleman' sont allongées aplaties.*

Description : 'Ustie' est une variété de soja oléagineux. L'hypocotyle est violet. Les feuilles sont vert moyen et comportent 3 folioles. La foliole terminale est petite et ovée. La feuille a une texture intermédiaire entre lisse et plissée et présente une pubescence modérée demi-apprimée.

Les fleurs sont violettes. Le génotype confère à la plante une croissance terminale déterminée. La plante a un port dressé. La plante est sensible à la photopériode. La pubescence de la plante est brune au stade de la gousse mi-remplie, et la gousse mûre est brune. Les graines sont sphériques aplaties. Leur tégument est jaune luisant. Le hile est brun et de taille moyenne. Les cotylédons des graines mûres sont jaunes. La plante a une bonne résistance à l'égrenage précoce et à la verse.

Origine génétique : 'Ustie' a été mise au point à partir d'un croisement 'Belosnezhka' × 'Zhemchyzhna' effectué à l'Institut d'agriculture d'Ukraine, à Kiev, en Ukraine, en 1986. La sélection finale a été effectuée en 1994, et la variété a été mise à l'essai de 1996 à 1998. Des essais gouvernementaux ont été effectués de 1999 à 2001, en Ukraine, où la variété a été enregistrée en 2002 pour la production de semences.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Ustie' ont été menés à Qu'Appelle (Saskatchewan), en 2001 et 2002. Les essais comportaient quatre répétitions par variété, en parcelles de 10 m sur 1,5.

Dénomination proposée : **'Kievskaya98'**
Numéro de la demande : 02-3262
Date de la demande : 2002/09/05
Requérant : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan), et Lyle Morrison & Partners, comté de Norfolk (Angleterre)
Mandataire au Canada : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan)
Sélectionneur : Ukraine Institute of Agriculture, Kiev (Ukraine)

Variété de référence : 'Gentleman'

Sommaire : *'Kievskaya98' fleurit plus tard et mûrit un peu plus tard que 'Gentleman'. 'Kievskaya98' donne une plante plus haute que 'Gentleman'. Les gousses de 'Kievskaya98' sont brun foncé, tandis que celles de 'Gentleman' sont havane. Les graines de 'Kievskaya98' sont sphériques aplaties, tandis que celles de 'Gentleman' sont allongées aplaties.*

Description : 'Kievskaya98' est une variété de soja oléagineux. L'hypocotyle est violet. Les feuilles sont vert moyen et comportent trois folioles. La foliole terminale est petite et ovée. La feuille a une texture intermédiaire entre lisse et plissée et présente une pubescence modérée demi-apprimée.

Les fleurs sont violettes. Le génotype confère à la plante une croissance terminale semi-déterminée. La plante a un port dressé. La plante est sensible à la photopériode. La pubescence de la plante est brune au stade de la gousse mi-remplie, et la gousse mûre est brun foncé. Les graines sont sphériques aplaties. Leur tégument est jaune luisant. Le hile est brun et de taille moyenne. Les cotylédons des graines mûres sont jaunes. La plante a une bonne résistance à l'égrenage précoce et à la verse.

Origine génétique : 'Kievskaya98' a été mise au point à

partir d'un croisement 'Iskra' × '421968-7613' effectué à l'Institut d'agriculture d'Ukraine, à Kiev, en Ukraine, en 1984. La sélection finale a été effectuée en 1992. 'Kievskaya98' a été mise à l'essai de 1995 à 1997. Des essais gouvernementaux ont été effectués en 1998 et 1999 en Ukraine, où la variété a été enregistrée en 2001 pour la production de semences.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Kievskaya98' ont été menés à Qu'Appelle (Saskatchewan), en 2001 et 2002. Les essais comportaient quatre répétitions par variété, en parcelles de 10 m sur 1,5.

Dénomination proposée : **'Chernyatka'**
Numéro de la demande : 02-3263
Date de la demande : 2002/09/05
Requérant : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan), et Lyle Morrison & Partners, comté de Norfolk (Angleterre)
Mandataire au Canada : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan)
Sélectionneur : Ukraine Institute of Agriculture, Kiev (Ukraine)

Variété de référence : 'Gentleman'

Sommaire : *'Chernyatka' donne une plante un peu plus haute que 'Gentleman'. Les feuilles sont d'un vert plus pâle chez 'Chernyatka' que chez 'Gentleman', et leur foliole terminale est plus grande. La pubescence des gousses est grise chez 'Chernyatka', tandis qu'elle est brune (fauve) chez 'Gentleman'. 'Chernyatka' parvient à maturité plus tard que 'Gentleman', et le poids de ses graines est plus élevé.*

Description : 'Chernyatka' est une variété de soja oléagineux. L'hypocotyle est violet. Les feuilles sont vert pâle à vert moyen et comportent trois folioles. La foliole terminale est de taille moyenne et ovée. La feuille a une texture intermédiare entre lisse et plissée et présente une pubescence modérée demi-apprimée.

Les fleurs sont violettes. Le génotype confère à la plante une croissance terminale déterminée. La plante a un port dressé. La plante est sensible à la photopériode. La pubescence de la plante est grise au stade de la gousse mi-remplie, et la gousse mûre est havane. Les graines sont allongées aplaties. Leur tégument est jaune luisant. Le hile est brun et de taille moyenne. Les cotylédons des graines mûres sont jaunes. La plante présente une résistance passable à l'égrenage précoce et une bonne résistance et à la verse.

Origine génétique : 'Chernyatka' a été mise au point à partir d'un croisement 'Chayka' × '4/75' (variété de Suède), effectué à l'Institut d'agriculture d'Ukraine, à Kiev, en Ukraine, en 1981. La sélection finale a été effectuée en 1985. 'Chernyatka' a été mise à l'essai de 1991 à 1994. Des essais gouvernementaux ont été effectués de 1995 à 1997 en Ukraine, où la variété a été enregistrée en 1998 pour la production de semences.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Chernyatka' ont été menés à Qu'Appelle (Saskatchewan), en 2001 et 2002. Les essais comportaient quatre répétitions par variété, en parcelles de 10 m sur 1,5.

Dénomination proposée : **'Giessen'**
Numéro de la demande : 02-3264
Date de la demande : 2002/09/05
Requérant : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan), et Plant Breeding Institute, Giessen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Terramax Holdings Corp., Qu'Appelle (Saskatchewan)
Sélectionneur : Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung, Giessen (Allemagne)

Variété de référence : 'Gentleman'

Sommaire : *La floraison de 'Giessen' est plus hâtive que celle de 'Gentleman'. La foliole terminale est lancéolée chez 'Giessen', tandis qu'elle est ovée chez 'Gentleman'. La pubescence de la plante est grise chez 'Giessen', tandis qu'elle est brune chez 'Gentleman'. 'Giessen' est indifférente à la photopériode, tandis que 'Gentleman' y est sensible. Le hile de 'Giessen' est jaune, tandis que celui de 'Gentleman' est brun.*

Description : 'Giessen' est une variété de soja oléagineux. L'hypocotyle est violet. Les feuilles sont vert moyen et comportent trois folioles. La foliole terminale est petite et lancéolée. La feuille a une texture intermédiaire entre lisse et plissée et présente une pubescence modérée demi-apprimée.

Les fleurs sont violettes. Le génotype confère à la plante une croissance terminale semi-déterminée. La plante a un port semi-dressé. La plante n'est pas sensible à la photopériode. La pubescence de la plante est grise au stade de la gousse mi-remplie, et la gousse mûre est brune. Les graines sont allongées aplaties. Leur tégument est jaune luisant. Le hile est jaune et de taille moyenne. Les cotylédons des graines mûres sont jaunes. La plante a une bonne résistance à l'égrenage

précoce et à la verse.

Origine génétique : 'Giessen' a été mise au point à partir d'un croisement 'GG51' × 'GG24', effectué à la Station d'amélioration végétale Gross-Gerau, en 1964. La généalogie des lignées parentales ne peut être retracée, outre le fait qu'elles proviennent d'une vaste collection de matériel prélevé parmi les races locales du nord-est de l'Asie de 1935 à 1940. La variété a été cultivée et sélectionnée pour son uniformité, son rendement élevé et sa précocité jusqu'à ce qu'elle devienne homogène et stable. En 1994, la Terramax Holding Corporation a obtenu de l'Université de Giessen la permission de multiplier la variété et de l'utiliser pour des croisements.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Giessen' ont été menés à Qu'Appelle (Saskatchewan), en 2001 et 2002. Les essais comportaient quatre répétitions par variété, en parcelles de 10 m sur 1,5.

16. DEMANDES ABANDONNÉES

BOUVARDIE
(*Bouvardia* species Salisb.)

➤ **Requérant :** Bouvardiakwekerij de Jong vof, Roelofarendsveen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1675
Date de la demande : 1999/05/20
Date d'abandon : 2002/12/09
Dénomination proposée : **'Green Spring'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 99-1574
Date de la demande : 1999/03/22
Date d'abandon : 2002/12/09
Dénomination proposée : **'295 BX'**

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 99-1577
Date de la demande : 1999/03/22
Date d'abandon : 2002/12/09
Dénomination proposée : **'Cartier BX'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Requérant :** W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1080
Date de la demande : 1997/05/23
Date d'abandon : 2002/12/09
Dénomination proposée : **'KORamvis'**

17. DEMANDES RETIRÉES

BARBON À BALAIS
(*Schizachyrium scoparium* (Michx.) Nash.)

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 00-2198
Date de la demande : 2000/04/07
Date du retrait : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'Taylor'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Requérant :** Virginia Tech Intellectual Properties, Inc., Blacksburg, Virginie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Ridgetown College, University of Guelph, Ridgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2822
Date de la demande : 2001/09/21
Date du retrait : 2003/05/21
Dénomination proposée : **'Sisson'**

BOUTELOU GRACIEUX
(*Bouteloua gracilis* (H.B.K.) Lag. ex Steud.)

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Ducks Unlimited Canada, Brandon (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2807
Date de la demande : 2001/08/07
Date du retrait : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'BG-MB'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1015
Date de la demande : 1997/04/07
Date du retrait : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'NS2177'**

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 99-1575
Date de la demande : 1999/03/22
Date du retrait : 2003/04/08
Dénomination proposée : **'Armor BX'**

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 99-1576
Date de la demande : 1999/03/22
Date du retrait : 2003/04/08
Dénomination proposée : **'Zodiac BX'**

➤ **Requérant :** DSV Canada Inc., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 00-2203
Date de la demande : 2000/04/14
Date du retrait : 2003/04/24
Dénomination proposée : **'445RR'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3468
Date de la demande : 2003/02/07
Date du retrait : 2003/04/30
Dénomination proposée : **'NR00-1301'**

ÉPEAUTRE
(*Triticum spelta* L.)

➤ **Requérant :** Pflanzenzucht Oberlimpurg, Schwaebisch Hall (Allemagne)
Mandataire au Canada : Torys LLP, Toronto (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1821
Date de la demande : 1999/10/18
Date du retrait : 2003/06/03
Dénomination proposée : **'Franckenkorn'**

FLÉOLE
(*Phleum pratense* L.)

➤ **Requérant :** Hokuren, The Federation of Agricultural Co-operative Societies of Hokkaido, Sapporo (Japon)
Mandataire au Canada : General Feed & Grain, Inc., Creston (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 99-1566
Date de la demande : 1999/03/08
Date du retrait : 2003/03/04
Dénomination proposée : **'Aurora'**

HELIPTÉRUM
(*Helipterum anthemoides* (Spreng.) DC.)

➤ **Requérant :** Esma Salkin, Mt. Waverley, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2002
Date de la demande : 1999/12/20
Date du retrait : 2003/03/28
Dénomination proposée : **'Paper Cascade'**

➤ **Requérant :** Plant Growers Australia Pty. Ltd., Wonga Park, Victoria (Australie)
Numéro de la demande : 99-2003
Date de la demande : 1999/12/20
Date du retrait : 2003/03/28
Dénomination proposée : **'Paper Star'**
Synonyme : APS 91/B1

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkeri* W. Bull.)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1844
Date de la demande : 1999/11/05
Date du retrait : 2003/05/05
Dénomination proposée : **'Ovation Hot Red'**
Nom commercial : Ovation Deep Orange

KOELÉRIE À CRÊTES
(*Koeleria macrantha* (Ledeb.) J.A. Schultes)

➤ **Requérant :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Ducks Unlimited Canada, Brandon (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2806
Date de la demande : 2001/08/07
Date du retrait : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'PG-MB'**

➤ **Requérant :** Native Plant Solutions, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 02-3114
Date de la demande : 2002/06/14
Date du retrait : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'Battle River'**

LIN
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Requérant :** United Grain Growers Ltd., Morden (Manitoba)
Numéro de la demande : 00-2155
Date de la demande : 2000/03/22
Date du retrait : 2003/04/25
Dénomination proposée : **'2021'**

MUFLIER
(*Antirrhinum* L.)

➤ **Requérant :** A.T. Yates & Son, Cheshire (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2144
Date de la demande : 2000/03/03
Date du retrait : 2003/04/17
Dénomination proposée : **'Yapear'**
Nom commercial : Chandelier Pearl

NÉMÉSIE
(*Nemesia* species Venten.)

➤ **Requérant :** Christopher & Martin Tellwright, Bognor Regis, West Sussex (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2141
Date de la demande : 2000/03/03
Date du retrait : 2003/04/17
Dénomination proposée : **'Fleuron'**
Nom commercial : Melanie
Nom commercial : Lavender Sachet

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 02-3014
Date de la demande : 2002/03/12
Date du retrait : 2003/03/19
Dénomination proposée : **'TR169'**

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 02-3015
Date de la demande : 2002/03/12
Date du retrait : 2003/03/19
Dénomination proposée : **'BT483'**

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1957
Date de la demande : 1999/12/15
Date du retrait : 2003/04/02
Dénomination proposée : **'Sunny Ingrid'**
Nom commercial : Ingrid

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1958
Date de la demande : 1999/12/15
Date du retrait : 2003/04/02
Dénomination proposée : **'Sunny Silvia'**
Nom commercial : Silvia

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1959
Date de la demande : 1999/12/15
Date du retrait : 2003/04/02
Dénomination proposée : **'Sunny Sonja'**
Nom commercial : Sonja

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2583
Date de la demande : 2001/03/20
Date du retrait : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Akvarza'**

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2585
Date de la demande : 2001/03/20
Date du retrait : 2003/05/06
Dénomination proposée : **'Akvarlu'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2934
Date de la demande : 2001/12/11
Date du retrait : 2003/04/14
Dénomination proposée : **'KLEP01002'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2936
Date de la demande : 2001/12/11
Date du retrait : 2003/04/14
Dénomination proposée : **'KLEP01028'**
Nom commercial : Royal[MD] Candy Cane

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2927
Date de la demande : 2001/12/11
Date du retrait : 2003/04/14
Dénomination proposée : **'KLEW01066'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Requérant :** Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1101
Date de la demande : 1997/07/22
Date du retrait : 2003/03/31
Dénomination proposée : **'TANiliram'**

➤ **Requérant :** Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1192
Date de la demande : 1997/12/03
Date du retrait : 2003/05/05
Dénomination proposée : **'TANafira'**

➤ **Requérant :** W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1258
Date de la demande : 1998/03/11
Date du retrait : 2003/03/24
Dénomination proposée : **'KORlauka'**

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :** Hyland Seeds, Div. of W.G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 97-1150
Date de la demande : 1997/09/16
Date du retrait : 2003/04/28
Dénomination proposée : **'Starburst'**

STIPE VERTE
(*Nassella viridula* (Trin.) Barkworth)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Brandon (Manitoba)
Numéro de la demande : 02-3109
Date de la demande : 2002/05/31
Date du retrait : 2003/05/22
Dénomination proposée : **'Mallard'**

SUTÉRA
(*Sutera* Roth.)

➤ **Requérant :** A.T. Yates & Son, Cheshire (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2147
Date de la demande : 2000/03/03
Date du retrait : 2003/04/17
Dénomination proposée : **'Yagepin'**
Nom commercial : Penny Candy Pink

VERVEINE
(*Verbena hybrida* Hort. ex Groenl. & Rumpler)

➤ **Requérant :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro de la demande : 00-2172
Date de la demande : 2000/03/23
Date du retrait : 2003/05/02
Dénomination proposée : **'Balazrepi'**
Nom commercial : Aztec[MD] Rose Pink Improved

18. CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

AVOINE
(*Avena sativa* L.)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg, (Manitoba)
Numéro de la demande : 02-3108
Date de la demande : 2002/05/27
Dénomination antérieurement proposée : **'OT2009'**
Dénomination proposée : **'Furlong'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 02-3345
Date de la demande : 2002/10/28
Dénomination antérieurement proposée : **'BW758'**
Dénomination proposée : **'CDC Imagine'**

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3377
Date de la demande : 2002/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Cal Blu'**
Dénomination proposée : **'Cal Bule'**
Nom commercial : Callie Blue

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Monsanto Canada Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 01-2671
Date de la demande : 2001/04/17
Dénomination antérieurement proposée : **'PR6044'**
Dénomination proposée : **'33-95'**

➤ **Requérant :** Advanta Canada Inc., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 02-3057
Date de la demande : 2002/04/23
Dénomination antérieurement proposée : **'S9018'**
Dénomination proposée : **'292CL'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3065
Date de la demande : 2002/04/26
Dénomination antérieurement proposée : **'NS4571'**
Dénomination proposée : **'43A56'**

ÉCHINACÉE
(*Echinacea purpurea* (L.) Moench)

➤ **Requérant :** Norseco Inc., Laval (Québec)
Numéro de la demande : 99-1775
Date de la demande : 1999/08/31
Dénomination antérieurement proposée : **'Miss Nathalie'**
Dénomination proposée : **'Normisnat'**
Nom commercial : Miss Nathalie

HARICOT
(*Phaseolus vulgaris* L.)

➤ **Requérant :** Hyland Seeds, Division of W.G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3221
Date de la demande : 2002/08/22
Dénomination antérieurement proposée : **'T9803'**
Dénomination proposée : **'Cirrus'**

IMPATIENTE
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 02-2969
Date de la demande : 2002/01/14
Dénomination antérieurement proposée : **'Fisguincoma 1'**
Dénomination proposée : **'Fisvision'**
Nom commercial : Vision Yellow

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 02-3013
Date de la demande : 2002/03/11
Dénomination antérieurement proposée : **'Cebeco 1489'**
Dénomination proposée : **'Topeka'**

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Requérant :** A.S. Heijboer, Kloelinge (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Solanum International Inc., Edmonton (Alberta)
Numéro de la demande : 01-2874
Date de la demande : 2001/11/16
Dénomination antérieurement proposée : **'Baby Spud'**
Dénomination proposée : **'Baby Boomer'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta)
Numéro de la demande : 02-2988
Date de la demande : 2002/02/08
Dénomination antérieurement proposée : **'V0168-3'**
Dénomination proposée : **'Pacific Russet'**

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2558
Date de la demande : 2001/03/09
Dénomination antérieurement proposée : **'OT99-4'**
Dénomination proposée : **'Rodeo'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2559
Date de la demande : 2001/03/09
Dénomination antérieurement proposée : **'OT99-5'**
Dénomination proposée : **'Dundas'**

➤ **Requérant :** Hyland Seeds, Division of W.G. Thompson & Sons Ltd., Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3222
Date de la demande : 2002/08/22
Dénomination antérieurement proposée : **'T9910'**
Dénomination proposée : **'Quincy'**

VERVEINE
(*Verbena hybrida* Hort. ex Groenl. & Rumpler)

➤ **Requérant :** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3276
Date de la demande : 2002/09/30
Dénomination antérieurement proposée : **'Bodcombureye'**
Dénomination proposée : **'Bodcomburgeye'**
Nom commercial : Napoleon Burgundy Eye

19. RENONCIATION AU CERTIFICAT D'OBTENTION

ANGÉLONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro du certificat : 0952
Date de délivrance : 2001/05/23
Date de la renonciation : 2003/05/07
Dénomination approuvée : **'Balangdeum'**
Nom commercial : AngelMist ᴹᴰ Deep Plum

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Titulaire :** Bayer CropScience, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 0953
Date de délivrance : 2001/05/24
Date de la renonciation : 2003/05/26
Dénomination approuvée : **'PPS97-238'**

➤ **Titulaire :** Bayer CropScience, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 0954
Date de délivrance : 2001/05/24
Date de la renonciation : 2003/05/26
Dénomination approuvée : **'PPS97-251'**

CHRYSANTHÈME
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0751
Date de délivrance : 2000/05/18
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Yolafayette'**
Synonyme : Lafayette

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0753
Date de délivrance : 2000/05/18
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Yospringfield'**
Synonyme : Springfield

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0959
Date de délivrance : 2001/05/25
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Ivory Yoeugene'**
Nom commercial : Ivory Eugene

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0961
Date de délivrance : 2001/05/25
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Yohartford'**
Nom commercial : Hartford

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0964
Date de délivrance : 2001/05/25
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Yellow Yogilroy'**
Nom commercial : Yellow Gilroy

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0970
Date de délivrance : 2001/05/25
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Dark Regal Yodavis'**
Nom commercial : Dark Regal Davis

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0973
Date de délivrance : 2001/05/25
Date de la renonciation : 2003/05/15
Dénomination approuvée : **'Yoseattle'**
Nom commercial : Seattle

FRAISIER
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Titulaire :** C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti, S. Giuseppe di Comacchio, Ferrare (Italie)
Mandataire au Canada : Fetherstonhaugh & Co., Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 0612
Date de délivrance : 1999/04/12
Date de la renonciation : 2003/04/16
Dénomination approuvée : **'Onebor'**

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkeri* W. Bull.)

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : Hole's Greenhouse, St. Albert (Alberta)
Numéro du certificat : 0636
Date de délivrance : 1999/06/07
Date de la renonciation : 2003/05/21
Dénomination approuvée : **'BFP-844'**
Nom commercial : Celebrette Pink Jewel

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Titulaire :** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro du certificat : 0304
Date de délivrance : 1997/05/05
Date de la renonciation : 2003/04/17
Dénomination approuvée : **'Lollipop'**

➤ **Titulaire :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 0761
Date de délivrance : 2000/05/25
Date de la renonciation : 2003/05/08
Dénomination approuvée : **'Fissil'**
Nom commercial : Brazil 99

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Titulaire :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 0622
Date de délivrance : 1999/05/19
Date de la renonciation : 2003/04/30
Dénomination approuvée : **'Fislunova'**
Nom commercial : Luna 98

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Titulaire :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 0699
Date de délivrance : 1999/11/22
Date de la renonciation : 2003/05/27
Dénomination approuvée : **'Fisgala'**
Nom commercial : Galaxy

➤ **Titulaire :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 0938
Date de délivrance : 2001/05/15
Date de la renonciation : 2003/05/08
Dénomination approuvée : **'Fisson Gold'**
Nom commercial : Goldstar Pink (Decor)

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Titulaire :** University of Guelph, Guelph (Ontario)
Mandataire au Canada : First Line Seeds Limited, Guelph (Ontario)
Numéro du certificat : 0299
Date de délivrance : 1997/04/02
Date de la renonciation : 2003/04/16
Dénomination approuvée : **'OAC Exeter'**

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada Ottawa (Ontario)
Mandataire au Canada : First Line Seeds Limited, Guelph (Ontario)
Numéro du certificat : 0916
Date de délivrance : 2001/03/12
Date de la renonciation : 2003/03/10
Dénomination approuvée : **'Electron'**

20. RÉVOCATION DU CERTIFICATS D'OBTENTION

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Titulaire :** University of Guelph, Guelph (Ontario)
Mandataire au Canada : Bonis & Company Limited, Lindsay (Ontario)
Numéro du certificat : 0861
Date de délivrance : 2000/11/21
Date de la révocation : 2003/03/24
Dénomination : **'OAC Hurricane'**

LIN
(*Linum usitatissimum* L.)

➤ **Titulaire :** United Grain Growers Ltd., Morden (Manitoba)
Numéro du certificat : 0205
Date de délivrance : 1995/11/30
Date de la révocation : 2003/03/31
Dénomination : **'989'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :** Clarence Terpstra, Ridgeville (Ontario)
Numéro du certificat : 0859
Date de délivrance : 2000/10/27
Date de la révocation : 2003/03/03
Dénomination : **'Dawn'**

21. CHANGEMENT À LA DATE DE LA DEMANDE

ROSIER
(*Rosa* L.)

➤ **Requérant :** Terra Nigra B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Derkach Farms, Ruthven (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3989
Ancien date de la demande : 2001/12/20 (bénéfice de priorité)
Nouvelle date de la demande : 2002/12/16
Dénomination proposée : **'Seliron'**

22. DEMANDES REJETÉES

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima*)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1965
Date de la demande : 1999/12/15
Date du rejet : 2003/03/21
Dénomination proposée : **'Eckadrian'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1195
Date de la demande : 1998/01/19
Date du rejet : 2003/05/13
Dénomination proposée : **'JACosch'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1219
Date de la demande : 1998/02/02
Date du rejet : 2003/05/13
Dénomination proposée : **'JACeve'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1220
Date de la demande : 1998/02/02
Date du rejet : 2003/05/13
Dénomination proposée : **'JACess'**

23. ERRATA

Bulletin des variétés végétales, Avril 2003, N° 47

Page 118

La dénomination approuvée de la variété de canola ayant le numéro de certificat 1431 devrait être **PPS97-126 A-line.**

24. COÛT DE LA PROTECTION

Dépôt d'une demande	250 $
Examen d'une demande	750 $
Délivrance d'un certificat d'obtention	500 $
Taxe annuelle	300 $
Certificat temporaire	50 $
Revendication du bénéfice de priorité à l'égard d'une demande antérieure présentée à l'extérieur du Canada	50 $
Modification d'une dénomination approuvée	100 $
Opposition à une demande de certificat d'obtention	200 $
Réactivation d'une demande après désistement réputé	100 $
Réactivation d'une demande, sur requête, après désistement réputé	200 $
Demande de licence obligatoire	250 $
Remplacement d'un certificat perdu ou détruit	50 $
Consultation du registre	5 $
Copies de documents du registre (par page)	0,50 $
Achat des résultats canadiens d'essais comparatifs par un pays membre de l'UPOV	350 $

Plant
Breeders'
Rights
Office
Bureau de la
protection des
obtentions
végétales